





Top. Serdab


2


1593














OBSERVATIONVM ET CVRATIONVM MEDICINALIVM

Liber decimus-octauus;

DE VENTRICVLI AFFECTIBVS.

*In quo eorum caussæ, signa, prognoses, curatio
graphicè depinguntur:*

Vnà cum SCHOLIIS.

Cum rerum & locorum insignium plenissimo INDICE.

D. PETRO FORESTO Alcmariano, Reip.
Delfensis Medico, Auctore.



LVGDVNI BATAVORVM,
EX OFFICINA PLANTINIANA,
Apud Franciscum Raphelengium.

CL3. 13. XCIIII.

OBSERVATIONVM

ET CURATIONVM

MEDICINARVM

Liber secundus

DE VENTRICULI AFFECTIBVS

in quibus reperiuntur signa, progressus, curae
symptomata prognostici

Vna cum Scholiis

et notis ad textum

D. Petro Forsteri Altmansiensis
Dilecti Medici, Auctoris




ALTDORFENSIS

OFFICINA PHARMACEVTICA

ALTDORFENSIS

CL. J. K. 1791

Amplissimis Prudentissimisque
CONSULIBVS, AC SENATVI,
POPULOQVE,
AMSTELRODAMENSIBVS,
S. D.

ÆPENVMERO in ea cogitatione versatus sum, viri præstantissimi, vt vos meorum laborũ aliquando participes facerem, vtque tandem etiam sub auspiciis vestris aliquis è libellis meis prodiret. Verebar tamen ne quid fortè in medium proferrem, quod dignitati vestræ Reipub. minimè responderet; atque ideò etiam vobis parum gratum esset futurum. Præsertim cùm vrbs vestra inter reliquas Batauię ciuitates caput altiùs exerat; vtpote emporium longè nobilissimum ac celeberrimum. Cuius laudes ita quidẽ decantauit olim doctissimus ille ac mihi amicissimus Hadrianus Iunius, in Batauiæ suo libro; vt nihil ferè ad eius encomium amplificandum pertinens prætermisisse videatur: tamen si diuturnior illi vitæ vsura contigisset, procul dubio longè
* 2 plura

plura in ea vrbe laudanda commemorandaq. inuenisset. Videret enim faciem eius usque adeò in melius mutatam, vt penè veteris illius vrbis vestigia aut formam non foret agniturus. Videret eam præter maximos quos in opulètia sua fecit progressus; videret, inquam, etiam latissimè pomœria sua extendisse: domos novas infinitas exstructas, veteres instauratas, deniq. magnificentiam eius per omnia & in omnibus declaratam. Procul dubio pronūciaret Amstelrodamum Antuerpiæ faciem sibi assumpsisse; imo etiam in quibusdam rebus eam lōgè superare. Antuerpiæ nomen celebre quidē, ac nobile fuit: at nunc cum opulètia prisca, prisca quoque eius gloria labascit, ac perit. At contrà Amstelrodamum opibus ac diuitiis augetur, ædificiis illustratur, mercatorum exterorumq. concursu decoratur, omnibus denique beatitudinis donis, Dei omnipotentis beneficio, cumulatur. Cuius rei vel vnum hoc argumentū esse queat, quod idem Iunius pro re miranda ac noua recenset, se vidisse trecentas naues onerarias, frumento aliisq. Scythicis ac Cymbricis mercibus onustas intra octidui spaciū in urbem vestram appulisse.

appulisse; eodem illo temporis spacio omnes suas merces exonerasse, ac propemodum omnes diuendidisse: Cùm nunc multo plures quotidie naues non solum ex Italia, Hispania aliisque vicinioribus regionibus; verùm etiam ex Indiâ, Perû, aliisque à climate nostro quàm remotissimis in hanc urbem confluant. Cui tamen vel hoc vnum ac solum ad laudem sufficere posset, quòd tribus ab hinc annis Italia extrema penè fame macerata & exhausta, vestrarum nauium, frumenta eò vberim conferentium, beneficio ac ope nutrita prorsus, ac fame liberata fuerit. Quapropter etiam omnes illæ nationes, tamquàm ad tutissimum portum in urbem vestram quotidie sese recipiunt, nomenque eius celebratius reddunt, & ad posteros maiore cum laude transmittunt. Nec hoc satis esse putatis: imò adeò naues vestras onerarias per totum mundum dimittitis, vt vestri ciues ad Garamantas vsque & extremos Indos vagantes, vltra Thulen etiam, imò & glaciale mare progredi nō reformident. Vsque adeò vt urbem vestram non immeritò totius orbis emporium ac forum pronunciare possimus. Quod cùm ita sit, haud

abs re fore putavi sub eius ciuitatis nomine; quæ se totius nostræ Batauiæ horreum ac promptuarium dici iure optimo gloriatur, hoc meum de stomacho (utpote totius corporis promptuario à Galeno nostro dicto) opus emittere. Prouidentissimus artifex ille namque Deus in medio corporis receptaculum cibis fecit: quibus concoctis & liquefactis, vitales succos membris omnibus (teste Lactantio) dispertiret. Nam sicut (eodem nostro Galeno auctore 4. lib. de usu partium) nutrimentum omne ab ore ad ventriculum quasi ad promptuarium aliquod commune omnium particularum in medio animali constructum, defertur: Et quemadmodum promptuarium hoc, cibum vniuersum & quoduis alimentum recipit, & quicquid fuerit naturæ benignum & commodum, commodius adhuc efficit, ac concoctum & in chymum permutatum per intestina venis mesaraicis distribuit, & demum per venam portam dictam ad hepar transmittit, ut in sanguinem mutetur, ut sic tandem totum corpus exactè inde nutriri posset. Sic etiam alimenta omnia ac frumenta & reliquas vñibus humanis necessarias

rias merces ciuitas vestra omnibus nationibus commercio sociata ac coniuncta recipit, tamquam promptuarium aliquod, atque in vicinas regiones dispertit. Atque hæc prior causa mihi est huius dedicationis, quod sicut ventriculus in humano corpore, sic etiã vrbs vestra, in Bataua vicinisque regionibus promptuarij quandam habeat analogiam. Altera causa est, quod hoc tempore adeo teneræ ac delicatæ hominum sint aures, vt potius ducant ea quæ nunc eduntur carpere, quàm imitari; quodque in hoc nostro æuo nemo, quâtuvis doctus & in arte sua probè exercitatus scriptor, Momum suum effugere possit: adeo inuidi isti atque maligni homines caninum in morem omnia rodunt, & optimè dicta scriptaque calumniis laceessere non erubescunt. Idedò etiam operæpretium visum mihi est, hos nostros labores, pro recepto his superioribus seculis more, sub nominis vestri vmbrâ, beneuolentiæque patrocinio ac tutela in lucem dare: vt ea tandem ratione maleuoli isti homines à maledictis suis & conuiciis temperent, videntes has meas lucubrationes vobis haudquaquam displicuisse; vobis, inquam,

quos non solum prudentissimos, sed etiam
doctissimos, & ob id Musis fauentes, eas-
demque cum suis cultoribus fouentes,
agnoscere omnes debemus. Quamobrem
vestra humanitate & incredibili benigni-
tate confusus, hæc mea qualiacumque sint,
vobis, Viri Amplissimi, dedico consecro-
que, simul etiam atque etiam obsecrans
& obtestans, ut ea ab omni maliuolorum
iniuria facta tecta seruare, tueri, & defen-
dere dignemini. Valete Viri Amplissimi,
& celeberrimam istam vestram Rempubli-
cam, conseruare, ac decorare pergite.
Delfis, CIO. IO. XCIII. I. Ipsis Calendis
Ianuarij.

*Vestre Reipublice Cliens
addictissimus*

Petrus Forestus Alcmarianus.

HA-

H A D R I A N I I V N I I

H O R N A N I, M E D I C I,

I N

A M S T E L O D A M V M

Belgicae horreum,

Carmen.

A ureus, ut perhibent, quondā ab Ioue perpluit imber
M agnificis turgentem opibus Rhodon: horrea Romæ
S icaniam esse Ceres victuro munere cecit.
T orsit & huc oculos facilis Deus ipse benignos,
E t me maclam opibus iussit, florereq; rebus
L atis: at circundor aquis, pigraq; palude
O bsita: roboreoq; solo stant culmina nixa,
D epactis aliè trabibus, surgentia cælo:
A lternansq; statis vicibus maris æstus aperti
M ænia subcingit, qua parte exotica puppes
V elifera inuectant onera, exportantq; frequenti
M ercatu, Hesperias quā se demittit in vndas,
B arbaraque Eoijs pandit quā littora Titan,
E xpedio, quos nostra tamen non arca verrit,
L egifera cumulos Cereris, genitalia dona.
G argara prouentu tanto non farris abundant.
I nferior fuerit, vel Momo iudice, mecum
C ontendat locuplete penu si Trinacris ora,
Æ qualeisq; ferax non Africa stipat acervos.
H orreum & agnoscit me non malè Belgica felix,
O mnigenas ut opes, sic vitæ alimenta ministro.
R ectè ut quis saturæ similem me dixerit aluo,
R obore defectos succum quæ didit in artus.
E ximia hinc adeo Caesar me ferre Coronam
V irtutis decus, ac munus spectabile, iussit.
M ateriem at linquo scribendi vatibus amplam.

P R Æ F A T I O

A D

C A N D I D U M L E C T O R E M.



U M anno præterito, benigne
Lector, absoluerimus instru-
menta eorum, quæ facultati spi-
randi subseruiebant, (quam
Medici vitalem nominant:)
nunc ad instrumenta eorum peruenimus, quæ
facultati naturali famulantur, & virtuti nu-
trienti presidium præstant. Et licet sedes huius
facultatis precipua sit iecur, ut Galenus 5. de loc.
affect. & 6. de usu partium cap. 18. asserit:
(principium facultatis concupiscibilis etenim
est iecur; nec Platone longè ab eo discedente in
Timæo:) Verùm, cum ventriculus primam con-
coctionem absoluat (ut latius docuimus lib. 1.
de incerto urinarum iudicio, cap. 3.) ante quàm
ea quæ prius concocta sunt, hepar in sanguinem
mutet, ex quo totum corpus nutrimentum suum
recipit; prius de ventriculo quàm de hepate
agendum fuit: de cuius malis ac aegritudinibus
in hoc lib. 18. agere instituimus; cum in hoc
membro diu & periculosi affectus fiant, ex qui-
bus totum corpus male afficitur, & vita in an-
cipiti est. Concoquit enim & immutat ventri-
culus

culus, à Galeno pater familias dictus. Sicut enim terra (ut idem tradit Galenus) plantis alimentum suggerit; ita & stomachus ex alimentis nutrimentum subministrat. Propterea rectè dixit eloquētissimus ille Lactantius, lib. de opificio Dei cap. II. Quamuis internis visceribus non ita pulchritudo spectetur, eo quòd abdita sunt, interea iisdem utilitas incredibilis attributa est: quoniam opus fuerat ut terrenum hoc corpus succo aliquo de cibis ac potibus aleretur, sicut terra ipsa imbribus, ac pruinis. Ideo cum homo constet ex corpore atque anima, receptaculum (utpote stomachus) soli corpori præstat alimentum; animæ verò sedem dedit & pulmonem & cor: de quorum vitiis ac morbis duobus libris precedentibus egimus; nunc autem de stomachi & ventriculi malis acturi sumus: de cuius natura, deq; eius situ ac figura, quedam hîc præmittere oportet: ut ea quæ in hoc libro tractentur, melius intelligantur.

Via igitur quæ ab oris faucibus ad stomachum tendit, gula appellatur; ex nervo & carnæ constans: hac cibus potusq; in ventriculum sui receptaculum deriuantur; nam & biporta vocatur. Medio enim ventriculo non annectitur, sed in latere; ne capitis inclinatione cibus ipse facile redundet. Sicut & alterum eiusdem ventriculi

triculi ostium, quod πύλωον nominant, in
fundo medio non committitur, sed paulo altius,
ne deuorata in aluum incocta, citius quam opus
sit, delabantur. Hac de causa in crapula septum
transuersum plurimum supprimitur, nec tamen
quicquam esculenti euomitur. Ex quibus patet,
quod ad situm eius attinet, quod ventriculus in
medio animalis corpore situs est, ingressum ha-
bens à superiore sui parte (quod ab ore ventri-
culi vocatum est) angustum oblongumq̃, qui
œsophagus appellatur. Idem & senex ille Ruf-
fus medicus lib. de part. hominis, cap. 10. de
Gula & ventriculo, affirmat, dicens: Ventricu-
lus à gula exoriens, sub medio intersepto ad la-
uam magis reflexus, collocatur, ab angusto ore in
latam capedinem sinuatus, cuius conuexum ex-
trà in abdomen vergit, simum verò deorsum
respicit. Longè quàm gula, nervosior ventriculus
est atque amplior. ipse nimirum intus accepta
colliquans, non magnoperè se dilatat: sed cibi
ingressui cedens, eius descensum se constringen-
do insequitur, cum ad alimenta suscipienda à
natura creatus sit, & ad macerandos in suc-
cumq̃, vertendos assumptos cibos. Necessarium
enim hoc munus ventriculo commissum fuit: &
ideo plurimi caloris indiguit; eius enim proprius
atque insitus tanto operi sufficere non poterat.

Idcirco

Idcirco diuina sapientia ipsum foueri curauit,
à dextris iecur instar lebetis statuens; à sinistris
eiusdem usus causa lienem; à tergo spinales
musculos spinamque ipsam; antè incumbens
omentum, ventriculum contegere, ipsumq; un-
dique calore perfundere mandauit, & ut mus-
culi abdominis ventriculum magis fouerent.
Supra ventriculum, transuersum septum est,
eius ostium claudens atque constringens, ne cum
cibis potusq; ventriculus plenior est, sursum ver-
sus in gulam recurrere permittantur. Inde ima
ventriculi parti intestina adiacent: quorum
primum est, Pyloron, quod Latinè Ianitor dici-
tur, quoniam ostij instar in inferiores partes ea
quæ excreturi sumus, emittit. Iste exitus ventri-
culi est angustus, & quadam glandulosa carne
circumseptus, ne esculenta nondum in succum
reducta prius elabantur, quàm decentem coctio-
nis modum acceperint. Et sic iocinore & omen-
to pingui, quasi focus fouetur. Sicut autem eum
in anteriore parte omentum, ita à posteriore
venæ grandes fouent. A superiori parte in sini-
stram vergit, ab inferiori in dextram inclinat;
ita orificiorum suorum ratio exposcere videba-
tur. Ob id atram bilem in superiorem sui par-
tem decurrentem certo meatu à liene assumit: in
imam verò, à folliculo felleis flauam bilem porrò
delatam

delatam accipit. Postquam igitur ciborum
causa creatus est, totumq; locum medium occu-
pare debuit, non ab re oblongus & rotundus fa-
ctus fuit: Oblongus quidē secundum rectam fi-
guram, ut sedem in dextra iocinori, in sinistra
lieni concederet. Eius ima pars superiore latior
est, cum declinūs ipse sit ob directā hominis sta-
turam. Rotundus est autem, ut minūs periculis
pateat: siquidem inter omnes figuras in planis
circulus, in solidis corporibus globus tutior est,
cum tundi refringīve nequeat. In medio positus,
tumens & pendens, membranīs tenuibus septo
commiscetur, lieni, iecori, cordi, cerebroq;, ve-
nis, arteriis, nervis. Quae quidem alligantia &
vicinitas magnū cōsensum membrīs dictis qui-
bus alligatur, adfert, teste Galeno. cum enim
cerebro per nervos iungatur, ex ictu capitis
saepe stomachi eversio evenit: Iecori autē consen-
tit per portam; lieni per venam, quae atram bi-
lem euomit in ventrem: Caue venae & aortae
etiam iungitur; unde & ad cor cōsensus, apud
Galenū: Intestinis verò & gulae suis tunicis est
continuus. duobus enim tergoribus constat; quo-
rum alterum intrinsecus, alterum extrinsecus.
Illud stamineum habet filamentum, hoc Graeci
vocant. Alterum intūs in longitudinē tendit,
in appetendo dorsum trahit: alterum extrā per
transuer-

transuersum fila ducit, in retentrice, quæ hæ-
dextnḗ dicitur, plurimum necessaria. At exte-
rior ventris tunica carnosæ, stamineam venam
in latitudinem protendit, qua materia ciborum
subigitur, & à digestionē superflua, dum sese
astringit, secernere dicitur: huic potentie ἀπο-
hextnḗ nomen est. Interior rursus tunica tactus
sensum habet; unde cibi appetentia prouenit:
exterior verò cibum potionemq; mutat ac con-
fundit; ea vis à Grecis ἀλσικωτικὴ vocatur, cui
reliquæ obsequuntur virtutes. Stomachus autem
intus denticulatus est callo, in modum rubi, ad
conficiendos cibos, decrecentibus crenis versus
orificia: nouissima asperitas ut scobina fabri:
ab iis fibræ, quæ ob similitudinem mesentericæ
dicuntur, oriuntur, quæ inter venam & neruum
naturam habent; à quibus humor attrahitur, in-
de per maiores venas ad iccur transmittitur.

Sed dum concoquit stomachus, nec sui igna-
rus est, quoniam in fame ac siti protinus humo-
rem attrahit, ac primus recreatur. Ex istis
iam dictis facile eius temperies cognoscitur;
cùm caro ipsius, cutis respectu, humida & calida
sit, ut 2. de temperamentis patet; quod humidior
mollities externæ tunicæ indicat: nam interna
ipsi cuti affinis, fortè erit paulo siccior. Interna
neruosa magis rectis villis & obliquis contexta,
ad

ad attrahendum & retinendum quod attraxit, quousq; concoquit. Externa carnosae & crassior, fibras habens transversas, ut pellat infernè, vel supernè, prout opus fuerit. Orificiorum altero ventriculus ori est continuus, altero intestinis: illinc admittit, hinc dimittit: quod admittit apprimè sensibile est, ob multum nervorum contextum qui circa illud implicatur, idq; ut sensum suctionis, qui in fame fit, sentiret. Plura de viribus eius hic referre non opus est, nam de iisdem copiosè disseruimus lib. 1. de incerto ac fallaci urinarum iudicio cōtra Vromantes, cap. 2. Satis est hæc, ex diversis anatomicis, nunc per compendium attulisse, cum plenius à Galeno in libris suis de facult. natural. & de Anatom. administr. & De usu partium, tum etiam à Vesalio, descripta sint. Cum igitur plurimi morbi, minimè contemnendi & valde periculosi, stomachum ac ventriculum infestent, quibus & totum corpus ruit ac labascit; nolimus ut medicorū candidati hoc nostro labore diutiùs frustrarentur: quin curauimus ut statim hæc nostra commentaria in lucem prodirent, ad uniuscuiusque ventriculi affectum vera methodo dignoscendum & curandum. Iterum vale: & his nostris in rem tuam denuò fruiere.

OBSER-

OBSERVATIONVM
ET CVRATIONVM
MEDICINALIVM

Liber decimus octauus,

DE
STOMACHI. ET VENTRICULI
AFFECTIBVS.

PETRO FORESTO *Alcmariano,*
Reip: Delphensis medico, auctore.

OBSERVATION I.

De oris ventriculi inflammatione.

QVI BVS OS ventriculi inflam-
matur, in maximum dolorem,
ob eius exactiorem sensum, in-
cidunt: quibus & vrina rubra
est: sitiunt, & febre cōtinua affli-
guntur: vt cuidam euenit. Huic
statim clysterem emollientem & detergentem,
cūm aluum non redderet, iniiciendum esse, con-
suluimus: & vt aluo soluta sanguis statim ex vena
interna, plenitudine appārente, mitteretur: cau-
tione tamen adhibita, ne plus sanguinis euacua-
retur, quā opus esset: solet enim hunc affectum
syncope & virium imbecillitas, ob vehementem
dolorem, saepe subsequi. Et ideo in sanguinis
missione hīc summa cautio adhibenda est. Nam
A
prācipuus

præcipuus scopus est in eo remedij genere, vi-
 rium robur. Mox à venæ sectione, ad dolorem
 sedandum, hoc vel simile cataplasma applican-
 dum esse duximus: ℞. farinæ hordei ℥vj. florum
 chamomillæ, meliloti, ros. rub. ana p. β. sem. co-
 rriand. santal. omnium ana ℥ij. spicæ ℥β. olei ros.
 ℥iij. olei chamomillini, cotoneorū ana ℥β. misce,
 fiat cataplasma. Interea mandauimus, vt subinde
 syrupos caperet, eosq. prius astringentes, quales
 sunt syr. cotoneor., de agresta, ex rosis siccis. in
 processu verò hos vel similes: ℞. syr. viol. nym-
 phæ, portulacæ, end. ana ℥j. aquæ ros. cichorij,
 end. ana ℥iij β. aquæ menthæ ℥β. misce. Ca-
 thartica per os sumpta hîc minùs conueniunt;
 quia ad affectam partem trahunt. sed post dolo-
 ris sedationem, sola cassia cum pauco rhab. satis
 est: qua etiam hîc, tum in aliis, commodè vfi su-
 mus: etiam confectionibus cordialibus, circa
 initia, hoc modo vel simili, cōseruæ rosar. & alio-
 rum astringentium dosim augentes, & violarum
 magis minuantes: vt, ℞. cōseruæ viol. buglossæ
 ana ℥j. conser. ros. ℥β. corticum citri conditi ℥iij.
 pul. diamargariti frigidi ℥j. diarod. abb. ℥β. co-
 ralli rub. ℥j. manus Christi perlata ℥iij. cum syr.
 cotoneorum, fiat conditum. Pro siti quoque
 egregiè profuit rob de ribes, & conser. foliorum
 acetosæ, & cerasa amarella dicta, & lactuca con-
 dita; quibus & in feb. continuis ad sitim feliciter
 vtimur, vt in libris nostris De febribus cernere
 licet. In fine etiam tabulis trionsant. commodè
 vtebatur. His & similibus remediis hîc conua-
 luit: & alij similiter sanitatem consequentur,

Deo iuvante. Interea hīc magna diligentia opus est, cū malum sit periculosum, & minimē contemnendum.

SCHOLIA.

SIMILIBVS quoque affectibus os ventriculi, vt Œsophagus (de quibus diximus lib. 1 §. scholio obser. 31. 32) tentatur, vt doctissimus Fernellius dicebat: quos & iisdem licet notis deprehendere. Præterea verò & mentis alienatio accedit, ob eos nervos quos è sexta coniugatione suscipit. Mulierem vidi (inquit) gravidam, cui tuberculo duro eoq; ingenti ita os ventriculi obturabatur, vt quicquid indebatur, attracto ventriculi ore, mox remearet atque redderetur. Sic astantium omnium indicio nihil cibi potusve bimestri vel conatu maximo ea voravit. Tandem morbo, de sapientia febreq; confecta decessit, edito partu, quem vitæ superstitem reliquit. Affectus enim ventriculi (vt interpres Holerij summim enumerat) in Œsophago, stomacho, siue orificio, fundo, tunicis, pyloro infiniti propè reperiuntur; tanto periculosiores, quanto coctio & distributio cibi magis necessaria vniuerso corpori. Quales sunt intemperies omnis generis, tumores præter naturam, obstructions, defluxiones, excrementa illic collecta vel nata, vel aliunde immissa, cibus intempestivus, nimius, biliosus, deiecta appetentia, nausea, vomitus, humores in tunicis infarcti, aut in fundo fluitantes, inflammatio, inflatio, dolor, exulceratio à causa interna, vt humore acri, pharmaco, cibo, osse acuto, præcedente abscessu, erosio: fames canina, immoderata sitis; & similes; quorum signa, causas, remedia explicare maioris est operis. Multa ex Galeno colligi possunt 3. & 6. De morb. &

symp. 5. De loc. aff. de sanit. tuenda. 7. Methodi. Signa ex Arte parua desumuntur. 8. x^{ti} τόπος describit stomachicos, contra Andromachum, qui stomachicas confectiones sine discrimine scripserat prodesse stomachicis. Quod & vulgo hodie etiam empirici faciunt. Nos de singulis exempla quadam adferemus, certa & vera methodo curationem instituentes.

OBSERVATIO II.

De ventriculi imbecillitate, ex intemperie frigida & humida; cui postea etiam materia pituitosa accessit.

IVVENIS, annos circiter viginti natus, admodum studiosus, & doctus, Guilhelmus Cripius Haganus, cum longo tempore valetudinarius fuisset, in ventriculi imbecillitatem lapsus est, ex intemperie frigida & humida: quam sitis nulla vel exigua, acidique ructus, & salivæ copia comitabantur: & humiditatem aliquando vomitus subsequabatur, sine ullo magno dolore, post horam unam à sumpto cibo: ita ut tandem ventriculus ex nuda primùm intemperie adeò imbecillis facilè humores pituitosos receperit, qui eò confluxerunt: ita ut non tantùm nuda intemperies morbum constituat, sed & humor pituitosus: idè & vomitus pituitæ sine dolore, & etiam sub finem vomitus cibus qui reiciebatur, subacidum quid sapiebat: ad frigidum enim ventriculum, iuxta Galenum, propriè acidus ructus refertur. Aderat similiter inflatio quadam & ventriculi durities, ob flatulentos humores & frigidos;

frigidos, in fundo ventriculi magis hærentes. Quibus autem remediis hic sanitatem consequeretur, me consuluit. Huic igitur præscripti cibos faciles bonique succi, utque acribus montanis, cuniculis, assis que potius quam elixis vteretur. Concessi vinum medicatum ex absinthio; & cerevisiam absinthitem, cappares, diacydonium, cum speciebus. & ubi ad vomitum proclivis esset, ut exiguum decoct. hordei, cum raphano, pauco adiecto oxymelite, debite biberet: & ut pro præparatione, decocta menthæ, absinthij utriusque sumeret; adiecto syr. menthaceo, cotoneorum, & absinthij. & ut subinde cum pilulis leuioribus expurgaretur; ut alephanginis, ex hiera simplici, vel mastichinis. Deinde, ut vteretur elect. arom. ros., diatrionpipereon, diacalamentho. & ut stomachum inungeret oleo nardino, mastichino, maceris, pauca adiecta cera: & emplastrum ex mastiche stomacho apponeret; & ut subinde vinum generosum sumeret. Quibus remediis hic optimè habuit: ut alius iuuenis Licentiatus iuris, studiosus (nam studiosi magna ex parte stomachum imbecillem habent, quæ imbecillitas plerumque iis adhæret ut umbra corpori: ad quam plerumque consequuntur ciborum cruditas, ructus acidus, nausæ, vomitus, fastidium) qui præter imbecillitatem ex diuturnitate mali natam, multam pituitam in ventriculo humido & frigido collectam habebat: cui & oxymel sæpe lambendum dedi, & mel ros. modò cum decocto absinthij: tandem & pilulas mastichinas ad 3 j. postea triplicata purgatione.

6 DE STOMACHI AFFECT.

per hieram picram Galeni, assiduo potu vini absinthij, & subinde assumpto syr. menthaceo, & aromatico ros. & stomacho exterius roborato cum cerato stomachico Gal. & mastiche, adiecto exiguo croco & cinnamomo, ac rad. cyperi, & oleo absinth. tandem hic, tum alij plurimi, vt frater meus Theodorus Forestus, sanitatem adeptus est. Et alij quoque haud pauci conualescentes, imbecillitate stomachi laborantes, prius aliquando hiera purgati,

S C H O L I A.

IM BECILLITAS stomachi seu ventriculi, fit multis de causis, non solum studiosis, vt istis duobus euenit; verum & conualescentibus, & aliquando sanis. Conualescentibus verò frequens est: magis etiam ab imperfecta crisi; in quo reuocanda sententia Hippocratis: Si à morbo cibum assumens quis non corroboratur, largiori alimento corpus vti significatur. quòd si non assumenti cibum hoc accadat, scire oportet, quòd indiget euacuatione. Conualescentes à morbo aliquando multum appetunt, ob extenuationem membrorum, non solum ab inanitione spiritus & humoris, balneo, profluuiò (quod & interpres Holerij rectè animaduertit, & nos in praxi quotidiana sæpius vidimus) sudoribus quoque & insensibili perspiratione, colliquatione, & similibus; sed etiam à ieiunio, inopia alimenti, calore languescente, vt flamma, qua in elychnio insita, ab oleo & aëre fomitem & pabulum sumit. Aliquando verò appetentiam habent deiectam, ob vitiosos humores relictos. Vtrique sæpe, nisi accuratè tractentur, in recidiuam incidunt. priores quidem, quia cùm extenuata membra

membra multum appetant, non tamen sumpta conficere potest imbecillus calor. Nota est enim historia multorum, qui à longa inedia sese repleuerant, adeò, ut inde suffocati fuerint: uti nos cognouimus nostro tempore, tam in obsidione Harlemonsi, quàm Leydana præcipue contigisse; quando obsidione liberati ciues victu pleniore se replentes mortem quàm plurimi incurrerunt. Posteriores verò, quia reliquias morbi tandem natura stimulata aggredi cogitur. quanto enim plus nutriuntur, tanto magis læduntur: donec accrescente malo, morbus repetit. Hi igitur curantur vacatione, ut docet Gal. De sang. miss. contra Erasistratum, & historia 6. Epide. Illis verò remedio sunt, rerum non naturalium commoderatio, labor, cibus, potus, somnus, Venus, omnia mediocria: deinde longo tēpore substantiæ reparatio per alimenta pauca, bene nutrientia, facilia coctu, sapius exhibita. Nam pauca non sufficiunt, nimia non coquuntur. In conualescentibus ergo, quibus reddita est appetentia, imbecillitas ventriculi non potest tantum concoquere vel conficere, quantum appetit. Modica itaque quantitate, sed breuibus interuallis, cibis boni succi & qui facile coquantur, reficiendi sunt. In aliis, quibus appetentia non redditur, reliquias morbi in causa sunt: quæ optimè vel rhabar. vel hiera picra, ex decocto cicerum aut absinthij, repurgantur. Sed de conualescentibus satis diximus, & exempla posuimus de febricitantibus: at nunc loquimur potissimum de sanis, in quibus imbecillitas est vel à sola temperie. Venter enim varios morbos patitur, & symptomata varia, quæ à diuersis morbis nascuntur. Morbi autem sunt, intemperies calida, frigida, humida & sicca, sine materia, vel cum materia; eaq; pituitosa, biliosa, vel

8 DE STOMACHI AFFECT.

Intemperies
sola diu exi-
stere non
potest.

Frigidæ si-
gna, eiusque
curatio.

Calidæ signa
& curatio.

melancholica. Quare si quis velit symptomatis occurrere, morbos agnoscat oportet: quod ex dolore, functione laesa, & alui recrementis dignoscetur. Difficilius verò dignoscuntur, quàm curantur. Intemperatura sine materia rarò fiunt: quòd si fiant, diu sine ea esse non possunt, vti ostendimus in istis duobus iuuenibus. Nam omnis intemperies ventriculi nata est coctionem impedire. Quòd si frigida intemperies vel sicca præsens sit, cruditatem faciunt, à qua multa pituita asseruatur in ventriculo: si calida, vel cibos vrit, vel corrumpit, vel aliam cruditatem facit. At frigida indicia sunt frigoris sensus in parte infirma, nulla sitis, saluatio, aliquando multi ructus acidi: quos & sequitur appetentia & coctionis tarditas. cui valent vina generosa & antiqua, præassumpta duabus aut tribus horis ante pastum, vinum Hippocraticum dictum, vel cui addita sint piperis grana aliquot, conf. aro. ros. diagal. diacinnamum, rosata nouella, plurissarcot. diamos., diambra, diatrionpipereon, diospoliticum: quæ & calfaciunt, & ventriculo grata sunt. In tabulis vel opiatis, conser. anthos, stœchad. & superbibant aquam menthæ, abs., hyssopi, cum vino generoso. syr. de mentha, de absinth. hic conferunt, propter caliditatem & astrictionem, quæ grata est huic parti & necessaria. Calida signa sunt, æstus in medio corpore, sitis assidua, lingua arida, iactatio corporis, à cibo nidorosi ructus; licet sitis magis siccitatem notet. Valent refriger. opiata, ex conf. viol. ros. flor. cicho. irionfar. diamar. frig. diatragacant. frig. & lactuca condita, & carnes cucurbita condita, quæ refrigerant, & ventriculo & palato gratissima sunt: abluantur aqua frigida; & per duas horas ante pastum dentur; superbibendo parū aquæ: & fiat hac vel similis opiata

opiatā: ℞. conf. ros. ℥ j. conf. flor. cich. nenuph. ana
 ℥ β. pul. trions. ℥ ij. diatr. frig. ℥ j. β diamar. frig. ℥ j.
 conf. viol. ℥ ij. cum syr. end. simpl. fiat opiatā vel con-

ditum. Humida verò intemperies fluctuationem &

Humida.

fitis inappetentiam, & coctionis tarditatem facit. cura-
 tur facilius sicca intemperie; quia partes humida faci-
 lius vim medicamentorum suscipiunt quàm sicca: sicca
 enim propterea quòd partes conciderunt & densiores
 facta sunt, non facile (vt dicebat Rondeletius) cedunt
 medicamentis. adde, quòd medicamenta humida, non
 multum agunt, neque multum resistunt. Curabitur

igitur humida intemperies, inedia, aut victu tenuiore
 aut exiccante: abstineat à multo potu vini diluti; &
 potius generoso meraciori vtatur; vel posca, vel oxyme-
 lite, hydromelite parum coctis, & multum dilutis, vt

magis detergant & minus nutriant. Abstineant à ius-
 culis: vtantur carnibus & piscibus salsis, pane biscocto,

cum multo sale. Rondeletius commendat cineres vipe-

rarum: valet pul. galangæ, cinnamomi, piperis, & ci-

neres hirundinum, conserua acori, saluæ, anthos, &

vinum antiquum, cum aqua absinthij. ceratum masti-

cis, & alia, vt apud Rondeletium videre licet. In sicca

Sicca.

intemperie tarda etiam fit concoctio, adest lingua sic-

citas, corporis extenuatio, saluæ paucitas, siccusq; re-

hementissima. Intemperies sicca omnium difficillimè

curatur, vt omnes alij morbi: quæ enim consummata

est, insanabilis existit: sed quæ sanari potest, curatur vsu

lactis, quia humectat & nutrit, & balneo: & statim à

balneo, oleo dulci inungendum; & in lectulo à balneo,

vbi quieuerit, lac propizandum; de quibus diximus lib.

4. De feb. hecticis: de quibus etiam vide ad longum

Iacchinum doctissimum, supra Rhaf. cap. XLIII. De

affectibus stomachi, à quibus vitiatur concoctio. habet
 ibidem egregia ad omnem intemperiem conferentia
 tam sine materia quàm cum materia; quæ etiam ac
 causam, signa, & curationem spectant, de imbecillitate
 stomachi. & ibi historiam egregiam ponit, se eiusmodi
 affectum curasse ex nimia circa ventrem diligentia
 in parco victu, & sæpe longa abstinencia, medica-
 mentis ad roborandum ventrem datis: ac profectò eò
 deueniat, ut mortuum deambulare credidisses. sed &
 ex vacuatione talis euaserat, quòd senex iam & gracili
 iuenculam duxerat: hoc autem maximè corpus siccum
 curatus autem est iisdem præsidis quæ Galenus ponit
 id est victu humectante. His valent vinum dilutum non
 antiquum, iuscula pingua ex capis, gallinis, canibus
 vituli lactantis, hœdi, adiecto vino exiguo, ad facilio-
 rem distributionem, & concoctionem: cremor ptisanæ
 cum oleo amygd. dul. lactuca, violis, borag. in iusculis
 decoctis. inunctiones ex oleo viol. amygd. dul., adiecta
 axung. gallinæ, pro linimentis. lactuca condita, cu-
 curbita carnes condita, conser. viol. & similia: vel si
 olea dicta nimis relaxant, adde parum olei ros. coto-
 neorum; & tempore inunctionis guttas vini ad pene-
 trationem. Si composita fuerint, signa vtriusque po-
 sita coniungenda. Verùm si intemperies fuerit cum
 materia, copiam vitiosorum humorum nausea, vomit-
 us, grauitas ventriculi, & ructus potissimùm à cibo,
 ostendant. Idcò videndum quomodo adesse materiam
 distinguamus. Primum ergo materiam frigidam adesse
 flatu monstrant, qui etiam sine cibi assumptione sen-
 tiuntur. Secundo percepta grauitas quadam & angor,
 præsertim si os ventris opprimant valde sensibile. Tertiò
 grauitas capitis, & dormitatio: præsertim si cruda pi-
 tuita

Copia hu-
 morum.

Signa frigi-
 dæ materiæ.

ruita sit; à qua etiam appetentia tollitur, vt Gal. lib. De
 plenitud. ad finem testatur: & 5. De vsu partium ad
 principium, quòd scilicet opprimant & grauent. Con-
 trà acida, qua tenuis est, appetentiam facit, vt de cani-
 no appetitu dicemus: quod si nauseet vel vomat, erit
 apertum. Pituita quoque nullam prorsus ventriculi
 erosionem excitabit, nisi salsa fuerit: hinc & acidi ru-
 ctus, nulla sitis, tensioq; ventriculi adsunt. Quòd si
 flaua bilis, & nausea & vomitus accidunt, & tristitia
 & morsus; & iracundi fiunt; aperitur eius qualitas per
 vomitum, caput verò dolet: vel somnos turbatos efficit
 & breues; & sapor amarus sentitur, præsertim si plus-
 culum ieiunauerint. Hippoc. 2. De victu. Et sic si atra
 bilis abundet, tristitia metusq; ructus & excreationes
 foetidae, piscisq; olentis, somnus cum accessione imagi-
 nationum alienarum, contractioq; & dolor poplitum &
 surarum. Sed num in ipso gignantur, aut aliunde in-
 fluant, apparet primo De loc. 4. & 2. de temperamen-
 tis ad finem. Distingues considerando temperamentum
 principum partium, si tale sit biliosum; & si vt in ven-
 tre, ita & in intestinis continetur: quod ex deiectione
 deprehendes. considera à quibus partibus potest venter
 recipere. Demum excrementi qualitas consideranda
 est, si euomat: nam porracea in ventre; in iocinore verò
 flaua vel pallida gignitur. Erit etiam pulchra tentatio.
 nam si à sola intemperie, si cibos dederis, qui resistent,
 non vitiabuntur: si ex humoribus, quoniam illis admis-
 centur, vitiabuntur. Sed illarum partium notas & affe-
 ctus perpendes. Hac quidem exemplis clariora euadent.

Pituita cru-
da.

Acida.

Flaua bilis.

Atra bilis.

Num in ipso
ventriculo
gignantur
aut aliunde
influant hu-
mores.

OBSERVATIO III.

De imbecillitate ventriculi ex laxitate & mollitie, in quo pituita postea coaceruata fuit.

SCRIBIT Rondeletius, ventriculi aliquando imbecillitatem fieri ex partis mollitie & nimia laxitate, citra intemperiem aliam, vel citra materiam; ut ipse colligit ex Galeni verbis 1. ad Glauconem: ubi ait, syncopem fieri ab imbecillitate ventriculi: quam solis curat astringentibus apposis supra ventriculum. quam affectionem fieri autumat Rondeletius post multas comesationes, quæ ventriculum multum distenderunt; aut quia ventriculus suapte natura est magis laxus, aut maior quam oporteat: & quia vltus est ager nimis relaxantibus. Omnes istæ causæ distentionem ventriculi faciunt; quæ facit ut minus bene cibos amplectatur: quod si non facit, non bene concoquit. Apponenda igitur medicamenta primis qualitatibus temperata & astringentia. Quod si minus prosint, sunt augenda frigida astringentia, quia magis astringunt quam calida, & ad intra repellendo calorem excitare possunt. Post cibum assumenda quæ per partem superiorem ventriculum possunt constringere, ut sunt pul. astringentes, ex ros. cinnamomo, cort. cyperi, corallo & aliis. Sed quia ventriculi infrigidatio magis periculosa est, calida etiam adiungenda, ut galanga. Sic nuper puella laxitate ventriculi laborabat: cui à cibo præscripsi cotonea mala,

mala, pyra cocta, vel condita, & extrinsecus cum oleo myrteo, cotoneor. & absinthij, ventriculum inungebam. Verùm cùm eiusmodi ventriculus laxus imbecillis non diu sine coaceruatione materiæ persistere posset, vti huic puellæ euenit, pituita coaceruata est in ventriculo, vt intemperies materialis accesserit, quæ non aliunde pendebat: quæ plerumque frigida & humida est: nam generatio humorum plerumque attinet pituitæ, lib. De atra bile, & 2. De facult. naturalibus. fit enim ex cibis, qui ob frigiditatem & humiditatem, caloris ventris frustrantur actionem: præsertim si natura venter sit debilis. Erat autem hæc pituita in spatio ventris, non autem infixa tunicis inharens; eratque pituita aliquantulum crassa. ideo oxymel simplex, postea & scillinum dedi. deinde vt vomitu leuiter pituitam expelleret, consului vt acciperet mulsæ potum cum oxymelite, eò quòd pituita minùs contumax esset, alioqui deuenissem ad decoctum raphani. Postea exhibui syrupos magis incidentes, & exiccantes, & roborantes, syr. acetos. compos. & syr. de byzantiis: & purgaui cum pilulis masticeinis, & alephanginis & stomachicis ana ℥ j. cum syr. menthaceo; fiebant pilulæ viij. Deinde vsus sum iisdem remediis, quæ diximus conferre ad intemperiem frigidam & humidam: nempe calida & sicca, vt sunt aromata omnia, intrò assumpta & extra; ceratum ex mastiche & speciebus aromaticis. Adhibui quoque sacculos, & fomenta ex absinthio, mentha, schœnantho, rad. cyperi, & caryophyllis composita; cauendo hypochondria: vsus sum & diatrion-

diatrion pipereo, ex mēte Galeni: quia hæc puella subinde extensionē ventriculi percipiebat, ex flatu. Talibus enim flatus gigni solent, & succedere: vnde duplici ratione concoctio vitatur, tam ex intemperie, quàm ex mala cibi comprehensione. Huc enim facit historia illius, qui post horas quatuor cibum euomebat, ob flatus: vt etiam eueniebat fratri meo Theodoro Foresto. ideò diaciminum exhibui subinde. carnibus assis & aromatibus conditis vtebar, vino generoso aliquando, prout sumptus ferre posset: alioqui ceruissiam absinthitem concessi. Vtimur & oleo anisi. Quidam pro arcano habent (vt Matthæus de Gradibus refert cap. de dolore & apostemate stomachi) ad confumendam ventositatem ℥j. aquæ vitæ. sed considerandum numquid adsit caliditas hepatis vel renum: tunc enim valdè suspecta est. Noui ego studiosum quendam Louanij, cū ibi adhuc studerem, qui omni manè pro humido & frigido ac debili stomacho vtebatur aqua vitæ, licet admodum pauca; ita vt tandem maximam ventriculi siccitatem incurreret, & vnà hepatis calorem: vt vix tandem corrigi potuerint.

SCHOLIA.

P R I M V M verò in sananda intemperie, quam humor aliquis in ventriculo collectus fouet (qua etiam frequentissima est, vt diximus) videbimus an ex ipsa ventris intemperie & frequenti cruditate sit acervatus: ita vt venter ipse sibi malum foueat. Hanc autem materiam plerumque frigidam & humidam esse constat. Sit ergo primum pituita in ventre; si crassior, in
spacio

De pituita.

spacio ventris; altera inheret tunica affixa, viscidorum modo. sint & tenuiore irrigata & madida ventris tunica: vnde & intemperata sunt. Hæc ergo omnia simul iungi possunt. ided à prima causa ordiendæ curationis; hoc est, à vacuandis humoribus, qui in spacio ventris continentur. qui si contumaces fuerint, Galenus adhibet oxymel aut scilliticum: & si ager nauseabundus ad vomitum, per vomitum educit, cum mulsa & oxymelite, vt nunc diximus, aut cum decocto raphani. id bis facere vtile est. si tunicis humores infixi, cum hiera expurgata; cuius hic magna est utilitas: vt & aloës, licet bilem purgat; etiam pituitam, ob species admixtas in hiera. Quod si bilis sit in causa (prius dictum est

De bile.

quis nam bilis modus in ventre gignatur) statim expellenda erit; quia facilis suapte natura est vt expellatur. est enim venenosa, syncopem faciens, & per consensum conuulsiones. expelletur verò vomitu quod potest: quod si quid inhaesit, per hieram; exhibendo, non vt prius solam, vel ex vino, vel aliquo decocto extenuante, scilicet ex aqua. Ventriculi itaque intemperies calida, frigida, humida, sicca, cum materia, eodem, quo supra, modo curatur; nisi quod frequentius vrimur pilulis, vel pulueribus laxantibus humores redundantes; qui magna ex parte sunt, bilis, pituita, & aliquando melancholia, sed raro. Euacuantur autem vomitu, si nihil prohibeat, vt affectus thoracis, aut corporis constitutio. A cibo facilior est vomitus: ante cibum plus materia euacuatur. Si bilis vacuanda, post iuscula multa, vel post potationem liberaliorem prouocandus est vomitus. nam bilis, vt oleum his supernatat, & ob id facilius euacuatur. Adde quod acrimonia eius temperatur mixtione harum potionum. Datur syr. viol. cum

Curatio intemperiei cū materia.

Vomitus biliosus.

aqua

aqua tepida, vel iusculum pingue sine sale, aut decoctum betæ, cum oleo viol. vel communi, vel amygd. Si

Vomitus pituita.

autem pituita euacuanda sit, manè ante cibum euacuetur: quia pituita semper est in maiori quantitate, quam bilis; & in fundo ventriculi magis haret: ob id vomenda ante cibum. vel si lenta sit & nimis hareat, syr. acetos. simpl. dilutus aqua vel decoct. betarum vel parum agarici, vel asari, propinandum erit; prius relaxata regione ventriculi, oleo liliorum, vel amygd. inuncto, aut immisso digito, aut penna oleo inuncta. Quod si fiat post corporis agitationem, vel frictionem super ventriculum in gyrum, facilius & plus voment. Pituita pilul. de aro. aut de hiera cum agar. euacuanda, sine aliquibus astringentibus. Bilis autem rhab. infuso, syr. ros. & aliis mitioribus purgantibus bilem. Lenissima medicamenta ob duas rationes sunt usurpanda; tum quia materia è longinquo non est vacuanda; tum quia ventriculus non est vexandus fortioribus. clysteres ad id multum faciunt: sed acres esse oportet. Humorem autem cognoscet ex supradictis, & ex oris sapore; amarus bilem puram notat: salus bilem & pituitam permixtam: acidus pituitam & atram bilem: insipidus pituitam aqueam, vel dulcem; id melius deprehenditur ex vomitu. Atram bilis commodissime euacuabitur decocto polypod. vel sena, vel epithymo decocto in iure galli antiqui, vel pulli, vel decocto mercurialis. Syrupi ad concoctionem vel alterationem sufficiunt. ad bilem end. simpl. vel absinthij cum aqua end. vel cum syr. de cichor. sine rhab. aut cum rhab., vel cum syr. ex infus. ros., si volumus euacuare bilemque detergere. Syr. ad pituitam valent, hydromel, cremor hordei, cum melle, aut oxymelite. Incidentes magis sunt syr. acetosi compositi, & de byzantiis, qui

Clysteres.

Ad atram bilem.

leniter

leuiter incidunt, attenuant & detergunt. At si materia
 aliunde influit, tunc intentio esse debet, toti prospicere,
 vel parti, si pars sit. Si tamen vrget, vt syncopen morsu
 adferat, relicta prima causa hunc affectum tollemus,
 donec affectus mitigetur; interim causa non neglecta.
 ita in copia crudorum humorum 12. Meth. horret pur-
 gationes: sed eas curat frictionibus & inedia: & opti-
 mum erit semper reuellere humores ad contraria, &
 deriuare fluxiones ad alias partes, vt ad infernā aluum
 clysmatis; ad vrinam, post extenuantium vsum. Cau-
 sam non negligemus, vt in pituita inediam imperando,
 potum exiguum, cibos siccos, calidos, & reliqua quæ
 pituita generanda sunt contraria. alioqui si parati sunt
 humores, postea leuiter purgabimus cum hiera, quæ à
 longinquis aut remotis non attrahat. A sanguine me-
 lancholico si oriatur, & si is sanguis in toto abundat,
 Galenus sanguinem mittit, cum nec facile corrigi possit,
 nec absumi præ crassitie. Si fluxio biliosa, purgabitur
 similiter in stomacho, primò vomitu, mox absinthij de-
 cocto, vel hiera. Quoniam verò venter est qui recipit,
 non debent præter suas horas hi à cibo abstinere, cum
 præsertim non soleant famefcere. Vnde præceptum
 illud Auicenna (vt rectè dixit Iacchinus doctissimus)
 suspectum est quòd ad cibum fames expectanda sit. In
 cibo verò oportet præcedere leniens aliquod semper,
 mox sequi quæ roborant astringendo: & vinum ad-
 stringens sit, album, tenue, vt per vrinas bilem expur-
 get. Patet autem quòd vniuersa victus ratio esse debet,
 quæ biliosa excrementa non generet, id est, frigida &
 humida, in cibo, balneo, somno, quiete: quæ omnia vno
 aphorismo comprehendit Hippoc. 6. Epid. In calida
 natura, refrigeratio, aqua potio, quies. Sic verò &

Si materia
 aliunde in-
 fluit quid
 agendum.

temperabitur bilis, & quæ circa iecur est, per intestina expurgabitur. Num verò purgantibus instandum sit dubitatur: credunt alij quòd non, nisi lenientibus, vti natura bilem traducere assuescat per loca consuetas; dum corporis malus habitus corrigatur. Quòd si influxus bilis in ventrem sit naturalis, vt ex portione portæ fellei ad ventrem tendente: quem errore natura in quibusdam maiorem esse contigit, quàm oporteat; malum est incurabile. At si pituita à capite descendat (& est casus, qui crebrò euenit, Florentia præsertim, vt asserbat Iacchinus; magis tamen apud nos Barauos & Hollandos, ratione regionis) ipsi prouidere oportet, postquam venter melius habuerit: etenim humoribus in ventriculum collapsis & expurgatis, post derelictam malam membri intemperiem, ipsum roborando ne facillè recipiat, ipsi capiti quoque tanquam membro mandanti prouidere oportet, postquam venter melius habuerit.

Pituita à capite in ventrem descendenti quomodo prouidendum.

Capiti frigido & humido quomodo prouidendum.

Propria verò capitis prouidentia erit per contrariam intemperiem. Quoniam verò multa pituitosa excrementa generat, erit, exempli gratia, intemperies eius frigida & humida. caput igitur calfaciemus & siccabimus. sic enim & alimentum bene concoquet; vnde nec ex alimento pituitam generabit, & quæ ab inferiore susceperit excrementa, expurgabit per insensiles transpirationes, & etiam per sensiles vias: neque etiam promptè suscipiet ea, iam firmatum. At qualis prouidentia capiti frigido & humido debeat, dictum est De morbis cap. Capita verò eorum sunt, vt si adest multitudo pituita, vacuetur. si est communis toti, per totius prouidentiam: si partis solum, per notas vias, per quas caput purgatur; per nares inquam, & os, & insensilem transpirationem, & per ea quæ calore & siccitate siccant.

siccant, cum noctu assumunt. Si verò melancholicus est humor, si totius vitio, dictum est supra quomodo prospiciendum: sin partis, ut lienis, quoniam malè affectus, humorem melancholicum expurgabimus, eodem modo ut dictum est; & victum instituemus, quo maxime eius succi generatio evitetur: & lienis affectum curabimus.

OBSERVATIO IIII.

*De Cardialgia, seu oris ventriculi dolore,
cum quodam morfu, quod bilis vomitus
subsequebatur.*

FRATER meus charissimus Nannius Forestus, si aliquo vehementi exercitio vteretur fatigatus, vel ieiunium paulo diutius toleraret, & præsertim cum curru veheretur, iuuenis biliosus, in cardialgiam aliquando incidebat, seu oris ventriculi dolorem, cum morfu & erosione bilis, vomitu erodente subsequente; ita ut syncope facile apprehenderetur, cum os ventriculi valde sensibile haberet. Huic panem ex vino albo tenui frigidoque ac diluto ut caperet consulebam; tum succum mali punici acidi: cui & lactueam cum aceto concedebam, pullosque gallinaceos, & perdes, cum omphacio & succo limonum. Sic Hippocrates lib. 2. vulg. mulieri cui os ventriculi dolebat, & nihil remittebat dolor, polentæ pollinem in mali punici succo inspersum, semel in die in cibo tribuens, ipsam curavit: & non reuomebat, ut ipse inquit. Et quia ad vomitum pronus esset frater ex natura, confestim ubi bilis roderet,

syropo acetoso vel oxyzach. cum aqua sumpta
 facile vomebat: alioqui ubi syncopem metue-
 ret, ~~micam panis mediocriter torrefactam mace-~~
~~ratam in vino austero tenui & albo, & demum~~
~~fortiter expressam sumebat: huius vini singulis~~
~~tribus horis vt caperet ℥ iij. iubebam, idque fri-~~
~~gidè; donec pulsus robustior fieret. Propterea~~
~~iussi, cum facile afficeretur cardialgia, ex ieiunio~~
~~vt non tardè sed citiùs cibum caperet, & vt ieiu-~~
~~nium vitaret. Et quia ex natura melancholicus~~
~~esset, & facile ex mœrore flaua bilis in ventricu-~~
~~lum conflueret, & vehementi exercitatione, &~~
~~præsertim motione currus idem pateretur, præ-~~
~~cepi vt mœrorem & vehementiorem exercitatio-~~
~~nem & vestationes in curru vitaret; & vt conti-~~
~~nuò apud se pyxidem conferret consului, in qua~~
~~rosæ rubræ & myrtilli ac sandali pulueres cum~~
~~aqua ros. & vino odorifero aspersi, inclusi essent~~
~~vel spongia hoc odoramento (quo Celsus vitur,~~
 liquido immersa & pyxidi inclusa, ex ros. & vino
 aut aquæ ros. & myrtill. ana ℥ iij. vini odoriferi
 ℥ ij. santalorum ℥ ij. & fiat odoramentum: ve
 huius æmulum medicamentum vt conficeretur
 vtile duxi.

S C H O L I A.

Kαρδιαγία, vt Altimarus ostendit, perpetuò affe-
 ctus est oris ventriculi, eiusq; infestum sympto-
 ma, à succis mordentibus eueniens: καρδιωγμὸς verò
 interim, non oris ventriculi, sed eius visceris, quod in
 thorace continetur, est affectus. Cardiacus quoque per-
 petuò oris ventriculi morbus, sed cum febre, eaq; acuta
 qua etiam

qua etiam ratione differt à cardialgia: & ideo cardiacus morbus cum in acuta febre & maximè æstiosa fit, perpetuò periculum minatur: confirmat id eius causa, cum à rodentibus ac venenosis succis fiat, seu ab alicuius visceris inflammatione: adeò ut quidam os ventriculi valde sensile habentes statim ex eo intereant, teste Alexandro. nec minùs periculosus est à lumbricis ascendentibus ad ipsum os ventriculi, quibus nonnulli roduntur, & statim intereunt. Frequentiùs iuuenibus evenit in augmento agritudinis circa sextum diem; & quàm maximè eo tempore, quo æstas calidior incanducrit. Cardialgia etiam in febribus mala iudicanda: de qua septimo lib. De feb. diximus. Quantum ad curationem Curatio. spectat, cum prædicti affectus ratione maioris minorisq; differant, ideò communis ratio tum victus tum medicamentorum instituenda; àër frigidus eligendus, & domus depressior, nec alta, nec valde lucida, fenestris patentibus, ut perflatus accedat, leuiq; veste contegantur agri, in cardiaco præsertim morbo. pauimentum foliis vitis & ros. consternatur. Vigilia vitanda; somnus moderatus competit; & quies motusq; omnis interdicens. alius natura vel arte sit lenis. valent pyra, persica, vua, & quæ moderatè refrigerant. sed de his diximus De febribus. Potus sit aqua hordei. Aëtius ptisanæ succum aut alicæ per clysterem infundit. reliqua vide apud Aëtium & Altimarum. de vomitu leui iam dictum est. Si vomere non possunt, lenia medicamenta adhibenda, thamarindi, infusum rhab. vel syr. ex infus. ros. & topica ventriculo adhibenda, ut inula, cotonea, cum pane vel plantagine, vel polenta cum palmis. exudantibus sudor inhibendus cum oleo myrteo vel melino, myrto inperso. Extremæ corporis partes refrigeratæ concalfaciendæ,

cum multa frictione ipsarum partium, linteisq³ calidis adhibitis. Quod si ex visceribus quoddam inflammatum, vnde cardialgia aut cardiacus morbus, eadem inflammatio curanda erit. Si ex ascendentibus lumbricis, ea tribuenda quæ ipsos interficiunt, & ex corpore expellunt. amarus expellas, iuxta Gal. 14. Meth. medendi. Hoc autem vitium, vt etiam sequens, ad os seu ventriculi ostium pertinet, in quo ciborum fit appetentia. Atq. hæc prima ventriculi pars est: vii secunda (quam eiusdem ventriculi spatium seu cavitatem appellamus) in qua eorundem ciborum fit concoctio: de qua parte etiam postea suo loco.

OBSERVATIO V.

De appetentia canina.

MONACHA apud Delphenses, cum longo tempore cibum deuoratum euomeret, & in fine acida quædam & aquea, rursumque appetentia incitata iterum cibum assumptum cum rursum euomeret (quod vitium canibus solet accidere;) facile intelleximus eandem canina appetentia laborare; atque hanc causam internam esse ex sapore eorundem quæ euomebantur; etiam ex ægræ relatu cognouimus, tum ex ructibus præcedentibus vomitum, tum ex acido sapore oris, dum acida euomerentur. Cum autem hæc multis medicamentis vsa fuisset, nec per alios medicos curari posset, cum valdè debilis esset, vt has pilulas leues quidem suumeret præcepi, cum ad eam accitus essem mense Martio, anno 1563.
 ꝑ. pilul. de hiera simplici Gal. ꝑ j. rhab. optimi
 pul^u

pul^{ti} & β. cum syr. ex infus. ros. fiant pilulæ v. valde exiguæ. quas cum in diluculo deglunisset, bis aluum deposuit. quas cum iterum atque semel cepisset, stomacho corroborato, vomitus desit. Vomebat autem hæc primò non solum aquea, verum postea & acida, ut diximus: sed in fine vomitus sentiebat aliquid amarulenti, quod & gulam vellicabat: idèd rhabar. & β. pilulis de hiera addebam, iisque deuoratis malum quod irremediabile videbatur, atque diu durasset, miraculi instar cessauit. Ita & ~~quendam alium iuuenem, hoc eodem malo, folis pilulis de hiera, liberaui.~~

S C H O L I A.

QUATVOR sunt accidentia ordine quodam sese consequentia, quæ ventriculi appetentiam præcedunt, cum secundum naturam quis appetit. Primum namque omnium totius corporis inanitio, seu vacuatio est: secundum, naturalis euacuationum partium: tertium, ventriculi suctus: quartum ipsius suctus sensus: hinc sequitur iam dicta ventriculi animalis appetentia. Si hac præter naturam vitiosa redditur, modum in quantitate excedens, dicitur tunc canina appetentia, 1. De caus. sympt. & comment. aph. 21. lib. 2. à canibus sic appellata, apud Alexand. Trall. lib. 7. cap. 5. Egri vomunt pituitam, & cibum, cum assumunt, quem retinere nequeunt; & post vomitum alium appetunt: estq; vehemens & insedabilis ciborum appetentia: in qua afficitur os ventriculi, ut 1. De caus. sympt. & 5. De loc. aff. Affectio verò symptoma est in genere noxæ functionum animalium, atque ipsius sensus tactus: ipsa quidem functio est deprauata non di-

Appetentia
canina.

Pars affecta.
Affectus.

Signa.

minuta nec ablata. agri enim plus cibos appetunt, & cum appetitum cohibere nequeant (teste Aërio lib. 9. cap. 21.) in ingerendis cibis modum excedunt: deinde multitudine eorum aggrauati, & absumptos citra nocumentum ferre non potentes, ad vomitum diuertunt: deinde rursum cibo se explentes, iterum ad vomitum

Causa.

reuertuntur, quemadmodum canes. Volunt autem hunc morbum fieri, vel propter intemperiem solam frigidam, vel ob pituitam acidam, vel ob melancholiam, vel ob totius corporis dissolutionem magnam. Trallianus etiam à caliditate fieri scribit. Iam quoque à causis procatarteticis incitatur, vt à nimia aëris infrigidatione; quod accidit iis qui per montes frigidos & niuosos iter faciunt. ita & boulimon fieri volunt, de quo postea. sic & ex potu aquæ frigidissimæ, refrigerato ore ventriculi. Ob id scripsit Hippoc. aquam & aërem facere voracitatem; sed magis aquam, quam & voracem appellat. Fit & cum ager nutritur alimentis exigui nutrimenti, vt si vescatur oleribus, fructibus acidis, asparagis, radicibus, leguminibus, aut aliis alimentis imbecillioribus. Fit etiam ob longum vsum alimentorum detergentium, vt ficuum vel gari; quod se Rondeletius in se ipso expertum scribit: qui cum me vellem (inquit) cogere ad vsum piscium, vtererque frequentissimè garo parato ex lycotoniis (vulgus Gallicè Anchoys vocat) & oxylao, ficus etiam Massilienses ferè omnibus horis comederem, ita fuit pituita illa ventriculi & intestinorum deteresa, vt mihi superuenerit appetētia canina, deinde boulimos. qui me adhuc hodie infestat. Hæc Rōdeletius. At causæ procatartica huius affectus deprehenduntur ex relatu agrotantis, & his quæ præcesserunt. At si ex frigida intemperie, egestionēs multæ ex ipsorum ventribus procedent, crudis

Causarum
cognitio.

crudis existentibus nimirum cibis, aut semicocctis. Si vero adfuerint acidi quoque succi, aderunt simul cum his acidi ructus: nec mirum si frigida intemperies, frigidiq; vitiosi succi in ore ventriculi redundantes propter frigus, alimenti & non potus desiderium excitent. Ex imbecillitate retentricis facultatis in toto corpore, si contingat ob caliditatem, contraria magis iis (teste Tralliano) qui ob frigiditatem immodica appetunt, euenire videntur. neque enim siti carent, neque acidum humorem vomunt: vnde & his magis aluus astricta est, quàm citata. At iis qui ob retentricis in vniuerso corpore facultatis infirmitatem laborant, cibi minimè coccti, copiosi, & subinde alterationem non experti excernuntur. quare etiam tales continuis illorum corruptionibus laborant. Plura de his vide apud Gal. 4. & 6.

De loc. affect. & 4. De sympt. causis. Hi autem facile, Prognostica.
iuxta Paulum lib. 2. cap. 51. dilabuntur in coeliacum affectum, aut dysenteriam, & aquam intercutem, si ad consuetudinem vomendi peruenerint; cum & alios ingerant cibos cum priores nondum sint coccti. & si diu perduret, in boulimon permutatur; interdum in soporem & interdum ad mortem. At canina appetentia quæ ex immodica dissipatione ortum ducit, si priusquam ad summum peruenerit, cognoueris (teste Gal. 6.

De loc. affect.) non difficulter curabitur. Si itaque ex frigida intemperie vel succis frigidis oriatur, aer eligatur ad calidum & siccum vergens. vitentur vigilia immodica, & somnus alliciatur; exercitium moderatum confert, alui excrementis prius arte vel natura depositis. declinandus timor & mæstitia. Vini potus his, non cibi multitudo, remedium est: flauum quidem vel rubecum adstringens id vinum sit, & merum: edulia

B 5 pingua,

Curatio ex
frigida in-
temperie vel
succis frigi-
dis.

pinguia, oleosa, ex Gal. & Alexand. & phasianorum femora, & carnes suilla. Multos equidem Galenus sanauit qui indefinenter fameſcebant, vinum abundanter exhibens, ſlauum, vel rubeum adſtringens: & primum offerre pinguia oportet. Potus ante cibum multus calidus, ex Aërio, cerebella, pulteſq; cum melle & oleo, ſorbtioneſq; appetitum deſtruentes. Ex fructibus, piſtachia, nuceſ pinea, colymbades, & oliua ex melle; allium, porrus, & herba diſſecantes, rhymus, ſatureia: ex medicamentis oxymel ſimpl. ſcill., mel roſ. Vomitus ex iuſculis pinguibus, cum decocto raphani. Si impacti humores pituitoſi, hiera danda. Sufficit aliquando leuiſ euacuatio, & reiterata: quia multos humores non continet ventriculus, ob frequentem vomitum. Deinde electuaria propinanda, qua caleſciant & roborent ventriculum, ex cinamomo, arom. roſ., diagalanga. & exterius inuncto ventriculi ore, oleo nard. abſinth. maſtich. & vino maluatico partem fouebis, tum aliis de imbecillitate ventriculi dictis. Si ſit ab intemperie ſola frigida, alterabimus caleſciendo, & leuiter conſtringendo medicamentis & ſaſcia. Si fiat ex immodica corporis diſſipatione, abſtinendum à continenti calido ac vini potu, & ab omnibus, quæ tum extrinſecus, tum intrinſecus caleſcere poſſunt, ex Aërij mente. Aër frigidus eligatur, quies iniungatur, ſomnuſq; mediocris, & vigilia immodica vitentur. Alij volunt, ſi propter reſolutionem magnam totius corporis fiat; aut quia uſi ſunt alimentis detergentibus & euacuantibus immodicè, optimis alimentis illos alio portere; vitellis ouorum, ſucco carnis optimo, & generoſo vino, pane inuncto in maluatico vino, vel Hippocratico, vel muſcatellino. Hac alimenta differunt ab iis quæ ad bouli-

ad boulimon preparantur, quod in boulimo dantur (vt
 sequenti exemplo dicitur) multum alentia & multum
 satiantia; atque ob id eligimus pingua; quae sunt fu-
 gienda in appetentia canina, quod vomitum prouocent,
 vt & oleaginosa omnia; & magis liquida, quae suapte
 natura facillime vomuntur. Isti tantum alimentis uti-
 mur cum volumus ab initio augere vomitus. Si propter
 alimenta, aut medicamenta plus iusto detergentia hac
 affectio acciderit, viscosa sunt danda, vt cremor alica,
 pisanæ, decoctum pedis veruecis, aut aliorum anima-
 lium. Alexander is qui ex caliditate appetitu canino
 laborant, vinum non dat; sed cibos, qui agrè conficiun-
 tur. Calida his inimica sunt, quae ex pipere parantur,
 quibus enim ex immodico calore dissipatio fit, clysteri-
 bus lenibus vtendum: animi immodici affectus decli-
 nandi, & potissimum ira: cibiq; stabiles & agrè corru-
 ptibiles dandi, aqua potus vel sem. coriand. prepar.
 decoctum. cutēq; condensabimus oleo ros. omphacino &
 myrteo astringente. Valent lauacra frigida, si nihil pro-
 hibeat. à balneis calidis abstinendum. Unguenta restrin-
 gentia & refrigerantia prosunt. Curationem recenteri-
 cis facultatis infirmæ ex frigidityte, Alexander absoluit
 cibis & medicamentis calfacientibus, brassica vino per-
 cocta, cinara, pulte ex alica, cum viko, olyra, Zea, per-
 dice, atagena, carne leporina; inter bellaria, vuis passus:
 vnctionibus, epithematibus ex ladano, myrrha, aloë &
 similibus. dat iheriacam; & balneis calidis utitur, &
 quae mediocrem habent adstrictionem. Exercitia com-
 mendat, gestationes, nauigationes, & longas peregri-
 nationes. Ad facultatem recentericem imbellem ex ca-
 lore, oua dura exhibet: inter olera lactucam, intybum.
 ex auibus gallinam cortalem non admodum coctam.
 anserum

anserum alas & pectora, & phasianorum. Ex piscibus, dura carne praditos, orphum, glaucum, cuculum & sepias. Ex testaceis, astaces, buccina, pectines, cochleas. Ex leguminibus, phaseolum, fabam, oryzam. Ex fructibus pomaceis, mala dulcia, citria, vuam dura carne praditam: peponum carnem, cucumerum medullam, sycomoræ, duracina & persica. Balneas aquæ dulcis commendat, naturales refugit. Aliqui his addunt curationem à melancholia: in qua lienis ratio habeatur: & purgetur humor melancholicus, & stomachus roboretur exterius. Vide de his ad longum Alexand. Benedictum Veronensem lib. 11. cap. 22. De curationibus variis inexplabilis auiditatis.

OBSERVATIO VI.

De grandi fame, quæ Bulimos Græcè dicitur.

IVVENIS quidam Brabantinus, cùm iter longum per frigora & niues faceret, vel externum frigus aliquod pateretur, ilicò ore ventriculi affecto, bulimon incurrebat, & ab eo statim syncope afficiebatur. Quod cùm illi in itinere ter contigisset, ita ut vix à syncope à sodalibus qui illi in via aderant leuari potuerit, hunc casum famulo meo hoc tempore in Brabantia existenti narrauit: & is reuersus ad me cùm & Diestensis esset, ac huic iuueni familiaris, eius nomine me consuluit. Præcepi ut iuueni rescriberet, ut omnium primò cùm syncopem incurreret, ex mente Galeni, tum Alexandri Tralliani, extremæ partes constringerentur, continerentur, & pungerentur undique; & astantes aures perfricarent, & capillos:

capillos attraherent, atq. odoramentis ex aceto vel pane vino intincto ægtum reficerent. Hoc enim plerique idiotæ sciunt: vtuntur autem ad vitalem facultatem, quæ digeritur, recreandam recolligendamque. Ex iis autem quæ odoratu mouent, est panis potissimum in vino imbutus: ægroque reuerso ad se, & defectiōne animi finita idem panis cum vino imbutus ante omnia dari debet. Reliquo tempore celerius nutrire, & quicquid ægrè mutatur conficiturq. ipsi exhiberi oportet: necnon quod confirmare potest. Ab eiusmodi namque, inquit Trallianus, iuuantur, & temporis processu ad bonam temperiem reducuntur. Generatur enim hoc malum, ex Galeno & Aëtio, ex stomachi frigidity ac virium imbecillitate: quæ semper ferè ab externo frigore ortum ducit, vt hîc. Hinc, teste Galeno, aucta oris ventriculi frigidity immodicè, propter eius exactum sensum, ac ratione vicinæ, eam ipsi cordi impertitur, ipsumque valde refrigerat. non abs re igitur causa existit, vt animi deliquium accidat. Imò propterea Galenus hanc affectionem dixit nihil aliud esse, quàm animi defectum. Et cum hæc fames ingens ab externo frigore oritur, propterea peregrinationes (vt inquit Aëtius) & itinera longa maximè per niuem facta (vt hîc) affectionē hanc inducunt. Propterea & huius curationis ratio exigit, ne iuuenis iste neglectim habeatur, cum & quidam in locis desertis, aut in balneo in hoc malum collapsi ex instanti perierint, auxiliij facultate destituti. Quapropter auxilia confestim pro eius curatione adhibenda. Namque assiduæ

l. 1. d. 9. l. 1. c.

etiam

etiam boulimiæ & exoluunt, & in animi deliquia inducunt ægros; quibus ægrè auxiliū reperitur, ex eiusdem Aëtij auctoritate. Et quia affectio hæc nēpe frigiditas adiuncta est siccitati, vt Gal. asserit 5. De simpl. med. facultateo calidis tum humidissimis cibis, tum medicamentis vtremur. Itaque ægrum reuocabimus (vt etiam Gal. docet 8. De compos. medica.) odoramentis aceti aut pulegij, etiam recenti pane odorato si ad manus sit. vltro etiam panem cum vino maceratum offeremus, & oua forbilia & carnem suillam. Valdè commendat Rondelētius lucanicas Bononienses, quæ cum integro pipere parantur: multum enim alant & ventriculum calfaciunt. Bulimon enim eodem modo curari scribit, quo appetentia canina: in hoc tantum differens, quod alimenta oporteat esse duriora, & tardiora ad concoctionem, vt alimentum inde factū diutiùs duret. In his oportet cauere longiorem cibi dilationem ac inedia, & singulis horis simplicissimum modicumque cibum offerre. Hæc sunt quæ iuueni huic valde utilia esse putamus.

S C H O L I A.

VENTRICULI ostium indigentia simul ac refrigeratione & imbecillitate virium laborans, incurrit symptoma, quod à Græcis βέλους, à Latinis ingens fames, vehemens esuritio dicitur (teste Galen. lib. 1. De sympt. caus.) βέλ etenim Græca dictio, adiecta

Pars affecta,
& affectus.

vocibus, vim habet augendi significationes earum. Os ventriculi hic afficitur, vt 1. De caus. sympt. constat: & eius affectus est symptoma ex genere noxe functionum propria

propria ipsius appetentia deprauata. Differt autem à canina appetentia, quæ vniuersalior est: Boulimos magis specialis atque particularis & deliquium accedens habet. etiam causa differt: nam à frigore perpetuo ferè accidit boulimos; canina appetentia ex nonnullis aliis causis, vt diximus. Signa per se nata sunt, cum adest fames & deliquium sequitur. Modum generationis & causam iam diximus, & etiam curationem. quibus adiunges ea quæ & Galen. & Aëtius de hac affectione scripserunt. Volunt tamen aliqui & in febribus hanc affectionem oriri, vt Aëtio & Paulo visum est: licet ea rarò accidat. Inspiciendum tunc quo accessionis tempore contingat: nam si in remissione seu declinatione febrilium exacerbationum accidat, intrepidè eis cibi sunt offerendi, quos diximus. Si verò in principio eueniat, aut in vigore apparuerit, conabimur eos primò reuocare, potissimum pane calido, vaporem adhuc emittente, vel polenta, aqua seu posca madefacta. Frictio quoque tunc temporis extremarum partium adhibeatur; & cataplasmata ex palmis, cotoneis, in vino diluto decoctis, ventriculo applicentur. atque hæc vsque ad remissionem facere oportet, vt oportune cibum offeramus. Quòd si ex his nihilo melius habeant, audendum est per ciborum ingestionem auxilium offerre, vnam atque alteram in vino madefactam buccellam panis tribuendo; vt exinde refocillati, vsq; ad remissionis tempus perueniant: in quo tum corporis curatio, tum sufficiens cibus ordinetur. Nam neque Galenus ipse veritus est in principio, incremento, ac summo vigore exacerbationum febrilium, potissimum calidis siccisq; corporibus, quibus etiam stomachus fuerit imbecillus, cibum offerre, non vni duntaxat aut alteri, sed pluribus, vbi vsus postularet;

Curatio si
in febribus
accidat.

A frigidis &
siccis succis
quomodo
curetur.

postularet; praesertim panem ex vino diluto: ut liquidò
constat apud eundem lib. 10. Meth. med. Si verò à
frigidis in ore ventriculi & siccis succis redundantibus:
hæc affectio fiat, iidem prius concoquendi, præparandi
ac expurgandi sunt. Propterea, si boulimos fiat ab hu-
more acido, euacuationem tentare oporteret: sed cum
maiore cautela id faciendum quàm in appetentia ca-
nina. Nam hi, ut dictum est, facillimè in animi defectio-
nem incidunt, post euacuationem. Sunt autem statim
(ut iam dictum est) reficiendi vino & rebus odoratis.
Inunctiones & omnia alia præscripta cap. De appeten-
tia canina hic conueniunt. Id quoque considerandum,
numquid à vermibus contingat: cuius habemus egre-
giam historiam apud Alexand. Trallianum, sic scriben-
tem: Noui mulierem quandam, quæ cum multa &
immoderata assumeret, omniaq; concoqueret, & nun-
quam satiari se diceret, rofionem verò in stomacho
experiretur, & capite doleret, medicamentum purgans
accepit: erat autem hiera. Facta igitur euacuatione ver-
mem proiecit, qui longitudine duodecim cubitos, &
plures habere putaretur. Atque tunc immoderata &
furiosa appetentia conquieuit. Innotuit igitur non bu-
limum, sed bestiam fuisse, quæ ad cibum sumendum
compelleret, omniaq; consumeret.

Historia mu-
lieris vermẽ
proicientis.

OBSERVATIO VII.

De Citta siue Pica & Malacia.

PVELLA annos nata 15. filia illius Theodori
Cornelij mercatoris frumentarij Delphenfis
ditissimi, habitantis in foro frumentario. Hæc
quidem facie admodum pallida, statura exigua,
cittam

cittam seu malaciam patiebatur: frumentū enim & triticum crudum & cretam in maxima copia comedebat: vti & Maria Petri Sasbori filia; prægnans; in maxima copia cretam vorabat. Est enim hoc symptoma & puellis & prægnantibus familiare aliquādo; vt in scholio latius dicturi sumus. Sed quod ad hanc puellam attinebat, cū deprauata appetentia ex causarum remotione tollatur, nempe prauorum succorum purgatione, ad eam curandam, ex communi consilio Henrici Vergerij medici Haghani doctissimi, qui vnā mecum ad curationem accitus erat, post syrupum de absinthio capius propinatum hoc sequenti infuso vti sumus: ℞. pul. folliculorum senæ ʒ ij. infunde per noctem in aquæ betonice (cū & capite doleret) aquæ fumarie, absinthij, boraginis ana ʒ j. manē post expressionem adde pul. specier. hieræ picæ simplicis ʒ β. syr. borag., viol. (qui & vomitum incitat) ana ʒ β. misce. sumebat manē hora vj. in diluculo: & post tres horas soluta est aluus: bis aluum deposuit, & semel egregiē vomuit. Deinde stomacho exterius corroborato, oleo cotoneorum, nardino, & mastichino, & cerato stomachico super imposito, hæc sanata est.

S C H O L I A.

AFFECTIO quedam est, Græcis κίττα & μαλαρία, à Latinis Pica: quæ secundum quosdam à pica auicula nomen recepit; vel à pica avis varietate (vt Paulus ait lib. i. cap. i. cap. i.) vel quod eadem subinde hoc malo corripiatur: secundum alios ab hedera similitudine, quæ κίττα Græcis vocatur, nam sicuti illa

κίττα, μαλαρία.

Pica vnde dicta. Vide Gal lib. i. De causis symptom. & Aëtius lib. 9. cap. 23.

E

varius

variis plantis (prout occurrit) se implicare solet. ita mu-
 lieres ex pica laborantes varia edulia appetunt, atque
 ea contraria, quæ tum voluptatem tum insuauitatem
 gustandi exhibent, Aëtio teste lib. 6. cap. 10. Malacia
 verò dicitur, quasi mollities. Pica enim corrupta est ap-
 petentia, quæ vtero gerentibus frequens est, & potissi-
 mum accidere consuevit tertio à conceptu mense: nam
 tunc foetus (teste Paulo lib. 1. cap. 1.) omne quod ra-
 tione alimenti ad ipsum fertur, tamquam imbecillior,
 nequit consumere: vnde fit, vt quum varia ex eo re-
 crementa in stomacho grauida redundant, varia &
 natura aliena appetat: exempli gratia, carbones ex-
 tinctos, cretam, cimoliam, aliâq; complura, vt etiam
 terram, carnem crudam. Nouimus & nos aliquas mu-
 lieres gravidas ~~crudas anguillas deuorasse~~: & nuper
 istis diebus Delphis pellem ouillam crudam, vna cum
 lana, aliam comedisse percepimus: alteram verò Alcma-
 ria picem naualem cochlearibus excepisse, atque deglu-
 tisse. Hæc non solum mulieres, sed & pueros & viros
 nonnunquam infestat. Tanta enim vis malacia est
 (inquit Fernelius) vt vir quidam nobilis edenda calcis
 viua desiderio iam diu pressus, illam tandem pugni
 magnitudine vorauerit recreatus, nulla vetriculi, nulla
 viscerum offensione. Vidimus & infantes & pueros
 aliquos adultiores, carbones, cineres & arenam & cre-
 tam deuorasse, & calcem à lapidibus excussam. Con-
 ringit & puellis cachexia laborantibus, ob mensium
 retentionem, aut seminis, à vitiatæ & corruptis humo-
 ribus in ventriculo collectis. Atque ex his iam dictis
 facile patet & quæ sit pars affecta & qualis affectus.
 Conflictatur enim ventriculi ostium, vt 1. De caus.
 sympt. & 5. De locis affect. constat. Estq; symptoma
 ac noxa

ac noxa eiusdem appetentia, qua depravata est; in Quis affe-
 qualitate tamen, & non in quantitate, velut canina ctus.
 appetentia, excedens, ut 1. De causis sympr. habetur.

Aberrat facultas appetendi, cum non cibos, quin imo
 prauas appetat qualitates, ut acida, acerbata, acrida, ci-
 moliam terram, testas, & iam dicta. Ita puella nata
 annos 12. apud Amatum cent. 3. cur. 86. facie pallida
 & gracili, indiscrete lapillos, terram, calculos, cretam,
 gossypium, lanam & varia similia comedebat; & ita
 eiusdem delectabatur, ut inter suendum eius palmaris,
 super quo mulieres suere solent, gossypium suavi appe-
 tentia comederet, tametsi à matre & assistentibus in-
 crepabatur. nec enim prædicta tantum comedebat, sed
 absurdissimos alios cibos: quæ & ab eodem curata fuit,
 ut ibidem videre licet. Apparent etiam taliter affectis Signa.
 assidue expuitiones, oris ventris morsus, ac anxietates.

Insequitur autem pravam eiusdem oris ventriculi in-
 temperiem, cum eius tunica pravo aliquo excremento
 fuerint imbuta: quo fit ut tuberculis vitioso humore
 repleti, euenire soleat affectio hac; maxime cum vie- Causa.
 rum ferunt. Pro varietate autem peregrina edulia ap-
 petunt, & propterea alio signo non indigent pro eorum
 dignatione: quamquam etiam per vomitum iidem ma-
 nifestari consueverunt. Contingit autem & puellis ca-
 chexia laborantibus, ut diximus, & à vitiosis humo-
 ribus in ventriculo collectis; ut hominibus aliquando
 accidit melancholia laborantibus; aut diuersis humo-
 ribus. Nam ferè euenit, ut Rondetotius existimat, ut
 ventriculus appetat similia alimenta humoribus in se
 contentis: ut si atra bilis non vsta in ventriculum effusa
 sit, acida appetunt: sin vsta sit & incinerata, carbones,
 cineres & alia alimenta sicca appetunt & assumunt.

Dubium.

& illis delectantur: qui saldos humores, salsa: qui alios,
 alia: ita ut ex eorum appetentia humorem coniciamus
 collectum. At Iacchius hos sic affectos remedium qua-
 rere putat ex assumptis: remedia verò quari per con-
 traria. Hinc alij qui viscidis abundant, acida appetunt:
 qui frigidis, multum acris: qui calidis, acerba: qui in-
 dicibilis qualitatibus, etiam indicibilis qualitatibus cibos. An
 & hinc monstruosae libidines in iis, qui semen retinent?
 Sed cur fieri dicas, ut in retentis mensibus conceptionis
 tempore hoc eueniat, non grandioribus, cum sponte de-
 rinentur? vtrumque tamen per naturam. Responderet,
 semper si intra tempus purgationum naturale deri-
 neantur, noxam faciunt hanc; non si extra naturam
 epim aliò ea excrementa sensim deducere assuescit: &
 eiusmodi excrementa in senioribus non adeo multa gi-
 gnuntur. Solet autem hac affectio contingere, iuxta
 Aërium, vtero gerentibus, ferè circa quadagesimum
 diem à conceptu; & saepe vsque ad quartum men-
 sem durat; vel compluribus (teste Galeno) vsque ad
 secundum & tertium mensem; in quarto verò quies-
 cunt, partim quòd vomitione vitiatum humores expur-
 gantur, partim quòd concoquantur, utpote exiguum
 cibi tum sumente muliere, ob fastidium; partim etiam
 quòd multitudo vacuatione sit diminuta, quippe pri-
 mis duobus mensibus foetus paucum ad se sanguinem
 attrahit, eò quòd parum adhuc auctus sit: ubi verò
 iam creuit, tunc plurimo indiget alimento: atque tunc
 non id, quod optimum est è venis allicit, verum etiam
 quia maiorem alimenti copiam requirit, aliquid vitiosi
 simul attrahit: & ita fit ut vniuersum corpus plenum
 esse desinat, & minori humorum vitio crucietur. Idem
 tamen affectus cum viros inuadat, ut diximus, ob hu-
 morem

morem vitiatum ad os ventris delapsum, nequaquam etiam despiciendus est.

Victus autem hic instituen- Curatio.

us pro varietate vitiosi & pravi redundantis humoris.

Sed hoc cunctis commune est, ut cibus utantur mode- Victus ratio.

ratis, & qui non facile corrumpantur. sic panis succo

cotoneorum aut malorum puniceorum maceratus con-

fert; & cichorium. ex aulis neque pingues neque vi-

rose, pedes maximè ac rostra, & ventriculi porcorum:

& erinacei marini recentes. Cibi sint quantitate mode-

rati, & si cibos auersentur, obsoniorum varietate ac

iucunditate illectentur. Abstineant tamen à dulcibus

obsoniis: verum iis, qui terram appetunt, nihil ita pro-

dest veluti amyllum recens. Cunctis ante cibum confert

aliuas albas, muria conditas cum pane molli exhibere,

aut quinque vel septem amygdalas amaras: post cibum

autem vuae passæ, mala punica ac pyra præbenda. Potus

sit moderatus, ne alimenta ventriculo innatent; ac vi-

num fulvum, odoratum, antiquum & subastringens

bibant. Si vinum auersentur, aquam ex cinnamomo

decoctam potabunt: nostri verò, qui vinum non bibunt,

ceruissiam non tamen recentem, sed defecatam. Quod

ad medicamenta attinent, quidam hic dant magis di-

gerentia quàm fortiter laxantia. Si verò stomachus ab

acri, acidove, aut salso humore mordetur, ad excitan-

dum vomitum tepidam aquam bibere poterunt; ut

humor affligens reuomatur: alioqui si difficilis sit vo-

mitus, aliquid aceti seu syr. acetosi addendum volunt. si

crassius fuerit quod euomunt, & ob difficultatem diffi-

culter excernitur, raphani etiam decoctum cum aceto

mulso exhibebimus. nam omni studio conandum ut in-

festus humor citra molestiam per vomitum educatur;

præsertim ipsis vtero gerentibus, quibus nec medica-

Medicamen-
torum ratio.

Deu. Hor. fig.
l. 3 Epl. ad R.

mentum purgans dandum, iuxta aph. 1. lib. 4. cum in primis mensibus hic affectus oriatur. Sed viri si accidat, neque per vomitum sedari possit, purgans medicamentum dandum: prius tamen syr. quibusdam adhibitis, pro ratione redundantia pravi succi, vt oxylach. acetos. vel oxymel, vel scillinum; deinde hiera-picra purgandus, vel agar. & rhab. alij vomitum à cibo frequentem iuuare aiunt: & medicamenta laudant, quæ ad anorexiam commendant, vt cass. thamar. diacarb. & triph. persicani; syr. ros. laxat. de fumeter. compos. & serum lactis cum infus. myrobal. vel sol. sena, quæ frequenter exhiberi volunt, nempe quatuor vel quinque vicibus, vt Rondeletius iubet. Deinde ventriculi intemperiem corrigunt, si qua sit contraria ex recrementis; idq; topicis remediis, prius de intemperie ventriculi dictis, cum de imbecillitate eiusdem ageremus. Aetius, euacuato humore vitioso, lib. 9. cap. 23. exhibet mali punici dulcis succum, mentha sicca inspersa, & portulacæ cremorem, & ipsam quoque in cibo; & alia quæ apud ipsum inuenies: & forinsecus topica languido stomacho imponit, œnanthe, balaustium, ros. & citinum cum vino cataplasmatis modo, aut absynthium cum palmarum carne vino incoctum: vel cotonea cum posca & rosaceo, vel nardino cerato excepta: tum alia quæ ipse commendat.

Topica.

OBSERVATIO VIII.

De Anorexia seu inappetentia, vel cibi fastidio.

IOANNES Theodorus Harperus, consularis vir apud Delphenses, cum inappetentia laboraret, ad incitandum appetitum vnà cum Henrico Vergerio

gerio medico Haghano, sequentia præscripsimus:
 ℞. syrupi de limonibus, de acetos. citri ana ℥ ij.
 syr. acetosi simplicis, syr. ros. ex multis infus. vel
 muchari ros. ana ℥ j. syr. menthacei ℥ j. ss. Capiebat
 omni manè duo cochlearia paucò vino Rhenensi
 addito. egregiè profuit. Verùm post discessum
 alterius medici, cùm medicamenta abhorreret,
 macerabam per noctem absinthij Romani co-
 mam & dentis leonis radicem vnam atq. alteram
 paululum contusam, in vino Rhenensi: manè
 vinum expressum propinabam. & dictu mirum,
 vir septuagenarius, vermem mortuum, postea &
 viuū, deiecit, & appetitus miraculi instar rediit.

SCHOLIA.

SI suctionis sensus in ore ventriculi pereat (teste
 Gal. 1. De causis sympt.) vel suctio non fiat, aut cor-
 pus ipsum nō inaniatur, affectio excitatur à Grecis com-
 munitè dicta ἀνοξία, & à Galeno: modò ἀορία, vt
 patet comment. aph. 17. lib. 4. ab Hippoc. autem præci-
 tato aph. 3. lib. 6. ἀπορία nuncupatur. & aph. 61. lib.
 5. ἀν, cibi fastidium ab Hippoc. & Galeno appellatur: à
 Latinis modò cibi fastidium, interdum inappetentia
 dicitur; quanquam inter ἀοίτες & ἀποίτες, hæc diffe-
 rentia tradatur à Galeno 1. De morb. vulg. vt etiam
 Donatus annotauit, quòd illi appetentia carentes cibum
 non sumunt; alij oblatos fastidiunt: quæ quidem affe-
 ctio contraria existit canina appetentia. Namque in
 illa modicè appetunt: in hac nullo modo, ac nihil appe-
 tunt. Appetentia nedum oblesæ, sed abolita, pertinet ad
 symptoma in genere noxiæ functionis animalis, & pro-
 priè ablata. Est q̃ pars affecta, os ventriculi, nempe

In cibi fasti-
 dio seu inap-
 petentia quæ
 pars afficia-
 tur, & quis
 affectus.

Causæ.

lesum. & huius curatio etiam deferuit ad exiguam & imbecillam inappetentiam. Dictarum affectionum seu inappetentia, iuxta Alexand. cap. 7. lib. 7. aut intemperies quadam aut humores in stomacho contenti causas sunt. Sic & Paulus lib. 3. cap. 37. duas fastidii causas ponit; aut vitiosam stomachi intemperiem, aut humorum redundantiam. Fit autem à causis contrariis his, à quibus fames excitatur; scilicet propter plenitudinem ventriculi, vel quod inanitionem nullam sentiat os ventriculi. non sentit autem, si plenus sit ventriculus recrementis dulcibus: illa enim satietatem faciunt, ut acida appetitum. pituita etiam insipida, vel sanguis in ventriculo collectus faciunt satietatem. biliosa recrementa, non quod ventriculum replent, sed quod eum supra modum calfaciunt, appetentiam deiciunt: calor enim solida corpora laxando dissolvit, atque ad attractionis functionem reddit imbecilliora. Nam, ut frigus appetitum auget, sic caliditas eundem destruit; quemadmodum & medicamenta calida, dulcia, pingua, & vina generosa, ut Hippoc. scripsit: Torexis famem sedat. vinum autem quia calfacit, & subito nutrit, famem auferre dicitur. Quare qui coenam aut prandium à potu vini inchoant, hi parum aut nihil comedunt. Bibones quoque raro appetitum habent. Pingua verò, quia ventriculum relaxant, & quodammodo resupinant, appetitum deiciunt. Delicitur & post morbos acutos; in quorum principio multum alimenti assumpsere: id quod Hippoc. scripsit aph. 32. lib. 2. Omnes fere qui malè se habent, circa initia cupide comedentes, nec quicquam proficiunt, ad postremum nihil appetunt: qui verò circa initia cibum fastidiunt, postea bene appetentes, hi in melius euadunt. Post chronicos etiam morbos

morbos fit, quòd ex his facultatum naturalium vis fit deiecta, in morbis præterea, in quibus non est facta insignis euacuatio per ventrem: item in omnibus internis inflammationibus, ob calorem ventriculi: in fluxibus præterea ventris, vel propter imbecillitatem, vel quiacrementa defluunt in ventriculum; ut quando pituita à cerebro in ventriculū descendit, & excrementa sunt spumosa. Deicitur & appetētia ob relictū exercitium, aut quia nulla aut pauca fit resolutio; ut in multis obes; in his qui consueverunt frequenter coire, & non amplius coeunt. Aliqui cibos non appetunt, quia priusquam esuriant, iuscula aut alia alimenta assumunt: quod saepe egrotantibus contingit, ob muliercularum importunā diligentiam. Vidimus in morbis quibusdam adeò increuisse inappetentiam, ut nihil vel modicū sumserint. Sic religiosam quandam apud diuam Barbaram Delphis, annos 65. natam, anno 1562. ictero morbo correptam (cui & fluxus ventris perpetuò aderat) instar saponis nigra deicientem, cui & vrina venera, nigra, passea, copiosè profluebat, corpore squalido & exsiccato, post sex septimanas planè exhaustā decubuisse, nihilq; bibisse aut edulij sumpsisse, præter grana quadam mali citrini seu granatorū, illa in ore detinendo & exiguum succum sugendo. Ad quam Pater illius conuentus me deduxit, non sanandi, sed miraculi causa, quòd iam diu vixerat sine potu ac cibo: quamuis altero die quo ad illam me deduxerat Pater, hæc obierit. Sed & illud quod nunc referam, magis admiratu dignum esse existimo: Puella erat annos 27. nata cum dimidio, quam anno 1566, xj. die Maij vnā cum chirurgo inuisimus, ad partem orientalem ipsius vrbs Delphensis decumbentem. Hac autem ab anno 16. ætatis suæ perpetuò

*Eandem hanc
alibi repetit.*

Puella Historia
mirabilia
xj. annis le-
cto decum-
bentis.

Scollixe casus.

lecto decubuerat, atque iam vndecim annis nihil aliud
 sumpserat quam casei momentū vulgari lingua Stolkij
 dicti, muliere adstante nobis narrante; nihil enim
 liquidi aut potus deglutierat, licet mediocriter mingeret:
 verū singulis octo diebus tantum semel aluum
 deponebat. insuper caca nata erat, quamvis mediocri
 valetudine frueretur ad annum decimum sextum a-
 tis suae. Ab eo autem tempore, terrore correpta, in hanc
 malam corporis dispositionem lapsa fuit; ita ut vnde-
 cim deinde annis subsequētib; numquam lectum
 egressa, etiam nunc lecto decumbat; ac semper in de-
 terius malum progressum fuerit: adeo ut anno aetatis
 suae vigesimo, venter in tumorem haud exiguum attol-
 leratur: atque omnes eam eo tempore (ut assistens mu-
 liercula narrabat) pro hydropica haberent. sed paulo
 post detumuit venter, praeter rationem, & subortus est
 rugitus in ventre vehementior, ac murmur quoddam,
 tamquam rana viua crocitanter in ventre latitasset,
 cum motu quodam ingenti ac vehemēti sublatione,
 mox depreſsione, tum ventris tum thoracis, instar flu-
 ctuum maris sese commouentium: qui motus adeo va-
 lidus erat, ut etiam nos manum ventri admoventes,
 eundem cohibere minimè potuerimus; ita ut is motus
 manum nostram attolleret. Rogavi puellam numquid
 dolorem sentiret? imò maximum, respondit. Insuper
 aiebat (quod valdè admiratu dignum erat, etiam mu-
 liercula adstante idem annuente) quod motus ille ad
 plenilunium augeretur; & simul cum affluxu maris,
 in maiorem eleuationem totus venter tum pectus mi-
 rum in modum attollerentur; & maris fluxu recedente
 simul motus ille decreſceret & minueretur. Hic autem
 motus septem annis durauerat. mirum quod puella tota
 vitiosa,

vitiosa, superuixerit. Rogabam quoque numquid mentes tempore consueto fluxissent. sed pudica, ac mente constans rubore quodam suffusa, non respondabat; muliercula tamen assistente annuente, singulis decem septimanis certa quasi periodo profluere: sed admodum corruptas purgationes esse referebat. Cum autem animaduertirem portentosum morbum esse, minimeque naturalem, licet astantes causam referrent in terrorem, à quo malè habere prius cœperat: ideo habita huius puella genitura (quæ nata dicebatur anno 1538. 25 Octobris die, circa quartam ferè horam, post meridiem) iuxta astrologorum decreta perscrutari volui numquid ab astris aliqua causa probabili coniectura haberi posset. Erant autè tunc in medio cali stella nebulosa, quæ sunt cum oculo sagittarij; & in occasu nebulosa, quæ est in aculeo scorpionis; luna in octaua & Sol in septima, in loco opposito vitæ. Hæc cacitatem decernebant, iuxta Ptolemaum. Sol quoque cum cauda Draconis & Saturnus in sexta, & Luna in octaua, & Mars dominus ascendentis, decumbens cū Venere, portentosam & valdè vitiosam genituram declarabant. solus Iupiter in tertia domo in quadrato Saturni vix vitæ sustentabat. Ita vt hæc misera videatur, & brevis vita, ac valdè vitiosa; licet ad hoc vsque tempus vixerit tamè morbosa. Sed hæc extra metam medicinæ, cū ad Astrologiam pertineant. coniecturalibus enim signis ac causis non ita insistendum, vt iis quæ ad medicinam faciunt. Hoc tamen pro miraculo aut magis pro ostento habetur, quod tam diu sine potu vixerit, solo modico caseo vtens. Ideo à curatione destitimus, cū & illa omnia remedia tum medicos ipsos respiceret. Multa certè apud nos latent: vt etiam de illa triennali inedia puella Spirensis, de qua

de qua meminit Ioannes Langius medicus doctissimus
 2. epistol. suarum Miscell. epist. 27. Quæ quidem causæ
 adeo obscuræ sunt, ac soli Deo cognitæ, licet ex terrore
 (vt huic puellæ contigit) pessimos posse oriri morbos
 sciamus: vt etiam ex ictu bombardæ, vt alias narraui-
 mus: militem enim cognouimus, qui ingenti eius fra-
 gore, cum bombardas admodum magnas emitteret, in
 perpetuam maniam inciderit. Narrat etiam Benedictus
 Veronensis, medicus insignis, 46. diebus continuis, quen-
 dam Venetiis ieiunum habuisse, habitudine membro-
 rum frigida, crasso phlegmate intus & inconcocto
 meatibusq; corporis adstrictis. Pudet etiam (inquit)
 referre de virgine sacerdotali, quæ ætate nostra ine-
 diam pluribus mensibus sustinebat. Illa quoque in mi-
 raculum patribus Romæ venerat, vnde experimentum
 pluribus custodientibus dedit, Columba nomen. Sed
 ad causas anorexiæ reuertamur, quas iam paulo anti-
 enarrauimus: quæ ipsa etiam exemplis subsequenti-
 bus facile innotescunt, vt & quibus modis eas ipsas distin-
 guamus; & sic etiam melius curemus.

OBSERVATIO IX.

*De Anorexia ex humore bilioso, cum ventri-
 culi intemperie calida.*

APPETENTIÆ amissio quamuis contin-
 gat si corpus non inaniatur, vel ob ca-
 lidam ventriculi intemperiem, vel à sanguine
 immoderatè misso, aut si venter intestinaque
 immodicè fluxerit: plerumque tamen appetentia
 prostermitur, humorum aut biliosorum, cum in-
 temperie ventriculi calida; aut pituitosorum cum
 intemperie

intemperie frigida, in ventriculo contentorum vitio. Sic iuuenis valdè macilentus, ob biliosos humores cibum auersabatur, cui & sitis tum nausea aderant, & præcipuè ventriculi morsus: quem hoc modo curauimus: cum enim mordaces humores biliosi ventriculum lancinarent, & hic nauseabundus & in vomitum satis procliuus esset: statim ieiuno ventriculo ℥vj. aquæ tepidæ propinauimus, ℥j. syr. acetos. simplicis adiecta: digitos in os & fauces dimittendo vomitus commodè eliciebatur. Aliqui hinc, vt Paulus & Alexander, priusquam aquam tepidam cum aceto vel syr. acetoso exhibeant, tepidè agro alimenta humectantia, veluti pisana cremorem vel ouorum lutea dant, deinde exiguo tempore interposito, vomitum prouocant: nam is sine noxia is est utilissimus, teste Alexandro Tralliano. Alioqui, si difficiliùs arger vomuerit, melius est materiam ad ventrem prouocare, copiosiore temperatoque alimento priùs humectatam, vt idem Alexander refert. Sic alteri, qui difficilè vomebat, aquam hordei, pauco zaccharo innixto, cum syrupo viol. modò aquam hordei solam cum syr. viol. ex infus. ros. & de succo cichorij, aliquot vicibus dedimus: quæ etiam huic, post vomitum, ad contemperandos humores & alterandos, exhibuimus. Deinde pro leui purgatione propinauimus syr. ex infus. ros. pallid. ℥ij. cum ℥iij. seri lactis: qua potione breui, bene excreuit biliosa: alioqui exhibuissem rhabar. infus. vel mannâ, aut cassiam, cum decoct. thamarindorum. Bilioso humore euacuato, calidi ventriculi intemperiem
in hunc

in hunc modum alteraui: ℞. syr. de succo acetos.
 de acetos. citri, & granatorum acidorum ana ℥ ij.
 dentur ℥ ij. ante pastum. his & confert syr. de per-
 ficis. & pro alteratione & roboratione miua co-
 toneorū, & cotoneum ipsum zaccharo conditum,
 & syr. citri acidus, cum aqua hordei. Imperaui
 quoque vt persicam in principio pastus assume-
 ret; hæc enim maximè appetentiam incitat, si a
 causa calida prostrata sit; vti hîc erat. Serapium
 verò de persicis hunc in modum fit, quo vti
 possumus in tali casu: ℞. succi persicorum, quatuor
 nondum plenam maturitatem sunt assecuta, lib.
 iij. decoquantur vsque ad dimidij consumptio-
 nem: permittantur subsidere fæces; deinde adii-
 ciantur succi malorum punicorum ℥ vj. zacchari
 q. s. simul perfectè coquantur, depurentur, ad-
 iectisque santalis citrinis q. s. suauiore odore red-
 datur. Dantur ex hoc syrupo ℥ ij. manè & ve-
 sperî, duabus horis ante pastum. Si persica
 defunt, pro illis substitui potest succus pomorum
 acidorum redolentium, minimè dulcium. Interea
 hoc condito vsi sumus: ℞. confertæ acetosæ, ros.
 ana ℥ j. β. corticis citri conditi ℥ β. diacydonij sine
 speciebus ℥ j. pul. specier. trionf. ℥ j. corall. rub. ʒ j.
 cum syr. ex malis punicis, vel persicorum, si adsit;
 fiat conditum molle. capiebat ad magnitudinem
 castaneæ, manè & vesperî, horis duabus ante pa-
 stum. modò etiam capiebat rob de ribes, & rob
 granorum Veenlandiæ, apud nos egregiè incitans
 appetitum, ex causa calida deiectum, & ad stoma-
 chum calidum & sitim exinguendam valens:
 quo in multis felicissimè vsus sum. Exteriùs verò
 fotum

fotum adhibuimus: & ros. rub. m. j. folior. acetosæ
 & intybi satiui latioris ana m. β. absinthij sicci
 & communis & Romani ana p. j. sem. coriand.
 præpar. ʒ ij. sumach, baccar. oxyacanthæ ana ʒ j β.
 specier. diarod. abb. ʒ j. decoquantur in s. q. aquæ;
 adiectis succi cotoneorum ʒ iij. aceti ros. parum;
 fiat fons, cum spōgia immersa & expressa. eaque
 calente ventriculi regio foueatur manè & vesperi
 ante pastum: deinde vng. infra scripto vngatur:
 & olei cydon., ros. myrtei ana ʒ j. olei absinthij ʒ
 β. corall. rub. coriand. præp., santal. citrin. & rub.
 ana ʒ j. flor. ros. rub. pulueris. ʒ ij. trochis. de ca-
 phura ʒ ij. aceti parum, ceræ q. s. fiat vng. deinde
 apposui ceratum santalinum. Victu quoque
 refrigerante vtens, & moderato somno, & quiete
 & cibis refrigerantibus (Paulus autem dat panem
 posca imbutum, etiam in potu) vt lactuca & ci-
 choreo, ex aceto: ex volueribus mōtanas sumen-
 do pedesq. suillos, tum alia (quæ etiam ab Aëtio
 commendantur) hic rectè deinde valuit.

S C H O L I A.

SIGNA verò qua calidam intemperiem notant, Signa.
 Siam antea diximus: adest enim sitis, oleosusq. ru-
 ctus; Paulo auctore. quibus si & biliosi humores accesse-
 rint; etiam ventriculi rofiones, nausea, & sitis, subinde
 & febris hos sequitur. In intemperie frigida, contraria
 superius adesse diximus: illi enim non sitiunt & acida
 eructant. si simul adsint crassi viscosiq. succi, ñ neque
 rofionem ventriculi, neque sitim experiuntur: & si in
 sinu humores existunt, nausea & vomitu premuntur.
 si infarcti tunicis inhaerescunt, nausea solum non vo-

Prognostica.

Curatio in
Intemperie
calida.

mitu afficiuntur. Immodica autem corporis plenitudo
praesertim humorum crudorum inanitionem prohibens,
inappetentia causa fuerit, quemadmodum vrsis, &
quibusdam latentibus aliis animalibus euenit, quae per
multum tempus à cibo abstinent, maxime hybernationis
tempore, haud difficulter dignosci poterit. Similiter
etiam si propter quampiam aliam causam, utpote
cutis densitatem, aut otiosam vitam impedita fuerit
inanitio, & per consequens excitata inappetentia. At
calidi fuerint viriosi succi, totum corpus occupantes,
praeter alia signa, rigor aderit, & febris cum cibi fasti-
dio, seu inappetentia, quae haud negligenda erit, cum
sit ad vitam necessaria ipsa appetentia, Galeno testi-
aphor. 3. lib. 6. Quamuis si iuxta principium morbo-
rum accesserit, aut iuxta vigorem, cum vires adhu-
sustinere possent, nihil molestiarum infert, Aetio au-
tore cap. 20. lib. 9. modico tunc alimento agri opus
habent. Si vero in declinatione totius morbi appe-
titus perditio accedat, aut in diuturna imbecillitate
aut viribus debilitatis, aut ex immodica euacuatione
periculo non vacat, ex eiusdem auctoris sententia. Au-
getur etiam affectio hac ab aetate: incommodè enim
pueri hoc malo afficiuntur, utpote qui voraces naturae
sunt, & assiduo fomite opus habent. Quare magnus
praeter naturam excessus significatur, si pueri perditione
appetitus fuerint affecti. Quomodo autem curetur ca-
lida intemperies, iam diximus: nempe victu refrigeran-
te: eligendo aërem frigidum, & singulis diebus excre-
menta alui educendo, natura vel arte, nempe clysteriis:
vitando anxietates & reliquas animi perturbationes.
quidam hic commendant cibum refrigerantem; etiam
oua sorbilia, testes gallorum; & ex volucribus non

grauē.

grauolentes. alij conantur & appetitum renouare per
odoramenta, ex posca aut vino diluto aut maiorum
cotoneorum, seu odoratorum pyrorū decocto, vel aquæ
ros. ℥ iij. aceti vini albi ℥ j. santalorum omnium ℥ ij.
miscantur; & fiat odoramentum. Extrinsecus quoque,
vt iam ostendimus, stomachum fouemus, corroboramus,
& intemperiem calidam alteramus, vt oleo ros.
omphacio, cydoniorum, adiect. succo lactucæ, ciuorij,
portul., vel solani ℥ j. santal. & corall. rub. ℥ j. cum
paucis aceto & cera exigua; fiat vnguentum: vel cydo-
nium posca decoctum & contusum stomacho appeni-
to. eo tempore valet & frictio corporis atque pedum,
manuumq; palpatio, & contrectatio moderata; teste
Aëtio; & saccelli, de quibus sapius dictum est. Si adsint
etiam humores biliosi, curatio iam satis constat exem-
plo superiori. Quomodo autem curetur intemperies
frigida, etiam cum humore pituitoso, sequens exem-
plum ostendet.

OBSERVATIO X.

*De Inappetentia ex pituitoso humore, cum
intemperie frigida ventriculi.*

PVELLA pituitosa, mali habitus, ventriculo frigido cū afficeretur, pituita etiā collecta fuit in stomacho, vnde ructus acidi, & ventriculi inflatio subsequēbantur: nulla siti premebatur, feruentia amabat, pituitam crudam sæpe euomebat, quæ appetentiā adeo læserunt, vt dulcia omnia & vinctuosa & insipida, & omnem cibum tandem abominaretur. Ad quam curandam admissus, tentabam numquid pituita vomitu

educi indeque auelli posset. Siue enim is humor in ventriculi tunicas sit impactus, siue secundum internam spatij latitudinem in eo contineatur, experiundum an vomitu educi ac euelli possit. Et quia videbatur non admodum difficulter vomere, dedi aquam tepidam, cum oxymelite; digitorumq. immissione cibum tum pituitam simul euomuit: quæ tamen erat tenax (quamquam aliquando contingit vt biliosa & pituitosa quadam euomantur, quæ perdit appetitus in quibusdam sunt causa; atque ita ab hac accessione liberantur:) cum hic igitur humor pituitosus esset, quiq. vomitu non perfecte eductus erat, nobis utile visum fuit, vt is incideretur, atque extenuaretur in hunc modum, cum crassus & viscidus esset: \mathcal{R} . oxymel. simplicis, scillini, mellis ros. colati ana \mathfrak{z} j. aquæ absinthij, menthæ, fœniculi ana \mathfrak{z} ij. misce pro ij. dosibus. fuitque hoc repetitum bis terve, donec materia probe cocta videretur; quam tunc ita purgauimus: \mathcal{R} . elect. hieræ picræ Gal. \mathfrak{z} ss. dissolve cum \mathfrak{z} iij. iuris cicerum rubr., & detur in diluculo: quo medicamento aluum satis bene deposuit. aliàs ob amaritudinem damus pilulas de hiera; & ita postea, cum hæc ipsa nondum satis purgata esset, post tres aut quatuor dies subsequentes pilulas denorauit: \mathcal{R} . pilul. ascephang., de hiera simplici ana \mathfrak{z} ss. cum aqua absinthij: fiant pilulæ v. postea etiam ex \mathfrak{z} j. pilularum dictarum confecimus pilulas vj. è quibus tres per horam ante cenam semel aut bis singulis septimanis sumpsit. Vltimò tam medicamentis assumptis quàm ad motis ventriculum roborauimus: sumebat

mebat enim singulis diebus duabus horis ante
pastum manè & vesperi duo argentea cochlearia
syr. absinthij, per se, vel cum liquore stillatitio
chamæmeli. Dedimus quoque diacalaminthen,
vel diatrionpip. ad ʒj. modò tabulas arom. ros.
sine musco, duabus horis ante pastum ʒij. Sic
alteri viro eodem malo laboranti post vniversalia
remedia commodè exhibui ʒj. theriacæ. At
nostra puella etiam hoc condito vtebatur. R.
conseruæ absinthij ʒij. corticum citri zacch. con-
diti ʒj. specier. arom. ros. sine musco, specier.
diacinamomi ana ʒj. cum syr. conseruationis ci-
tri, fiat conditum molle: capiat omni manè ad
magnitudinē paruæ castaneæ, duabus horis ante
pastum: & superbibebat parum vini meri. Exte-
riùs verò ventriculum inunximus vnguento se-
quenti: R. olei nardini, mastichini ana ʒj. olei
absinthij ʒij. menthæ siccæ, ligni aloës, caryophyl.
pul^{torum} ana ʒj. olei maceris ʒij. ceræ q.s. fiat vn-
guentum. vsi sumus & ante inunctionem fotu
ex decocto absinthij, menthæ, calaminthæ, sisym-
brij; cui specier. arom. ros. ʒij. vel iij. in fine post
colaturam iniectæ erant, in vino mero decoctis:
in quo calente spongia, aut lana succida madesa-
cta & expressa, ventriculus manè & vesperi ante
pastum fouebatur. Deinde inuncto ventriculo
vltimò hoc emplastrum apponebatur: R. empla-
stri stomachici, emplastri mastichis, ana ʒi. ʒj.
coralli rub. ʒj. ʒj. absinthij sicci ʒj. galangæ ʒij.
subigantur cum oleo nardino & menthaceo, &
singatur emplastrum vel ceratum (adiecta cera si
opus est, ad maiorem soliditatem & cohæren-

tiam) ad scuti formam, quod ventriculo post
 forus vel inunctionem applicetur. Auferebatur
 autem cum cibū agrotus sumeret, hoc est, pran-
 dij & cenæ tempore, ne sua stipticitate cibum in
 ventriculi fundum descendere prohiberet. præ-
 terea præcepimus ut pastus initio pane asso cum
 vino macerato, adiecto paucō zaccharo, vteretur:
 in pastus verò fine puluere sequenti, aut huius
 amul: r. coriandri præparat. ʒj β. diacydonites
 cum fociebus ʒj β. anisi, cinnamomi select. ana
 ʒij pellicul. ventriculorum gallinarum præparat.
 ʒiij. β. zach. albiss. ad pondus omnium; fiat pul-
 vis: quo in fine pastus vtebatur. Hoc enim mo-
 do non solum hæc puella, sed alij plurimi appe-
 titum deperditum ex intemperie frigida cum
 humore pituitoso receperunt.

S C H O L I A.

Quæ in ca-
 lida intem-
 perie & hu-
 moribus ca-
 lidis conue-
 niunt.

HAC affectio curatur contrariam causam indu-
 cendo: si enim ex intemperie calida, ut iam præ-
 cedente scholio diximus, oriatur, curatur eam tollendo
 & alterando cum frigida. Si autem humor simul vitiosus,
 nempe biliosus, vomitum deiectione vacuandus, ut
 iam diximus. quibus etiam convenit decoct. tamarind.,
 prun. acid. & sebesten cum syr. ros. vel rhab. In crasti-
 num medicamenti duobus horis ante pastum quidam
 propinant aquam frigidissimam, modo ventriculi im-
 becillitas, aut aliud non prohibeat. Cibi condiantur
 multis acidis, omphacio, succo arantiorum: oliua, cap-
 pares, fœnicul. marinus & condita & salita conue-
 niunt; & pisces salsi non pingues ex aceto. clysteres
 iniiciantur, quibus recrementa intestinorū abluantur.

Et, ut

Et, vt breuiter dicamus, in quibuscumque deficitur appetitus ob causam aliquam ventriculum calefacientem, vt medicamenta & alia, refrigeratione curantur: ita quoque si ob satietatem comedere nequeunt, ieiunent: quibus verò ob plenitudinem ventriculi appetitus tollitur, totius corporis euacuatione curandi: quibus ob derelictum exercitium, aut venerem, exerceant se, & coeant modicè. Si frictiones solitæ non fiant, iterum procurentur. Qui ob recrementa in ventriculo collecta hoc morbo tentantur, sunt euacuandi vomitu aut deiectione. Si verò ob frigidam intemperiem, cibos fastidiunt, contrarius etiam medendi sunt tum cibus tum medicamentis. Ab Alexandro commendantur ius columbæ, vna passæ; pro potu vinum vetus; decoctum rutæ, anisi, scenic. aut cinamomi, aut piperis ex aqua. diatrionpipereon, diaspoliticum ex Gal. 6. de sanit. tuenda. & theriaca iuxta Alex. & succi absinthij potio & syr. medicamenta ex zanzibere & pipere confecta: de quibus videas Donatum. Extrinsecus stomachus corroborandus foru, saccello, vng. & ceratis, vt iam antea ostensum est. Si vnâ adest pituita, curetur vt iam in obseruatione precedenti dictum est: quibus valet syr. acetos. incidendo & detergendo pituitam & vomitum prouocando. Valet oxymel, & cappares cum oxymelite, & oliuæ ex muria, vel oxymel. condite, vel oxymel Iulianum iuxta Paulum & Alexand. Prosunt & pilula ante cibum sabellina, de hiera & compos. ex hiera picra, 6. De sanit. tuenda. etiam illa quæ postea corroborant tam intus assumpta quàm extra admota, vt iam exemplo precedente ostensum est. Si verò ex virium imbecillitate appetitus perditio contingat, considerare oportet qualis intemperies vires resoluat; &

Ex causa calida.

Ob satietatem, ob plenitudinem ventriculi, ob exercitiū derelictum, aut venerē.

Si ex frigida intemperie fiat, curatio.

Ex humore pituitoso.

Si ex imbecillitate virium fiat, curatio.

Si *suctio*
non fiat.

Si à corpore
pleno.

Ex cutis den-
sitate.

Ex visceris
inflammatio-
ne vel ab vl-
cere stoma-
chi, curatio.

Rusticus fa-
stidio cibi
laborans post
aliòs mor-
bos.

per contraria eam ipsam corrigere. ita quoque si post euacuationem aut morbum fiat, reficiendi. Si in febre vel post febrem appetentia auferatur, vel diminuat, recurre ad exempla, quæ in libris nostris De febribus retulimus. At si propterea quod *suctio* non sentitur, cibi fastidium accidat, cerebro aut nervis ab eodem ipsi stomacho distributis, prospiciendum erit; & cognita eiusdem causa, eam prius auferre necesse est. Si autem propterea quod totum corpus plenum existat, eiusdem corporis inanitione non peracta inappetentia fiat, idem vacuandum est, diuersimodè tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferant. iis etiam quæ cutem rarefaciunt, utpote balneis ac frictionibus, ut oportet, ubi ex cutis densitate eadem inanitio fiat. Ceterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, ut inquit Aërius. At si ex ulcere in stomacho aut ventriculo existente ortum ducat inappetentia, ab omnibus acerbis & cibis, & potionibus adstinere oportet; ac vii medicamentis quæ leniunt: puta sorbitionibus absque oleo, tum iis quæ ex amylo, lemnia terra, & lacte, vel quæ melle paucissimo conficiuntur, ut quæ purgent citra rofionem, ex Pauli mente. Extrà verò ex palmulis, & cydoniorum carne, & polenta, epithema facies: & ceratum ex melino vel rosaceo cum ammoniaco & thure. Reliqua vide de cibi fastidio, apud Alexand. Trall lib. 7. cap. 7. Oportet autem in omnibus habere rationem causæ: ita Rusticus quidam post continuu fluxum sanguinis narium tandem in stomachi dolorem & imbecillitatem incidit, & hepatis obstructionem (quod color citrinus totius corporis indicabat)

quasi

quasiam ad dispositionem cachecticam tendens, appetitu omnino desecto. Hic ad me, cum Alcmaria adhuc habitarem, consultandi causa accessit, cum variis & multis remediis medicorum imperitorum ac Empiricorum usus esset. Cui licet ob purgationes adhibitae venter satis fluere, nolimus tamen constringentia adhibere; cum obstructio adesse videretur in visceribus; & fecibus adhuc apparentibus corruptis, cum hepatis opilatione, quae appetitum deniciebat. Ideo apozema sequens praescripsi: R. corticum rad. petros. fœniculi, apij, cichorij ana ℥ss. absinthij Romani, dentis leonis cum rad. cichorij, mentha rubra, flor. ros. rub. ana ℞. j. flor. sord. p. j. sem. coriand. preparati ℥j. folior. senae a stipitibus repurgatorum ℥vj. sem. anisi ℥ij. myrobal. citrinor., Indorum (ob fluxum ut paulo mitior procederet euacuatio) ana ℥ij. vuarum cum arill. ℥j. fiat omnium decoct. in tribus part. aquae communis, & vna parte vini Rhenensis odoriferi. & ratione artis decoquantur in duplici vase ad lib. jss. stent deinde per noctem infusa: & confricatis manibus fiat colatura cum forti express. addendo syr. de cichor. Nicoli, cum rhab. syr. de mentha, de absinthio ana ℥j. cum albumine oui; depuretur decoctum, ac secundum artem clarificetur, & in eo pendeat nodulus infra scriptus: R. rhabar. selecti incisi ℥ss. agar. troch. specier. arom. ros. descript. Gabrielis, specier. diarod. abb. ana ℥jss. spica, s. hoenanthi, zinç. ana grana iij. fiat nodulus filo constrictus, exprimendus dum porio sumatur: quotidie verò in diluculo ex eo decocto sumens cyathum vnum tribus horis ante pastum, modò ter quaterve quotidie aluum excernebat; etiam foetida excrementa deniciens. atque ita profuit, ut aliis remediis aut medicamentis opus non fuerit,

imbecillitate ventriculi cessante, atque hepatis obstructione ablata. simul totius corporis curritas, tū etiam cachexia ita cessarunt, vt ilicò conualuerit.

OBSERVATIO XI.

De siti immensa.

VIR quidam biliosus immensa siti laborans, cum maximam caliditatem & siccitatem oris ventriculi pateretur; huic aquam solam exhibuimus cum paucò vino; nam aquam ferre non potuit: sicuti alius, qui optimè illam tulit sine vino. Alteri autem, cum nec vinum ferre posset, cum aqua, aquam cum aceto multum dilutam commodè dedimus, & syr. viol., cucurbitæ, aliaq. refrigerantia & humectantia illis dedimus, qui ab usu rerum salutarum admodum subundi euaserant. Multi sunt ventriculo imbecilliore, qui neque aquæ potum, synocho vel febre ardente laborantes, ferre possent, etiam sani existentes. vide de his exempla à nobis relata lib. 1. De feb. scholio obseruat. 13. De synoch. non putrida. Quibusdam enim frigidissima potio altius cordi insedit: cuius exemplum quoque habes apud Beniuenum De abditis rerum causis, de quodam Blasio suo familiari, qui ardentissimo Sole luspilæ incaluisse, & in cellula vinaria subterranea frigidissimum vinum ob sitim bibisset, ilicò defecit: quem tamen non sine graui noxa restituit. Noui etiam, inquit Galenus, qui exhausta siti cruciabatur cum viperam deuorasset (forte fuit dipsas) & messores, qui forte fortuna vinum biberant,

biberant, in quo quædam fera fuerat extincta: & eum qui ex veteri vino fuerat inebriatus: item & eum qui sitim tolerare decreuerat: denique eos qui in naui deficiente aqua, marinam aquam bibere ausi sunt, quòd siti immoderatior, quàm reliqui cruciarentur; etenim soluta aluo, ac torminibus vehementer cruciati, celerius quàm reliqui interierunt. Noui etiam quendam ardente febre laborantem, qui increscente etiam dum morbo, aquam frigidam liberaliter bibens, satiari non potuit, donec moreretur. Itaque circa ventriculi appetentiam huiusmodi euenire possunt errata. hæc Galen. Scribit Amatus cent. 2. curat 62. de tribus qui ob potû frigidæ aquæ mortui sunt.

S C H O L I A.

IN siti immoderata vel vehementi perpetuò, iuxta Galen. 1. De caus. sympt. & 6. De loc. affect., os ventriculi affectum est, quamquam non semper primariò, sed quandoque per consensum, vel iocinore & maxime si ma eius parte, vel pulmone, vel mesenterij venis seu ieiuno inflammatis: ex loco citato Gal. & apud Alexand. cap. 8. lib. 7. Est itaque ingens sitis symptoma in genere noxæ functionum, atque ipsius appetentia deprauata. Nec pro eius symptomatis notitia alia conscribenda sunt indicia, cum res ipsa ex laborantium relatione patefiat. Quod ad sitim inexplebilem attinet, quidam siticulosi sunt consuetudine continuata, ita vt nonnulli continuò bibant & continuò vrinam mittant, inter potiores ingenti palma. Gracia etiamnum potiores maximos effert, ebrios verò damnat. Nequè Germani, vt Itali aut Hispani, ebrietatem pro vitio habent. Apud

Quæ pars affecta in siti.

Quis affectus.

Graci potiores.

D S Gracos

Gracos tamen, matronas vinum bibisse iniuria est: inter nuptias in Creta solis viris datur vinum, inter mulieres lagena aqua circumferuntur. Eam commendationem bibendi L. Piso urbis Roma curator à Tiberrino factus tulit, quod biduo duabusque noctibus, perpotationem continuauerat apud ipsum iam Principem, Triumvirumque congressum rara gloria, inquit Plinius: quando & hac artem suis legibus constabat, non labasse sermone, nec leuaturum vomitione, & similia diligenti legum scito, contra bibendi fallacias: namque bibendi consuetudo auiditatem augeat. Scitumque est Scytharum legati, quanto plus biberint, tanto magis sitire Parthos. Inuentumque est mirum vitiorum solertia, ut aqua quoque per Hispanias, Galliasque, ac ultimam Britanniam, Germaniamque, cum frugibus suam ebrietatem faceret. Delphica urbs (in qua iam 34. annos medicinam feci, dum hac secundum colligerem anno 1592) ea gloria clara est, ob ceruisiam qua ad alias vrbes defertur. Sed Cretense vinum (inquit Alexander Benedictus Veronensis) Moronaticum dictum, gratiam ceruisiis ademit; magno enim precioso ebrietas apud exteras nationes emitur, 30. aureis do. lium venundatur. Veteres in ea bibendi gloria variis quarebant sitis incitamenta, pumicis farinam, aut cicutam, ut metu mortis bibere cogerentur. Hoc in vniuerso instituto Machometus, alioqui salacissimus legum conditor, non damnandus est, quia vinum gentibus legem sustulerat, ut ebrietatis portentosam libidinem, iucundumque in homine nefas adimeret: iis halitus sceridi non sunt, nec aliam quarunt ebrietatem, unde iurgia & vulnera oriantur, nec mortifera loquuntur, non obliuio fit, faciei pallor, non furiales somni, non tremula manus effundentes plena vasa, fiunt: interemptis non putrida

Ceruisia.

putrida iocinora inueniuntur; vnde frequens morborum iniuria habetur. De hac siti loquuti sumus scholio obs. 29. De capitis dolore ab ebrietate lib. 10. de qua siti nunc non loquimur, quæ ex mala consuetudine fit, sed de ea quæ ab aliquo vitio in corpore latitante, aut aliunde orto fiat. Sitiunt itaque ob oris ventriculi calidam vel siccam, vel vitamque intemperiem, vel ob humores vitiosos in ore ventriculi putrescentes, biliosos atque salsos; & non tantum ob ventriculi os, sed etiam ob calorem iecoris, pulmonis, & ieiuni intestini, tam à causis internis quàm externis calfacientibus & siccantibus: & fit ab humido deficiente, aut calido superante. A dipsaco serpente morfi, inextinguibili siti ardent, etiam in diabete: & ij qui veteri vino indulgent: sic seruus apud Galenum ex veteri vino inextinguibili siti laborans, insomniculosus factus, febre ardente oborta, cum mentis alienatione, interiit. Contra alter in ardenti febre & accrescente morbo, multa frigida epota & in ventre subinde ebulliente, sitim validissimam passus est, ita vt inextinguibili demum aquæ potu interiret. Sitiunt & vulnerati sanguinis defectu. alij quoque ex cibis & porionibus calidis & venenatis, ex piscium salsamentis, garo, carne salita: etiam in phlegmatica febre; magis verò ex salsa pituita, in hydropismis. Signa generis per se nota sunt; sed causarum indigent distinctione. dignoscet autem, cum per consensum ab aliqua prædictarum partium inflammatione os ventriculi fuerit affectum, ex propriis signis inflammationum earundem partium. At si primario oblesum sit, nullum tale apparebit indicium inflammationis prædictarum partium. Si ex intemperie calida & sicca, ex iis quæ superius diximus, facile dignoscet: etiam si ex humoribus biliosis vel salsis contigerit:

Causæ.

Signa.

Signa causarum.

contigerit: falsi enim & biliosi ventrem mordent, ut diximus. Si quoque ex humoris inopia excitetur, facit ex infirmi loquela, tum ex iis quae precesserunt percipies (ita quoque de diabete) & tam causis internis quam externis. Nam ex caliditate & siccitate copularis, si premuntur in feb. ardentibus, & adurentibus omnibus ac aestate, graui aestu. plurima in lib. De feb. nostris habes exempla. Causa etiam externa à vino veteri, turpibus alius calfacientibus & exsiccantibus, ab agris vel aestantibus cognoscuntur. At si ex contrariis causis sitis nulla est, hoc fit quia sentiendi facultas demortua est in ventriculo; idque in febribus ardentibus & maximis exitium denuntiat. Est cum, praesente iusta causa sitis, non sitiant; tantum qui februitant: tum quia, ut modò dicebatur, extincta est sentiendi facultas ventriculi; tum quia à capite humiditas defluit, atque inde irrigat partibus, unde sitis incendi solet, non sitiunt. Verum ingentis sitis, de qua modò loquimur, non parui faciendae curatio est, cum si nimium inualescat, ex ea agri perire possint: quemadmodum Gal. nonnullos vidit immodicis sitientes perire ex diuersis causis, ac modis quoque diuersis; ut patet apud eundem libro 1. De caus. sympt.

Curatio. Quomodo sitis curetur, passim in libris nostris De febribus aliquando diximus, & praecipue lib. 7. obs. 24. de siti valida in feb. biliosa, praecipue in scholio, non solum quomodo sitis curetur in febricitantibus, verum etiam quomodo illi curentur qui ex siccitate sitiunt, & quae illis utilia sint: deinde qui ex copia caloris sitim experiantur, vel ex siccitate & caliditate sitiunt, vel ex humore bilioso, vel pituita salsa, aut ex paruum inflammatione. Sed quod ad praesens negotium attinet, causa ipsius sitis consideranda. Nam fit ut aliqui

sitiant

Signa prognostica.

fiat post cibum, vti solet contingere iis qui carnes
 salsas vel aliud quippiam salsi ingesserunt: sin ante
 cibum aliquis fiat, oportet alterum duorum esse, aut
 humorem biliosum vel salsum in ventriculo collectum,
 aut siccitatem, ob insignem aliquam euacuationem
 vrinae, aut sudoris, aut aliam à medicamento factam.
 Si propter siccitatem pulmonum aut tracheae arteriae
 proveniat, tunc fit vel à febre calida & ardente, vel
 ab aëre inspirato nimium exsiccante. Curatur itaque
 sitis, si sine materia sit, potu humido, vt aqua sola, vel
 paucò vino permixta, aut aceto etiam multum diluta,
 aut syr. viol. de cucurb. & aliis humectantibus & refri-
 gerantibus. Idem faciendum, si ab esu rerum salsarum
 fiat. Sin ob exsiccationem tracheae arteriae & pulmo-
 num fiat, magis inspiratione aëris frigidi, quam potu
 recreantur: ob id oportet fenestras aperire, per quas
 aura lenis ingrediatur, ad aëris cubiculi refrigerationem
 & agitationem. Inspergere oportet folia salicis, lactucæ
 & aliorum frigidorum & humidorum, maceratorum
 prius in aqua & aceto. Si à salsis humoribus, vel biliosis,
 euacuatione illius humoris, & alteratione opus est, qua
 fiet frigidis & humectantibus. Si igitur humor (inquit
 Alexand. Trall.) in ventriculo habetur biliosus, aliquod
 refrigerans & humectans adhibeto: quemadmodum
 siam si pituitosus fuerit, & id quod redundat, facit q̃
 sitim, salsum, ea quæ eiusmodi humorem repurgent, &
 abstergant, offerito. Ego sanè (inquit idem) noui eius-
 modi sitim à salsa pituita ortam, per salsos cibos fini-
 am fuisse, vt salsamenta & capparem. Quare non
 semper refrigerantibus humectantibusq̃ vtendum est:
 sed vbi causam accurate distinxeris, atque internoue-
 ris, tunc tandè congrua adhibenda curatio est. Proinde
 iis qui

iis qui ex siccitate, humectantia; illis autem qui ex
 caliditatem, refrigerantia; aliis vero, qui ob salsam po-
 ruitam, detergentia conueniunt. Ita quoque si pos-
 largam aliquam euacuationem fiat, cremore horde-
 vino bene diluto insperso, aut iusculo pulli sine sale se-
 dabitur, in quo decocta sint semina frigida maiora &
 herba humida. Si ob lingua & palati siccitatem, ablu-
 ant saepe os aqua frigida, additis duabus vel pluribus
 guttis aceti vel vini albi. Ad mitigationem sitis in febris
 bus, cum tinnemus nimium potum, vel ob hydropis pe-
 riculum, vel ob fluxum ventris, imperamus vt teneantur
 in ore vel pruna, vel cerasa sicca macerata in aqua fri-
 gida, & frequenter mutant; aut fructum pomi, aut eum
 mucilag. cydon. & psyllij vel gummi Arab. extractum
 cum aqua viol. remedia paramus; potius quam cum
 aqua rosar. cum illa exsiccet: sed propter odorem
 gratum nonnihil eius apponi potest; nisi dolor capitis
 adsit. Radix glycyrr. recenter e terra euulsa mastica-
 titur sedat. Vide apud Alexand. catapotia ad sitim an-
 cendam; & ad febricitantes, quibus parum bibere con-
 ducit: item ad insolatus & profectiones, vbi sitis virge-
 dulc. rad. dulc. 3 vj. sem. cucumer. satui 3 iij. trag. 3
 leuigata in vnum misceto, & albuminibus ouis
 adiectis subigito, fingitoq; catapotia, sub lingua conti-
 nenda. Si plura desideres de feb. vide lib. 7. obs. 24. e-
 qua Donatus ex Galeno, Aëtio, & Paulo collegit. Si e-
 defectu potus contigerit, abundanter tribuatur viribus
 consentientibus. si ex diabetica dispositione, ea curetu-
 si ex caloris copia ob edulia calida, vel merum vi-
 num, medela erit frigida potus, ex Gal. 6. De morbo
 vulgar. & Aëtio lib. 5. cap. 11. Si stomachus aestua-
 succus rad. dulc. vel radix ex aqua, & thyrsi lactuc-
 condita

condita. Si ex inflammatione iecoris vel aliorum viscerum, illa prius curetur: ita quoque si ex pulmonia fiat. Si à veneno, illud prius curetur: deinde adhibeantur quæ sitim sedant. Et ita quoque si aliorum membrorum communicatione fiat, blandienda sensim est, donec morbi curentur. Et quæ ex œsophago & gula arefacta evenit, somno (vt Hippoc. scribit) sedatur. Prosunt & gargarismata, hordeacea, & cibi frigidi assumpti. Hac de siti. Si plura desideres, vide Alexan. Benedictum Veronensem med. lib. II. cap. 25.

OBSERVATIO XII.

De Singultu.

Os ventriculi aliquando convulsione afficitur; quæ à Græcis λυγμός, ab Hippocrate aliquando λυγξ dicitur, à Latinis singultus: & est quidam motus vehemens ac violentus stomachi, quo rem infestantem expellere conatur, ex Gal. 3. De causis sympt. & comment. aph. 39. lib. 6. Fortior & vehementior est ipso vomitu: nam quæ vomitu expelluntur, in capacitate stomachi continentur: in singultu verò villis stomachi impactus est humor. atque hoc modo differt hic motus à vomitu. Afficitur hîc os ventriculi, vt 3. & 5. de loc. affect. constat, eò quòd sit exactioris sensus: quamquam iuxta Gal. comment. aph. 3. lib. 7. non solum os ventriculi, sed totus ventriculus ipse & pars ea quæ propriè stomachus appellatur (gulam nominant) affici potest; licet non ad eò exacti sit sensus. Continetur autem sub communi genere motuum illegitimorum seu deprauatorum,

prauatorum, 2. De causis symptomatum: & si
est symptoma in genere noxa functionum natu-
ralium ipsius stomachi deprauatarum; duarum
nempe, tam expultricis interdum quàm retenti-
tricis; primò expultricis motus non legitimus
secundo loco retentricis; de qua vide Galenum
& Donatum. Bifariam autem generatur, vel ex
repletione, vel ex inanitione: aliquando & febris
citantibus oboritur, vt exemplo ostēdimus lib. 1.
De feb. obs. 15. vbi etiā in scholio agitur de singul-
gultu, qui erat ex repletione. & lib. 7. obser. 31. de
singultu cum feb. acuta. Addemus & hīc vnum
exemplum: Pastor ille in pago Ryswyckio, homo
crassissimus, statura oblonga, per antiphrasin
Nicolaus paruus dictus; vir si quis alius ventri-
cosus & gulæ deditus, post febrem satis conti-
nuam & fluxum ventris ac vomitum, incidit in
singultum. Huic, cum ab omnibus pro deplorato
haberetur, decoxi semina anethi, carui, & portu-
lacæ, & papau. albi in ceruisia tenuiore. ex quo
decocto tantum cyathum vnum bibens, mira-
culi instar præter omnium opinionem à singultu
hic curatus est. Quamquam idem valde ingluui-
deditus & inordinatè viuens, quo ad potum &
cibum, alioqui homo satis senex, post annum in
hydropem incidit, ex qua etiam obiit. Sed illi
qui singultum in tertiana habebat perdurante
iij. diebus ac noctibus, Ioh. Tiengius decoxit in
j. sem. anethi ligati in globulo, in duabus pinti
ceruisiæ, quam ager bibebat calidè. prius tamen
illum purgauerat cum cassia & diacatholico, cum
decoct. end., cichor., viol. sum., borag. bugloss.
horde.

Leonellus
idem
cum
c. 32.
Briet.

hordei mundati, sem. 4. frig. maior. prun. & senæ,
 ob febrem, in sero lactis; & post decoctum anethi
 sumptum stomacho applicabat sacculos in aqua
 calfacta positos, & expressos ventriculo applica-
 bat: R. florum chamomill. meliloti, anethi ana m.
 j. orig. calaminth., rutæ, ana m. ß. incidantur, &
 fiant duo sacculi: quibus remediis cessavit sin-
 gultus. Oportet autem in singultu curando (vt in
 scholio latiùs) causam priùs animadvertere. Sic //
 ille qui singultu habebat ex ventositate, sequenti
 remedio euasit: R. philonij ʒ j. diagalargæ ʒ ij.
 detur cum vino. Alteri & hoc sequens profuit:
 R. theriacæ optimæ ʒ j. pul. diptami ʒ ß. exhibi- //
 tum fuit cum vino exiguo. Quemadmodum al-
 teri cuidam Antwerpiano, qui per continuos x.
 dies ac noctes singultum habebat, frequenter
 exhibitum est cochlear vnum calidè ex sequenti
 decocto: R. rad. inulæ recentis ʒ ß. coquatur in
 aqua fontis ad lib. j. dulcoretur zaccharo. Deinde
 sub noctem vna vice accepit ʒ ß. philonij Roma-
 ni: & statim cessavit singultus: quamquam & sto-
 machus inunctus est oleo mastich., cotoneor. &
 tereb. & absinthij; corpore tamen priùs repurgato
 cum elect. de dactylis & succo ros. Noui vetu-
 lam octuagenariam, matrem vxoris illius Ortelij
 à regina Angliæ missi ad comitia Batavorum:
 quæ per semi-annum subinde singultiebat; reme-
 diis nihil iuuantibus, nisi deuorato lech sano, //
 quo se tantum iuuari asseribat. quæ vetula postea
 relicto singultu, etiam nunc cum hæc adderem,
 viuebat; quamquam post duos annos lecto per-
 petuò incumbens, viribus exhaustis vitâ finiuit.

SCHOLIA.

Causæ.

SINGULTVS causæ inanitio & repletio. Qui ab inanitione, ferè lethalis est. sequitur insignes euacuationes, vt sanguinis è vulnere, è locis muliebribus, aut aliunde: sequitur dysenterias, diarrhoeam, & cætera eiusmodi: ardores quoque & graues inflammationes viscerum. De quo priusquam præsagium instituas, vide num sit à repletione: minus enim periculosus est, sapeq; cum multa per ventrem euacuantur, singultus à repletione est; quia pars materiæ, quæ à reliquo corpore confluit in ventrem, tunicis ventriculi imbibitur: quod etiam huic nostro agro, viro ingluuiei dedito, eueniebat; licet multa per vomitum & fluxum expelleret: & quum adhibita essent partim ventositates expellentia, partim quæ biliosam materiam reprimerent, vt

Prognostica.

sem. portul. pap. hic curatus fuit. In febre licet periculosus est singultus, nisi sit criticus, & signa coctionis manifestò appareant: sic enim sape indicat crism vomitione futuram. ita hic singultus primò ante vomitum, postea etiam post vomitum, nihil mali intulit. cum tamen vomitus, qui remedium esse debet, singultum gignit, ab inflammatione cerebri vel stomachi metuendum. & hic vomitus malus censetur, si singultum gignat; quemadmodum à sanguinis fluxu singultum malum ait Hippocrates, sed Galenus rectè addit, vt plurimum. quod & Holerius vidit in nobili quodam quinquagenario, vel seniore, è familia D. d' Antragues, cuius ille erat oeconomus. effusa enim incredibili sanguinis copia, euasit à conuulsione, deliquis animi, singultu, adhibita cucurbitula: & sanus superuixit. In hystericis verò ab utero non ita periculosus est singultus.

ab inflam-

ab inflammatione vteri deterior: à musculus & osibus temporū lethalis. In inflammatione hepatis saepe etiam lethalis, ~~vt experientia bis aut ter vidimus.~~ Curatur Curatio. multis modis, pro varietate causarum. Si à frigiditate, calfacientibus, teste Galeno & Aëtio; tum cibis, tum medicamentis. ruta in potu cum vino, apium, cuminum, calamintha, pulegium, dictamnium, nardus celtica, quodlibet per se aut mixtum aquæ mulsæ decoctæ: vel etiam seseli & daucus, & castoreum ex Galeno, Aëtio, & Paulo: etiam sumendo diacalaminth. vel arom. ros. vel diacinam. ʒj. cum pauco vino. Venter quoque fouendus oleo rutaceo, vel in quo cuminum aut absinth. decocta sint: vel exterius inungendo cum oleo nardino, costino, mastichino: & saccelli ex vtraque mentha, abs. calamintha, pulegio ana p. j. macere, cariophyllis, ligno aloës, mastice ana ʒj. vino albo aspersi & appositi. Si etiam ex frigidi humoris copia, & viscosorum, Ex frigidorū humorum copia. tenuantibus & incidentibus vtendum, oxymelit. scillino, iuxta Trall., Aëtium & Paulum; & ita si pituita viscida sit infarcta in tunicis, quæ illam incidunt, detergeant, euacuent, propinanda, etiam per vomitum, cum acetoso syr simpl. & oxymelit. simplici & scillino: & si non vomant satis, pilulæ de hiera exhibendæ: & si agere vomant, per inferna, ex hiera & agarico, vel per clysteres (quod tutius est) purgabimus. Si diuturnus est morbus, concoquendus melle ros. oxymel., syr. de byzantiis, de stœchade, si sine feb. fuerit: fugienda quæ adstringunt, vt syr. menth., absinth. nisi facta iam euacuatione humoris; tunc enim conueniunt ad corroborationem ventriculi; alioqui materiam infarctam magis impingunt. Concocto humore, rursus euacuandum cum pilul. cochis, de hiera, adiectis iij. gr. castorei. Post

illam exacuationem syr. de absinth. conuenit, cum aqua mentha, & diagal. & diacyminum, & exterius solum iam dicti calfacientes, discutientes flatus, ex oleo absinth. rutaceo: & post solum vel inunctionem fasciam diligenter venter comprimendus. Egregie iuuat aëriæ retentio ex Galeno, ita & sternutatio curat singultum ex plenitudine, teste Aëtio, cuius exemplum posuimus De feb. lib. 5. obs. 15. & in scholio rationem attulimus.

Erysimachus medicus in conuiuio Platonis Aristophanem singultientem docet tria remedia singultus: Continere spiritum (de quo lege Gal. De difficult. spirand. 3.) collacere fauces frigida (contracto ad interiora calore, vel obtuso sensu) irritare sternutamentum in vehementi, nec aliis auxiliis cedente. Id (inquit) si bis aut semel feceris, etiam si frequentissimus est, tollitur. Respondet Aristophanes non prius cessasse singultum quam sternutamento represserit. Galenus in aph. distinguit, si singultus fiat à conclusis humiditatibus: eos enim qui ex inanitione fiunt, qui sunt rariores, non sanat sternutatio: concusso enim capite & ventre, tum reliquo corpore, maximè neruoso, excutitur materia quæ singultum facit, sicuti eadem calfacta succussione tenuataq;, partim vacuata & discussa, partim translata in partes ignobiles singultu finit; vt scribitur quarto De rat. vict. in acutis. Sunt quedam vulgaria; v. g. experimentum, quod interpretes Holerij probari vidit compresso vtriusque ad latera medico digito dextro: reuoluitur narratio aut insolita timor, aliò videlicet seducta virtute animali, quæ respirationem facit. Cuiusdam nullis remediis cedebat singultus, nisi vino Hippocratico albo: cui refrigeratum fuisse ventriculum par est. Si singultus fiat à caliditate, refrigerantibus curatur. J

autem

autem vna adsint humores biliosi, acres, corrupti, ro-
dentes, vel corruptis cibis biliosis si contingat, id ex præ-
cedente victus ratione dignoscitur, & ex ructibus, vo-
mitione, sapere, colere flauo, & calore. quare non minus
erit prouocanda vomitio, quam in pituitosis humori-
bus. sed his detergentia magis danda sunt, quam inci-
dentia. humor enim est nimis tenuis, & sua tenuitate
ventriculum penetrando, & acrimonia pungendo sin-
gultum facit. Galenus & Aërius vomitum medelam
esse satis putant. Syr. end. simpl. vel compos. dari po-
test ad humoris concoctionem, & vomitus prouocatio-
nem. sed quando ad vomitionem datur, cum aqua
tepidā vel aqua decoct. hordei in magna quantitate &
tepidus est propinandus: post cuius assumptionem de-
bet corpus moueri, & ventriculi regio saltem confrica-
ri. Quod si non vomant, Rondeletius exhibet cyathum
vnum decoct. glycyrr. vel passul. cum syr. dictis, aut cum
multo saccharo, aut hydromel bene dilutum. Quod si
opus est leui purgatione, adhuc detur insusum rhab.
cum decoct. passul. vel hordei vel glycyrr. vel cum syr.
ros. laxatiu. Valent & clysteres, à quacumque causa
fi. ut singultus, ad humoris deriuationem. Trallianus, vbi
recrementa rodentia & corrupta fuerint, vitur con-
temperantibus & abstergentibus. vinum his circumci-
dit, & omnia acria decocta: vitur aqua temperata &
pane ea imbuta, prisa copiosa, piscicula qui aceti
paululum habeat, & pullis columbarum abstinere à
purgationibus. His valet inrybi succus potatus, cucume-
ri semen excorticatum tritumq; bibitum, & lactuca
semen & portulacæ succus, vel ipsa portulaca in cibo
sumpta, & myxarum decoctum in potu. lac asinum,
caprillum; syr. viol. nymphae, pap. Sic & à serosis
E 3 humori-

Curatio sin-
gultus à ca-
liditate orti,
& ab hume-
ribus bilio-
sis.

Ab alimentis vel medicamentis acris.

Ab inflammatione ventriculi vel alterius visceris curatio.

Si ob febre fiat.

humoribus medicatisq; & mordentibus vomitu precedente: quibus si mordacitas non alteretur, abstergatur; discutiatur is, quæ sensus stupefactionem inducunt; opus erit, ex decreto Galeni & Aëtij, 3 j. philonij vel theriaca recentis; sed cum cautione. Exteriùs valent oleum rosaceum, cotton. pap. nymphae. Si ab alimentis vel medicamentis acris factus fuerit singultus, citra magnam plenitudinem, praesens remedium est, oleum amygd. dul. recens, vel oliuarum, vel butyrum assumere, vel ptisana cremorem, vel multum aqua frigida bibere, modò ventriculum non habeat imbecilem. extinguit enim medicamenti acrimoniam, & sensum minuit. Ligatura ferè in omnibus causis fieri possunt, quia inducendo dolorem singultum sedant. Verùm si ob ipsius ventriculi aut alterius visceris inflammationem singultus fiat, ex eiusdem inflammationis curatione sedabitur: ita nos in quodam rustico inflammatione hepatis laborante & postea singultiente fecimus: qui priùs secta vena & aliis remediis adhibitis ad inflammationem hepatis, & frigida ventriculo adhibendo, curatus fuit. ita quoque si ex abscessu vel ulcere ventriculi contingat, eius curatio petenda ex propriis locis. Rectè dixit Trallianus, Si ob euacuationem aut febrem singultus accedat, non dubiè etiam firmiter perseuerans, tunc ob siccitatem immodicam affectus oritur; & talis meriò quidem periculosus est. Quare in eiusmodi, humectantibus & refrigerantibus auxiliis, praesertim temperata aqua creberrima, vntione, & omnibus quæ euacuatis adhibentur, vtendum. Noui autem quendam (inquit idem Trallianus) ex iis, qui ob hanc intemperiem singultiunt, frigida sorbitione conseruatum. At in inflammatione, ea quæ actù frigida sunt

sunt vitari debent: magis etiam continuè tepida vten-
dum, paulatim eam sorbendo: extremas autem manus
calidissimas frequentius madefacere oportet: & pedes
deligare, continereq; non est alienum. Eadem cauenda
quæ de ventriculi ac hepatis inflammatione dicentur.

In inanitione etiam si desperata res est, iuvandus ta-
men ager distillatis, colaticis, iusculis & expressioni-
bus, cibis humectantibus, inunctione dorsi & ventriculi,
ex oleo viol., hydreleo quoque. Ita etiam si ex eua-
cuatione ortus fuerit singultus, curabitur per alimenti
convenientis assumptionem, & per ea quæ defectum
expleant, Aëtio teste: & si perseverarit adhuc inmodi-
cus sanguinis fluor aut alui profluvium, iisdem prospe-
ciendū erit. Inanitioni etiam conducit oleum amyg.
dul. potum per se, aut cum aqua tepida pariter: & pri-
sana cremor per se, vel cum confusa pullorum carne.
At egrotanti, quem hisce diebus inuisimus, singultus ab
ileo ortus, malum portendebat, ex aph. 10. lib. 7. &
magis, iuxta Aëtium, singultus in altiore sopore, aut
animi deliquio, aut tetanis obortus, mortem non longè
abesse præfagit. In herniosis senibus sæpe fiunt sin-
gultuosæ febres: in quibus singultus non curatur, nisi
reposito intestino. at si reponas vi, pauld post moriun-
tur. Anno 1547. (vt refert interpres Holerij) iuxta
adem S. Stephani de saxis, puella assidue singultiebat:
nihil deglutiebat, dolore facto in œsophago. antea à pul-
monibus bubulis largiter vsa fuerat. Huic gravitas in
stomacho, nausea, vomitus. frustulum tamen pulmo-
nis, quem ederat, in œsophago resliterat. Cucurbitulis
& idoneis remediis tandem reiectum frustulum: sicq;
liberata est. Refert quædam remedia Trallianus contra
singultū physica: sed quia superstitiosa, ea relinquemus.

Ex inanitio-
ne curatio.

Singultuosæ
febres.

OBSERVATIO XIII.

*De Nausea, ex lacte concreto in stomacho,
cum pessimis accidentibus.*

MVLIER 25. annum agens, Amstelrodamo Alcmariam venerat, mense Maio, anno 1550. recreandi se causa, vnà cum marito, & vt cum amicis se oblectaret, quæ cum copiosè florem lactis seu crema deugrasset, ac vinum rubrum stipticum superbibisset, lac in ventriculo concretum, pessima symptomata intoxicati similia produxit: inprimis nausea sine vomitione afficiebatur, cum ingenti ventriculi dolore, ad eò vt syncope subsequeretur & anhelitus præfocatio; ita vt astantes illam morituram putarent. Ad hanc accitus (quæ tunc ad fossam nouam in ædibus Laurentij Gualtheri cognati nostri decumbebat) statim decoxi florum chamomillæ m. j. sem. anisi, fœniculi ana ʒ j. in aqua communi: & huius colaturæ capiebam ʒ iiij. cui addebam aceti vini modicum, & zacchari nonnihil, ac totum tepidè propinaui. quo remedio lac concretum dissolutum est, atque illa ipsa in vomitum prorumpens lac concretum vnà cum vino euomit; & accidentia iam dicta magna ex parte sedata sunt. Glande etiam imposita ex melle ʒ j. pul. hieræ pieræ ʒ ij. diacryd. gran. ij. salis parui, ad diuersionem: aluum quoque excreuit. Insuper his tabulis vtens statim conualuit: & pul. calamenti ʒ ij. specier. diacymini ʒ j. marg. perfor. & non perfor. subtiliss. tritar. ana gr. iiij. dissolutis in decoct.

decoct. aquæ flor. chamomill. & meliss., adiecto
 zacch. q. s. fiat confectio in tabulis. Venit no-
 bis tunc in mentem id quod Gilbertus Anglicus
 lib. 7. De venenis cap. de sanguine & lacte con-
 creto in stomacho scribit, quod sentiat frigus
 corporis & præfocatio anhelitus, vti huic mulieri
 contingebat. Is abstinere iubet à salitis, quia fa-
 ciunt caseitatem. Dat acetum cum aqua in potu;
 cum succo calamenthi 3 v. quia statim resoluit
 lac, & prohibet lac à conglutinatione. Sed quia
 flores chamomillæ erant ad manum, commodè
 iis vsi sumus, cum ad nauseam faciant, & præci-
 pue ad dolorem stomachi. ~~sed eo non vitur ea~~
 Villanovanus in gravidis; in quibus abortum
 mouet, vt ille refert. sed hæc gruida non erat.
 Aliquid calamenthi in tabulis probè miscuimus.

S C H O L I A.

QUOD ad lac concretum attinet, ad venena
 pertinet. quod autem nauseam incitarit, quæ
 nihil aliud est, quàm appetitus vomendi sine effectu, Nausea.
 signum erat iam lac concretum, vnà cum vino, in ven-
 tricali tunicis fuisse infectum, vel intra tunicas colle-
 ctum. verum cum vomitio succederet, nausea cessauit.
 Quæ etiam fieri solet, vel ob obiectum nobis parum Causæ.
 gratum; vel ob alimenta putrida & malè olentia, quæ
 assumere ventriculus refugit; vel ob recrementa pauca
 tunicis ventriculi adherentia, aut intra tunicas colle-
 cta. Quare si nausea à viscidis humoribus adherentibus Curatio.
 fiat, oxymel dandum, vel syr. acetosus. si à bile, deter-
 gentia sola sufficiunt, vt decoctum hordei, cum zac-
 charo, vel cum syr. end. simpl. vel addendo parum succi
 E 5 ros. diluti

ros. diluti aqua tepida; vel magnam copiam decoctionis
pulli, cum multo Zacccharo assumere, & postea digitum
in os immisso vomitum prouocare. Bilis facile euacua-
tur, & detergetur: pituita magis contumax est. quarum
decoctum raphani cum syr. acetoso dandum, vel cum
decoct. rad. & oleo vel butyro rancidis, vt vomant faci-
lius: sed magna quantitas est propinanda; vel vinum
velius multum assumendum est, vt eorum copia ven-
tricus stimuletur ad vomitionem. Deinde pilulae
danda de hiera, cum agar. formanda cum oxymel
danda verò manè sunt, & detur decoctum asari pro
vomitu, ante vsum pilularum: deinde ventriculus cor-
roborare oportet. Alij sub vno capite tractant de supini-
tate, Græcè *ὑπὸ πνεύματι*, de stomachi subuersione, quæ
Græcis vocatur *ἀναστροφή*, & nausea, Græcis *ναυστία* dicta
quam alij *ναυστία* appellant, & de vomitu. Differunt
tamen hæ voces, licet ad deprauatum motum ventriculi
pertinent, prout diuersimodè offensus ventriculus ipse
à diuersis causis fuerit. *ὑπὸ πνεύματι τῆς σπλάγχνης* Latine
supinitas stomachi appellatur: qui affectus contingit
quandoque iuxta intemperiem quamcumque ipsius
stomachi, citra tamen vitiatos humores: sit etiam pro-
pter humiditatem multam quidem, non tamen mali-
gnæ qualitatis, vt constat ex Gal. 8. De compos. medic.
secundum locos: Irriguus enim stomachus (vt ipse in-
quit) per largam humectationem, similiter vt ligamen-
ta nervorum lassatur. *Ἀναστροφή* à Græcis, à Latinis
Subuersio dicta, indifferenter duo significare poterit, ex
Galeno. nam quandoque appetitus perditionem sic ap-
pellare possumus; interdum verò nauseosas affectiones
ab accepto cibo fientes: contingit etenim quandoque
hoc vnum solum symptoma accepto cibo; vt si paulo
fortiori

*ὑπὸ πνεύματι τῆς
σπλάγχνης*, su-
pinitas sto-
machi.

ἀναστροφή,
Subuersio.

fortiori motu moueantur, statim vomunt; vti fratri meo Theodoro Foresto contigit. appellant etiam aliqui tales stomachicos. At si anorexian, hoc est perditionem appetitus, significat, antea eius curationem conscripsimus. Si accedat sumpto cibo, paulo fortiori motu, & statim vomant, tunc curabitur vt nausea, & vomitus, cum parum à nausea discrepet; quando à modicè vitiata humiditate exoritur. Verum si ob oris ventriculi solum fiat imbecillitatem, curabitur vt supinitas. Supinitas autem facillimè curabilis est, quia aut astringentibus solis, aut quæ siccare humiditatem possunt, ac constringere laxatum corpus, tollitur. Græcis verò *ἔμετος* & à Latinis vomitus dicitur. at hic vnà cum nausea (quam Græci *ναυτία* seu *ναυτινὴν* appellant) magnam cognationem habet, ac vnus affectus reliquum præcedit. Nam nausea vomitionem præcedit; licet non perpetuò ad nauseam vomitus consequatur cum nonnulli nausearint, nec tamen vomuerint, Gal. teste 2. De caus. sympt. & Paulo cap. 1. lib. 2. Nonnulli verò turbantur; sed nihil enomunt, humore ipsis tunicis imbuto: quæ nausea deprauatus est quidam expultricis facultatis ventriculi motus; quo venter ipse ea, quæ eius corpus contristant, quàm citissimè per stomachum euacuare appetit. vel breuiùs, irritus quidam est conatus ad vomendum, & inanis quedam vomendi irritatio, quæ interdum ad vomitum impellit, interdum & citra vomitionem fit; vt ex Galeno declaratum est. At vomitus, prauus quoque est eiusdem facultatis expultricis ventriculi motus, quo ea, quæ in eius capacitatem, seu latiori spacio existunt, ac ipsum contristant, & in se fluitant, reiciat quàm citissimè per stomachum, eodem Galeno auctore, lib. 2. De caus. sympt. In virisque afficitur (vt ibi-

ἔμετος vomitus, *ναυτία*, *ναυτινὴν*, nausea.

Nausea cum vomitu conuenientia & differentia.

Nausea.

Vomitum quid.

(vt ibidem liquet, & 5. De loc. affectis) os ventriculi:

Pars affecta.

vel est affectus totius ventriculi, cum ventriculus per se & quandoque per consensum afficiatur. Est autem vtriusque symptoma modò expultricis facultatis præter naturam, modò naturalis, vt ex Galeno constat, & longiore sermone ab Altimaro explicatur cap. proprio.

Affectus præter naturam.

At nausea cognoscitur, quando ipsa in illa mani vomendi irritatione lancinat tantum ventriculum ipsum, & nullum humorem educit, Aërio teste. Distinguitur

Nauseæ signa.

etiam à subuersione, quoniam ea non nisi cibo assumpto; hæc autem sine cibo assumpto fit, iuxta Paulum, lib. 2. cap. 54. Quamuis Galenus aliam præter hanc afferat diuersitatis causam, quoniam ea aut propter solam ventris debilitatem, aut cum vitiata alicuius, modicæ tamen, humiditatis complexu fit: hæc verò ex

Nauseæ & vomitus causæ.

multa, & etiam valde vitiata, circa quoque cibum afficitur. Vomitus autem signa frustra quispiam conscribere tentauerit. verum à nausea ipse differt, quia per vomitum perpetuò aliquid excernitur; per nauseam nequaquam, vt iam diximus: quamuis eam vomitiones interdum consequantur, vt diximus; interdum verò non. Et, vt summam complectamur, nauseæ & vomitus causæ duæ sunt præcipuæ; nempe copia, vel humorum vitium seu prauitas: copia nempe ventriculum grauando; prauitate morsum inferendo. Vide plura de his apud Gal. 2. & 3. De caus. sympt. & 8. De compos. medic. secundum locos, & apud Alexand. cap. 13. lib. 7. & reliqua apud Altimarum. quæ causa faciliè innotescunt exemplis sequentibus de vomitu, quales sunt succi qui eam moueant. Ita biliosi vel serosi in ore ventriculi in nausea absorpti sunt; viscosi verò ori ventriculi inhiæsi, vt Trallianus docet. & quibus modis nausea curatur iam di-

iam diximus. Vide eundem lib. 7. cap. 13. De nausea & vomitu. Copiosos euacuabimus; prauos & vitiosos contemperabimus, & malignitatem ipsorum imbecilliores reddemus; præsertim ubi biliosi & melancholici fuerint: pituitosos extenuabimus, & crassos & viscosos; crudos verò in solo ventriculo redundantes & non ex toto influentes, medicamentis non sollicitabimus, sed victu curabimus, & humores in ipso contentos immutabimus. At si ex toto corpore influant in ventriculū, medicamentis maioribus utemur, modò per sanguinis extractionem, si abundet; modò per purgationem, si magna prauitas humoris existat. Si in nausea nihil efferatur, humores iam imbibiti sunt ventriculo: qui vomitu, ut diximus, expellendi. &c.

Curatio nausæ.

OBSERVATIO XIII.

De Vomitu, & Nausea precedente vomitum.

FRIGIDOS succos puella ex esu fructuum horariorum in ventriculo longo tempore collectos habebat: vnde, in ore ventriculi frigus sentiens, immodicè cibum appetebat, minimeque siticulosa erat; & sæpe sentiebat in ore acidam qualitatem, ita ut cibi quoque in ventre acefcerent. aderat & huic aliquo tempore pondus quoddam, & tensio quædam circa ventriculum; ita ut subinde cibum ferre non posset ventriculus, & nausea afficeretur. Ad vomitum excitabatur, & cibum subinde euomebat, uti nobis narrabat. Ita ut hæc pallida, & cachexia quasi affecta, si cibum copiosius sumpsisset, nausea & vomitu corripereetur. nullam medelam adhibens, tandem & sine

& sine cibis tensionem & pondus sentiebat : ita
 vt coniceremus etiam copiam humorum adesse,
 nempe succorum frigidorum; quod postea etiam
 cognouimus, ex vomitu nauseam subsequente,
 cum humores pituitosos crebro intenseque, nul-
 loque insigni spacio interposito, euomeret; ita vt
 & stomachum primario affectum esse percepe-
 rimus, & redundantes humores in eo esse geni-
 tos. Deinde, quia vomitus statim post nauseam
 oboriebatur, & citra vehementiam vomebat, in-
 telleximus quoque humorem noxium in latius
 ventriculi spacio esse, cum & in stomacho flu-
 ctuaret. Ideo cognita iam causa, succum pituito-
 sum ac frigidum esse, precepimus vt in aere
 calido versaretur: & quia iam in hieme eramus,
 vt in cubiculo semper focum luculentum haberet,
 imperauimus: vt etiam somnus, quies ac inedia
 moderata essent: nam per moderatam inediam,
 iuxta Trallianum, non solum pituita alteratur, &
 extenuatur, verum etiam in sanguinem beni-
 gnum probumque conuertitur, vt eiusmodi quo-
 que humor per inopiam alimenti nutrire possit.
 praesertim vbi dulcis fuerit: sed hic parum acida
 appetitum edendi magis inferebat. Interea ta-
 men, si vires inediam moderatam ferre non pos-
 sent, carnes concessi potius assas, vt gallinarum,
 pullorum gallinaceorum, columbarum iuuenum,
 phasianorum, perdicum (cum satis diues esset) tur-
 turum, turdorum, merularum, leporum, adiectis
 quibusdam odoratis, garyophyllis, cinnamomo.
 Pro potu concessi, vinum ruffum, aliquando
 subastringens & vetustius. Vinum namque adeo
 calefacit

calefacit ventriculum, vt in qualitatis eius calorem non intendat, licet eiusdem substantiam augeat. Ceruissiam absinthitem si aliquando bibere vellet, concedebam: & vt in fine mensæ exiguum diacydonij cum speciebus sumeret, nihil deinde superbibens aut edens. Excrementa quoque subducebamalui, natura vel arte, ferè quotidie: & imperabam vt omnes immodicos animi affectus vitaret. Quantum ad medicamenta attinet, si difficulter vomeret, dabam cochlear vnum atque alterum oxymelitis simplicis, modò scillini. sed quia facilè vomebat, sufficiebat oxymel simplex. Interea decocto vti sumus in hunc modum calfaciente & nonnihil incidente, & pituitam concoquente: ℞. calamintha, mentha, hyssopi, serpilli, pulegij ana m. j. absinthij m. β. rad. fœniculi, cappar. ana ℥ β. seminis fœniculi ℥ j β. sem. anisi ℥ j. fiat decoctio in aqua communi pro lib. j. coletur & aromatizetur cum ℥ j β. cinamomi electi, & ℥ j. arom. ros. sine musco, addendo oxymelitis simpl. ℥ j β. syr. menthacei ℥ j. & clarificetur. Deinde purgaui ventriculum cum pilulis ex aloë lota, & hieræ picræ ana ℥ β. cōponendo ex iis pilulas septem; quas manè deglutiuit. Postea dedi subinde syr. menthaceum & absinthij, & species diacinnamoni, diarod. abb. & arom. rosati in rotulis confectas; singulis ℥ iij. ponderantibus: ex quibus vnum quotidie sumebat, parum vini absinthij superbibendo. Interea ceratum ex mastiche, olei nardini aliquot guttis additis, ventriculo imposuimus; prius inuncto oleo nardino, menthaceo, & maceris, aliquot guttis olei caryophyll. adiectis.

Vomitus pi-
tuitosus in
altera mulie
re curatus.

adiectis. Quibus hæc probè curata fuit: quemad-
modum altera mulier Alcmariana, annum 20
agens, quæ in insigni felis, in platea vulgò Drom-
kenordia dicta habitabat. laborauerat autem per
vij. continuos dies vomitu pituitoso, vix aliquando
interposita mora, cum ingenti stomachi dolore
ac torsione. Ad quam ingressus, mense Octobris
anno 1547. inprimis sequens decoctum propo-
navi: ꝛ. decoctionis hordei communis chalibeae
tae lib j ꝑ. syr. de mentha, mellis ros. colati ana ꝑ
ꝑ. miuæ cotoneorum ꝑ j. misce. Primo die, cū
cyathum vnum sumpsisset, euomit. Secunda
die, cū valde debilis esset, & continuo euomen-
ret, siue febre, rursus dedi cyathum vnum, & con-
tinuit: & ex reliquo sumebat bis in die. Deinde
ad maiorem constrictionem, cū semper magis
debilitaretur, præscripsi conditum sequens
vng. ꝛ. conseruæ ros. veteris, conseruæ rorismarini
ana ꝑ. corticum citri conditi ꝑ iij. spec. diacym-
ni, arom. ros. sine musco ana ꝑ. specier. diaroe-
abb. ꝑ j. diacydonij cum speciebus ꝑ. syr. mer-
thacei q. s. fiat conditum: capiat sæpius: ꝛ. corti-
cum granat. sem. myrtillor. sumach., cinamon-
electi, mastich. corall. rub. ana ꝑ j. flor. ros. rub-
trochis. de carabe ana ꝑ. olei mastichini, nard-
ni, absinthi., menthacei ana ꝑ. ceræ q. s. fiat vng.
Quibus remediis & hæc curata fuit.

Signa causa-
rum tam
nausæ quæ
vomitus di-
ligenter di-
stinguenda.

S C H O L I A.

IN nausea, vti & in vomitu, diligenter causa p-
signa sua distinguenda sunt; antequam ad curatio-
nem accedamus: nam hæc cognitu necessaria sunt, e-

viro indigent exercitata considerationis. Sicuti enim in succo frigido nullo modo agros striculosos esse, aut ardorem in ore ventriculi sentire & aciditatem cōtingit: ita in salsa sitis augebitur, minueturq; appetentia, ac fortasse abolebitur; præter id quod similem quoque sentiet in ore qualitatem. Si biliosi fuerint, oris amaritudo, sitis atque ardor simul cum morfu in ore ventriculi & inappetentia aderit, & absumpti cibi in amaram seu nidorofam qualitatem vertentur. Quod si vomitus ad has causas consequatur, facilius per vomitionem redundans succus dignoscetur, tum visu à medico, tum gustu à laborante. Ita & vitiosi cibi deuorati vel corrupti in vomitu, quoque faciliè percipientur. Et si fuerint saniosi, vel serosi ac tenues humores, non solum ante cibos, sed & post acceptum cibum vomitum inducunt, ut Aëcius refert 10. cap. lib. 9. Iam quoque considerandum num in ventrem fluxerint: si enim à toto corpore, plethoricum erit, & ex signis plethora habebitur: & si vitiosis humoribus sit repletum, ex colore & eruptionibus papularum circa cutem cognoscetur; atque ex ipsa vrina, teste Aëcio. Si autem ab aliqua parte, ut capite, splene, seu hepate, humor ad ventriculum transmissus fuerit, ager ipse primum affecti membri lesionem sentiet, vel calorem, vel frigus, vel gravitatem, vel duritiem in tactu. neque nausea intensa neque crebra excitabitur, & vomitus leuior, & insigni aliquo spacio interpositus habitusq; totius corporis considerandus: tum qua victus ratione sit usus; utrum frequenti cruditati aut satietati inciderit, idq; in vita otiosa, ac præcipuè præter consuetudinem, an contrà, numquid & membrum certo temporum circuitu vexari solitum nunc non vexetur, vel aliqua excretio is retenta sit:

E

alioqui

Signa prognostica.

alioqui si crebro intenseq; nullo interposito spatio, v
in puella nostra, contingat, certum erit ventrem per s
ac primario affectum esse, & redundantes humores in
ipso genios. Si nausea laborat & nihil notatu dignum
vomant, humores noxij ventriculo infixi sunt; alioqui
fluctuantes facile vomunt. & ita humores mordaces,
valde molestant, calidi vel frigidi singultum inferunt
sed non adeo mordaces, nauseam. At a vomitu singul
tus & oculorum rubor, malum, ex Hipp. aph. 3. lib 7
quemadmodum etiam a tuberculi introrsum ruptione
vomitiones malas; aph. 8. lib. 7. & ab ileo malus est vo
mitus; quando ilei exitiales sunt, vt saepe vidimus in
hermosis, maxime vero senibus, aph. 10. qui, cum nulli
clysteres iudicaret, vomitu continuo expirabant. Nau
sea autem (vt quidam volunt) signum crissimum existit
interdum vero signum malum, vt in febribus pestilen
tibus: & quando in conualescentibus multiplicatur
indicat recidiuam. Quod nausea in pestilentialibus fe
bribus sint perniciose, ratio est, quod qualitatem vene
nosam arguant. Nausea saepe decernit vomitum; &
vomitum superueniens nausea, eiusdem curatio saepe ex
istit, si materiam adiunctam habet. At vomitio vti
lissima est, si pituita ac bili permixta quam maxim
fuerit; si non multa nec crassa sit. sincerior enim deterio
est, siue fuerit porracea aut liuida, aut nigra; quicum
que ex his fuerit color malum esse censendum est, test
Hippoc. 2. Prog. Vidimus tamen, inquit Alexande
Trallianus, mulierem, inter exempla, mensis vnus in
teruallo singulis diebus miram porracea cholera quan
tuitatem euomentem, & conualuisse. Accidit quoque
(teste Arculano) febricitanti spasmus aut epilepsia; &
euomit ager humorem floris aris similem, & euadit: v.
puella.

puella istis diebus (cū hac scriberem) euenit, quæ in epilepsia eiusmodi humorem euomuit Delphus, & sanata fuit. Hippoc. bis in mense vomitum in corporibus sanis probauit. aliis tamen sufficit bis in anno, Vere & Autumno. nam cū equaliter fiat, agrum præseruat à plurimis morbis, & renum & pedum virtus: diuertit enim ab inferioribus malis; & à superioribus malum eradicat; vtilisq; est omnibus morbis qui à materia in ventriculo fouentur: & prodest, auctore Auicenna, agnitudinibus ventriculi materialibus, absque tamen apostemate aut vlcere. Ideo si rarus est, conuenit: assiduus verò ventriculum vitiat & debilitat, imbecillitate adducta: & veluti cloacam prouluiei vniuersi corporis facit. Quidam volunt bonum esse in apostematibus hepatis, & propriè concauitatis ipsius, ac splenis, modò sit proportionatus materia apostema facienti, frequenter tant bonus existit; vti & in febribus in die critica (vt multis exemplis ostendimus in libris nostris De febribus) modò non sint febres pestilenciales: in iisdem enim niger & malè olens, subitam perniciem denuntiat. Exitiale quoque admodum est, si quis vomit omnes colores: & vomitio liuida graueq; olens ocysimam mortem indicat: vti & omnis subputris & foetidus odor in omni vomitione malus est, eodem Hipp. auctore. Contingit tamen aliquando (vt scholio obs. 15. lib. 5. De feb. exemplo probauimus) eos curari qui nigra & atram bilem euomuerunt. Niger vt sex sanguinis, malus, nisi in apostemate lienis, aut in fine Veris contingat, vt Gradus annotauit. At excrementitius vomitus, cum arboris foetitate, intestinorum abscessum denotat: in colicis & iliacis pestifer est; quamquam verula (cuius historiam posuimus lib. 7. De feb. obser. 4)

iliaca per octo dies recrementis reiiciens, per me curata fuit. Quod autem interdum vomitus valetudinis causa rectè fiat, experimentis credens Celsus approbavit. Commonet tamen, ne quis qui valere, & senescere velit, hoc quotidianum habeat; ut liquet lib. 1. cap. 3. Vomitus quoque saepe singultum clamosum curavit. & is qui sine febre est, malus tunc esse non potest, quando robur naturæ sequitur: etiam si è cerebro vel toto corpore humor in ventriculum effluxerit, vel à iocinore, à liene, aut mesenterio, modò eo tempore neque tumor in hepate, neque in liene sentiatur. Et sic quoque spontaneus vomitus seu arte paratus, iuxta Hippoc. aph. 2. lib. 1. si talia euomuntur, qualia oportet, & bene ferunt, sicuti alia quauis euacuatio, utilis est. Sed assiduus ventriculo nocet, pectori, visui, dentibus, & antiquis capitis doloribus, præter eum qui fit per ventriculi consensum. Qui cum vermibus est, in feb. pestilentibus, malus, ob putredinem: potissimum si mortui euomantur, cum & omnis vomitus in pestilentibus febribus (ut de peste diximus) malignus habeatur. Aliquando in aliis febribus vermes reiecti nihil mali attulerunt, ut exemplis in febribus declarauimus.

OBSERVATIO XV.

De Vomitu, ob ventriculum non potentem cibum continere.

VOMITIO aliquando fit, quando ventriculus cibum non potest continere. Non continet, vel quia alimenta sunt plura, quàm continere possit, ut ebriis accidit: vel quia alimenta nimis sunt pingua, & leuia, aut ordine suo non assumuntur; ut si quis assumat. (ut Rondeletius asserbat)

afferebat) magnam quantitatem incisorum, qualia sunt pastillorum caro, aut quæ vulgò *pastez en pot* Gallicè dicuntur; vel si liquida multa ingerantur, post astringentia multa & dura, vel quia ventriculus plenus flatibus, alimentum suspensum in superiore parte continet: aut quia multa dulcia supra alia sunt assumpta, vt pepones, ficus, cerasa, & omnia alia dulcia, vel quæ parantur cum multo oleo, lacte vel butyro: vel si cum suspicionem alimenta aliqua assumpta fuerint: vel vbi ex immodica humiditate ventriculi, etiam citra vitiatos humores, fiat, sola quantitate & copia affligente & veluti irriguum os ventris seu ventriculi reddente: adeò vt totum ventrem ob eandem multam humiditatem exolutum ac laxum habeant laborantes: vti iuuenis quidam, ad me veniens consultandi causa, laborabat; qui omnem cibum facillè euomebat, præcipuè si butyrum & pingua sumeret, quibus videbatur delectari. Huic autem omnia paulo antè dicta inhibuimus, & quia videbatur humida tantùm intemperies, & aliquantulum frigida, facillè illum nos posse curare diximus, modò optimam victus rationem obseruaret. Quare eidem astringentia edulia & potus quoque astringentes, & quæ moderatè calfacerent cum quadam astrictione, commendauimus, vt cuniculos paruos assos, & pullos gallinaceos, & columbas iuuenes. si elixis quandoque necesse esset vti, vt adiiceret quædam odorata, vt garyophyllos, cinnamomum, exiguo omphacio addito aut vino odorato. sicuti enim graueolentia omnia Romachum subuertunt; ita

odorata eundem corroborant. Quòd si carne veruecina, vel aliis elixis vteretur, id faceret quidem, cotoneis vel mali punici granis incoctis. Et si vino vteretur, concessi rubrum & astringens. omnia enim his quæ ori grata sunt, & actu frigida vel calida, erunt adhibenda; & minime repida, quæ vomitum prouocant; vi & omnia pingui vitari debent. A cibis cotonea mala vel pyra allata, absque tamen zaccharo, commendabam. Medicamenta verò calefacientia, & quæ stomachum roborarent exhibui, & diacotoneum cum speciebus, & arom. ros.; superbibendo exiguum vinum absinthit.: & exterius ventriculo adhibui linimenta & vnguenta; quæ statim transeunt, & citius operatur quam emplastra, quæ tardius vim suam exerunt: quale hoc est vng. ℞. olei mastichini, nardini, absinthij ana ʒ.β. menthæ siccæ, cinnamomi, maceris, galangæ, flor. ros. rub. ana ʒ j.β. masticis ʒ j. ceræ modicum; fiat vnguentum, vt artis est. etiam apponebam crustam panis vino & aceto irroratam, asperso puluere caryophyll. maceris, cinnamomi, calami odorati, ligni aloës, modò puluerem inspergendo, modò irrorando. Adeò vt his remediis hic inuenis, tum alij pluri mi (quibus vomitus tandem cessauit, & ventriculus roboratus est) cupitam sanitatem consequuti sint.

S C H O L I A.

VOMITVS non vno modo, sed diuerso ac vario curatur, vt antea diximus, cum plures eius existant differentia: nam alius spontaneus est: atque iterum

rursus vel criticus est, & laudabilis quidem; ex quo speratur salus morbi, ut quibusdam exemplis ostendimus in libris nostris De febris: nam criticus plerumque terminus existit multorum morborum, potissimum febrium acutarum, apostematum hepatis quæ sunt in concavo ipsius, & similium: neque hic retinendus, quemadmodum sæpe dictum est in obser. nostris De febris: & ideo sinemus naturam operari, si ex coctione præcedente & virtutis tolerantia videatur fore sufficiens; neque eum cibo nec alio remedio impedimus; imò si fuerit diminutus, aliquando iuvandus, cum leuibus tamen medicamentis. si verò excedat & omnino virtutem deiciat, ita ut mors subsequeretur, constringendus erit. Symptomaticus autem vomitus etiam ad spontaneum pertinet, qui etiam accidit magna ex parte in accessione febrium: vnde modò naturalis est, modò violentus. & quamquam aliquis laudabilis esse possit, omnis tamen est præter naturam, ut nos docuimus de vomitu qui in febre fit: sicuti enim fluxus symptomaticus vires deicit, ut scholio obser. 13. lib. 2. diximus, & rarò aliquid boni adfert; ita & vomitus symptomaticus: quamquam aliquando iuvare possit, modò non excedat; & si excesserit, restringi quoque poterit, uti aliæ excretiones symptomaticæ, de quibus in febris diximus. atque ex his exemplis facile discemus sint constringenda nec ne: & quando symptomaticæ excretiones sint bonæ vel malæ, ut scholio obser. 26. lib. 2. numquid etiam sint impedienda nec ne, inuenies. Alius vomitus est naturalis, quo natura alleviatur: alius quietus qui accidit stomachicis & facile vomentibus: alius verò violentus, acutus & æstuosus, ut in cholera; qui & præter naturam est. Alius est

Differentiæ
vomitum
spontanei.

Criticus vomitus non est retinendus, nisi virtutem deiciat.

Vomitum symptomaticum.

Vomitum naturalis.
Quietus.
Violentus.

Vomitus artificialis. & qualia in ipso obseruanda.

Qui facile vomunt. Ante vomitum quæ obseruanda.

artificialis, qui præcauet agritudines futuras, vel præsentēs curat. In quo quedam sunt obseruanda ante vomitum, & in vomitu ipso, & post vomitum. ante vomitum imprimis cauendum, ne vomitus iis prouocetur qui sunt inepti ad vomendum, vel quibus minus vomitus confert, vti pregnantibus: si enim fortia vomitiua ceperint, facile abortum patiuntur. Difficiliter quoque vomunt qui stricti sunt pectoris, & villos latitudinales tunica extrinseca stomachi debiles habent. Parati verò ad vomitum sunt, habitudinis mediocris, lati pectoris, stricti colli, neque apti ad sanguinis spiritum; stomachi robusti, scilicet fundi, & debiles secundum os ipsius; & si sint assueti, ideo Auicenna, præter iam dicta, quatuor preponit obseruanda ante vomitum: primum, vt insueti ad vomendum assuescant, lenibus vomitiuis; ne subito fiat transitus ad inconsueta, quæ corpus plurimum immutant. Secundum, vt ante vomitum præcedat ventris lenitio, fecibus cõmunibus sponte eductis, vel arte, balano, aut clysmate aut pharmaco leniente. Tertium, vt ante vomitum cibetur cibus diuersarum virium, mixtis ex incidentibus, detergentibus, viscosis, dulcibus, acidis, sed maximè pinguibus, & his quæ diuerso modo parantur tam frixis, assis, quàm elixis. Quod si metus sit vomitum futurum diminutum, ex difficultate euomentis, vel ex humorum ineptitudine, misceantur cum iisdem cibus aliqua vomitum irritantia seu vigerantia: vti est eruca, raphanus, ficus aride, pingues, cape, porrum cum aqua hordei & melle; melones, cucumeres, vinum dulce, de quo copiosè bibat, & cibi non bene mastitentur. quamuis præstantius erit præmittere cibos bonos, si timeas vomitum non subsequatur. Quartum est, vt stomachus & extrema sint satis

satis calfacta & collum, pectus: & tempus anni sit calidum, vel hora meridiani, nisi magnus adsit aestus, tunc magis eligatur tertia hora pomeridiana. In actu vero vomendi, cum tepida sumpserit hora vomitus, vel paulo ante ipsum, motu inordinato sese moueat, ut cibus in stomacho agitur: oculi fascia circumligentur, ne ladantur, venterq; leuiter vsque ad umbilicum stringatur: & cum vomere incipiat, digitus in os immisus aut penna anseris oleo intincta fauces irritabit, & iteratis vicibus vomitum excitabit, donec stomachus à cibus & superfluitate exoneretur. Situs commodior est, ut sedeat capite inclinato & pectore, quo vomitus facilius procedat. Quod si accidentia difficilia superueniant, danda erit aqua calida; aut enim euomet, aut venter soluetur, & sedabuntur symptomata. Prodest & clyster leniens. Finito iam vomitu, quiescat, & facies lauetur aqua ros cui parum aceti sit admixtum: vel abluat os cum vino & aqua mixta; & cibum ac potum tardet, saltem per duas horas si possit. Dentur deinde cibi boni odoris, & suavis saporis, pauca quantitatibus & optimi nutrimenti, ac paucarum superfluitatum, facili digestionis & cito penetrationis: & dormiat, neque bibat aquam frigidam, aut alium quemuis potum frigidum. Si excedat, succurratur & inhibeatur. Arte igitur cum fiat vomitus, is utilis est in morbis longis, ut in quartana, morbis articularibus, ischiadicis, hydropicis, stomachicis, quibus pituita aut bilis abundat, etiam atra, quae omnibus modis pernicio-
sa est. morbis comitialibus prodest, & melancholicis, & calculosis: cephalicam & renum ac vesicae vlcera sanat, ictericos ex oppilatione, epilepsiam ex stomachi vitio, ut in pueris saepe conspeximus: curat & cutis scorditatem:

Tempore vomitus quid obseruandū.

Post vomitum quae sint obseruanda.

Quibus utilis est vomitus.

Immodicus
vomit.

In quibus
non est in-
hibendus
vomit.

asthmaticos, cardiacos, & paralyticos leuat. singultus
lassitudinem corporis remouet, vt Aristoteles refert in
suis Problematis. Leuis vomitus desiderium cibi
facit, & à nauseis conciliat stomachum: torpori, som-
no graui & agrypnocomati viridis vomitus auxiliatur;
vel ex humoribus mixtus, & epilepticis ex stomachi
vitio, & conuulsis. A superioribus partibus auertit ma-
teriam, sensus omnes iuuat, & aciem imprimis oculo-
rum exacuit: & ab inferioribus materiam inanit, si
modicus est. At immodicus vomitus vehemensq³,
surditatem & tinnitum, sibilumq³ affert, & oculorum
obscuritates; ac epilepticis obest, si vicio capitis cōtigerit,
& capite dolentibus, nisi ex crapula vel stomachi cru-
ditatibus fuerit. Acetosus vomitus dentes offendit, quos
pariter denigrat. Iecori etiam & pulmōi nocet: nam
& ex pectore venarum tunicas non sine periculo rum-
pit: stomachum demum affligit, & vires dissoluit. Si
humores itaque superflui reiciuntur, nulla egent cura-
tione; tales vomitiones iuuande, donec corpus suffi-
cienter à recrementis fuerit mundatum. Regio enim illa
est aptissima ad reicienda excrementa, quae sunt colle-
cta in superiore ventriculi regione. Ob id navigatio illa
in mari, & vectio, quae vomitum excitant, saepe curant
dolores ventriculi diuturnos & contumaces. Neque
etiam retinendi sunt vomitus in illis morbis supradictis,
neque in his, qui sunt à plenitudine ventris; neque in
colico, nephritico, aut arthritico, doloribus. Biliosus
quoque vomitus non protinus cohibendus est, nec mor-
borum initio symptomaticus, à natura non temerè illa-
tus; sicuti in februm acceptione (vt paulo antè diximus)
nullo pacto inhibendus; materiam enim minuit & sub-
inde radicitus euellit. At symptomaticus, impetu coacta
natura

natura expulsus cohibendus omnino est, si superfluus praesertim fuerit, alioqui periculosus erit: is quoque qui aequalis est in corpore sano, siue spontaneus seu arte paratus, non cohibendus, cum à multis morbis hominem liberet, ut paulo antè dictum est. Criticus item, maximè indicativus, cum laudabilibus signis praecedentibus, non est restringendus, modò non excedat & virtutem deiciat. Interea, licet symptomaticus (ut in libris De febris ostendimus) sit malus per viam signi (quia arguit materia multitudinem vel malignitatem eiusdem) tamen saepe fit bonus per viam cause, cum euacuatur materia quae morbi causa existit. Cibus tamen euomentibus crebrò siue inconcoctum siue corruptum, ne perseverando debilitetur stomachus, & prava contrahat vitia, remediis occurrendum est. Et licet humores superflui nulla egeant curatione, & statim non sint constringendi; tamen ne consuetudine vitium oriatur, & ne frequenti conatu rheumatismis facile repleatur venter, compescendus est. Ideò Auiten. & illi qui illum sequuntur, vomitum cibalem vel humoralem superfluum & non aqualiter factum, constringere iubent. Sed is qui diuertit ab inflammationibus inferioribus, internis, vel etiam à superioribus, ut in doloribus capitis, aurium &c. non est inhibendus, modò non affecta sint collum aut partes thoracis. Vomitus itaque omnes optimorum alimentorum, qui fiunt post alias vomitiones ob debilitatem retentionis, vel irritationem expultricis, compescendi sunt: ut si sanguis per vomitum reddatur. Neoterici duplicem differentiam vomitus quoque faciunt, illum distinguentes in cibalem, & in humoralem; sub cibali comprehendentes vomitum cuiuscumque rei in corpore; sub hu-

Qui vomitus compescendi.

Quomodo
vomitibus ci-
balis cure-
tur.

A percussio-
ne aut vul-
nere.

A veneno.

A toto vel
alia parte.

sub humoralis cuiuscumque rei corporea. Cibalem ita
curant; eius causam primò remouendo, siue ab aëre
cibo, potu, aliisve rebus non naturalibus, orta sit, eam
remouent & nocumentum impressum, contrariis; &
malam temperiem corrigunt assumptis medicamentis
tam intus quàm extrà appositis: & stomachum robo-
rant adhibitis leuiter constringentibus; prohibentque
humores ne in stomachum confluant, diuersionibus
etiam euacuatione, si humores videantur fluxuri in
ventriculum: manus quoque ligant supra cubitos &
pedes supra genua: quamquam inferiora membra com-
stricta melius vomitum diuertunt & compescunt. Cor-
rigunt accidentia; vt si syncope superueniat: & victum
prescribunt supradictum, exiguum, bonum, & coctum
facilem, & delectabilis saporis, quaq; citò penetrent
& proprietate roborent ventriculum, & resistent in-
temperiei impressæ. Si fiat à percussione supra stoma-
chum, vel à membro; vt cerebro stomacho communi-
canti (tunc enim vomere solent) curetur percussio, vul-
nus, vena sectione, & amoueatur nocumentum eidem
impressum: inhibeantur humores, ne fluant in ventri-
culum, & membri ratio habeatur laesi, & communi-
cantis, & ventriculi. Si à medicamentis venenosiss, vo-
mitu & secessu educantur: & dentur antidota propria
stomachus ac membra nobilia roborentur. Si hic vom-
itus cibalis fuerit per communitatem, siue à cerebro
hepate, liene, vel à toto; habeatur ratio totius: si à toto
caueant interim sortia solutina, & ea quæ ventriculum
debilitant. vel habeatur ratio illius membri laesi, si
fuerit hepar, lien, siue cerebrum, inhibendo ne humores
confluant, diuertendo, euacuando si opus est, & robo-
rando membrum communicans & mandans. eodem

modo si sit per essentiam, auferendo causam, nempe *Per essentia*
 intempericem nudam, si qua sit, solummodo alterando
 contrariis: si cum materia, & adsint humores, cura-
 buntur ut de pituita dictum est, & de bile, ut exemplo
 sequenti docebimus. De his vide Arculanum, aliosq;
 autores, qui supra Rhasem scripserunt.

OBSERVATIO XVI.

De vomitu bilioso.

IVVENIS quidam biliosus, frequenter in aestate
 circa caniculam, bilis vomitum experiebatur;
 cui os amarum erat: habebat autem & sitim ve-
 hementiorem, & ventriculi morsum ructusque
 nidorosos. Ad quem acciti, cum circa ventrem
 grauaretur & os stomachi morderet, nolimus
 vomitum cohibere; sed potius epoto leui vomito-
 rio, quod ex aquae tepidae ℥vj. constaret, addito
 syr. acetos. simplici ad ℥j℥. illud curare proposui-
 mus, tepide à cibo sumpto, ex quo cum mediocriter
 vomuisset, absq. dolore multa biliosa (bilis enim
 à iocinore in ventriculum trans mittebatur, cum
 ipsa in ventriculo nequaquam oriatur; verum à
 iocinore vel à vesica bilis in eundem trans mitte-
 batur) os ablui iussi cum aqua & aceto. deinde
 dedi syr. alterantes, in hunc modum: & syr. de ribes,
 syr. acetos. simplicis, syr. de end. ana ℥j℥. aquae
 acetosae, cichorij, end. ana ℥iij. misceantur, & bi-
 bat ieiunus per triduum. & trionfant. in tab. ℥ss
 vtatur cum syrupis. Purgavi cum decocto tha-
 marind. in sero lactis. sed quia euomebat, dedi
 bolum sequentem: elect. lenitivi ℥ss. pulpae tha-
 marind.

marind. ʒ ij. pul. rhab. ʒ j. fiat bolus. quo ter excrevit biliosa. Interea cum bilis ex hepate in ventriculum confluebat, ceratum sequens hepati apponere iussi: R. cerati santalini ʒ j. ʒ. olei nymphaeae, ros. ana ʒ ʒ. lauentur aqua frig. vel ros. addendo spicae nardi pul. ʒ j. ducatur leuiter supra pannum lineum, & hepati apponatur. Ad ventriculum roborandum & vomitum compescendum dedimus subinde syr. ex succo mali punici & mentha, & stomachum inunximus vng. sequentis. R. olei myrtei, cotoneorum, mastichini ana ʒ ʒ. hypocistid. acatiae ana ʒ ʒ. boli armeni, corall. rub. pul. ^{torum} ana ʒ j. aceti parum, & cerae q. s. fiat vng. & sumpto ante cibum in prima mensa diacydone nite sine speciebus, & iis quae moderatè restringerent, hic tandem curatus fuit.

S C H O L I A.

Vomit^{us} biliosus quomodo curatur.

QUOMODO vomitus biliosus curetur, vide Alexand. Benedictum Veronensem lib. 14. cap. 28. De vomitu bilioso. habes ibidem plurimas compositiones quae intus exhibentur, & exterius applicantur, tan fortius quam vnguenta, cerata & emplastra. Hic vomitus non est cohibendus, nisi excedat: cum & immodica tamen consuetudine nocentior fiat, magis quam si vire prosternat; leui tum vomitorio dantur: opus est quod & Alexander Trallianus lib. 7. cap. 13. De nausea & vomitu dicebat: Si enim fuerit serosus tenuisq. & non nimium ventriculo impactus, haud curiosum est oportet ac sollicitum: verum satis est etiam solo vomitu ex liberaliore tepida potu vii, vel cremore prisan ventrem &crementis liberare. si aliquo modo sit infix.

& purg

& purgatione opus est, syr. ex infus. ros. pallid. vti possumus. Sed si nimium sit tenue excrementum quod reicitur, & acre, à calidis abstinēbimus; & potius roborabimus & astringemus, vt est antidotum simplex ex malis cotoneis, vel ex succo solo eiusdem, cum zacch. aut melle. id multum roborat & acria recrementa contemperat: ideo & infirmo & calido stomacho, humori in bilem commutanti accommodatum est. Pregnantibus si vomitus biliosus fiat, vti alius, periculosus est ne abortum irriter: his vomitum sedant pampinorum vitis cimæ, vel clauicularum succus in potu, sed & mali citri succus, vna acerbe. Quæ assumuntur, sicuti & cibi, nullam graueolentiam habeant, sed agro grata sint. At quæ vomitum ex phlegmate mucoso curant, sunt attenuantia, vt syr. acetosus, additis speciebus calidis aromaticis. si ex crasso viscoso humore, syr. acetos. compositus valet. exemplum huius, quomodo curetur, dictum est obs. 14. precedente. vbi enim acida & dulcis pituita affixa videatur, extenuantibus, iuxta Trallianum, medicamentis vtendum est: oxymelite, raphani rad. & cappari preparandus est humor, & purgandus. & si in ventriculi cavitae innatet, valet etiam, si inhereat, vomitus vt adiuuetur (nam non oportet statim constringere) decoctum raphani, sem. anethi, atripl., adiecto oxymel. simplici vel scillino. Dissecta pituita etiam euacuanda cum pilul. hieræ picræ: etiam clysteres ad diuertendum valent. deinde stomachus roborandus, hoc vel simili vnguento exterius: R. olei absinth. nardini, mastich., coton. ana ℥ss. corall. rub., mentha sicca, Caryophyll. ana ℥j. spicæ nardi ℥ss. stor. ros. rub. ℥jss. cera q. s. Detur tunc à purgatione syr. absinth. de mentha. Vide alias compos. apud Alexand. Veronensem cap.

Vomit
pituitosus
quomodo
curetur.

De his qui
cibum fre-
quenti evo-
munt.

29. lib. 14. De vomitu phlegmatico. Verum his qui cibum frequenter euomunt (cuius rei exemplum quodamque posuimus obser. 15. precedente) non solum cataplasinata ori stomachi, sed etiam iugulo imponenda sunt, ex mentha & mastiche. à cibo qua adstringantur assumenda sunt: cibis, potus, parcius assumendus. At ex ciborum acrimonia post vomitum qua refrigerant & adstringunt in esca danda sunt, & qua stiprica sunt & acetosa. At si stomachi exundatio ex cibo nimium diluto fuerit, aut nimio potu, à vomitu stomachus excalefacientibus ac exsiccantibus inuatur; & paulo post cibis siccioribus, quibus aromata admisceri debent. Et panis crustam tostam, Cretico vino insusam, superimie to mastiche, garyophylloq, conferre haud dubium est. At si spiritus in vno ventre inclusus, cibum attollens rarefit, cucurbitula maiuscula vmbilico imposita mirum facit, ante cibum impacta; ac subinde rutaceo oleo, galanga puluere & cymini insperso. alij verò, vbi vomitus fit ob flatum cibum suspendentes, dant medicamentum ante cibum, quod postea scribemus conferre ad ventriculi inflationem: & inungunt iis qua flatum discutiunt commendant clysteres; quos in omni vomitione utile esse volunt, modò pauca quantitas iniiciatur, neque fortiter laxantia aut olentia apponantur. Horum formulas habes apud Rodeletium, cap. proprio De vomitu

OBSERVATIO XVII.

De Vomitu melancholico.

QUAMVIS atra bilis vomitus sit periculosus; tamen, ut antea ostendimus, aliqui a eo sunt curati. talis minimè est restringendus
nam ma

nam materia melancholica cūm retinetur, præcipuè adusta, infert symptomata grauissima. Ita melancholicus quidam, qui circa lienem subinde dolebat, per certa quædam intervalla humorem melancholicum, sæpe etiam atrum, vomebat. Huic igitur consului, cūm remedia contra hoc fœdum malum & molestum à me peteret, cūm in autumni principio essemus, & etiam videretur aliquo modo laborare sanguine melancholico (licet quadragesimum annum ageret, vir tamen niger & hirsutus ac venas satis amplas habens) vt paulo ante vomitum, qui ferè certis periodis illum infestabat, post leniens medicamentum sumptum, altero die sanguinem in brachio sinistro ex vena lienari sibi detrahère iuberet. Mox atram bilem expurgauimus, cum decocto senæ, myrob. indor. fumaria & flor. bugloss. boraginis. Deinde splenem tum ventriculum roborauimus. Ita vt faciliè is tandem curatus fuerit. Et vt magis deinde vomitus constringeretur, mandauì vt syr. menthaceum cum aqua melissæ, adiecto exiguo vīno malipunici, sumeret.

S C H O L I A.

Hic vomitus, nisi immodicus fuerit, non est inhibendus, præmissis vniuersalibus remediis: si superfluat, vti alius excedens, est constringendus. Solet plerumque hic vomitus contingere si melancholia fecalis multiplicetur, & non descendat ad intestina, sed copiosius transluat ad stomachum illum grauando, vel morstu irritando. Maxime atra bilis vomitum infert: qui equidem vomitus vbi excesserit, nihil præstantius

G

est im-

Vtrum vene
sectio ali-
quando in
vomitu con-
ueniat.

Historia mi-
rabilis Mat-
thæi de Gra-
di.

est imprimis, quàm humorem illum inferius clysteri ad
intestina retrahere, non tamen acri: & stante repletio-
ne sanguinis melancholici, venā incidere. & idē etiam
quia hic in liene dolebat, basilicam sinistram secare fe-
cimus. Et propterea aliquis mirabitur cur aliquando
venæ sectio in vomitu conueniat: imò etiam Græci, præ-
ter Arabes, id suadent. Ita Alexand. Trallianus cap. 13.

De nausea & vomitu lib. 7. inquit: Sin autem ex toto
corpore ventriculo influant, tunc medicamentis uten-
dum maioribus. Interdum enim & sanguinis missio
requiritur, si is superare videatur: & purgatio, si ma-
gna humoris prauitas existit. Quòd si ambo videantur
abundare, tum venam secare, tum purgare oportet. Si
igitur adsit repletio totius, & adsit omnium humorum
equalitas, aut sanguis dominetur, fiat venæ sectio ex
venâ communi: alioqui si ex hepate originem habeat:
ex basilica dextra; uti à liene ex sinistra: vel ex saphena
si à retento sanguine menstruo, vel ab hæmorrhoidibus.

Huius exemplum posuimus de moniali iuencula 25
annum agente, singulis periodis menstruum purgatio-
nem per vomitum reiiciente, à me curata lib. 16. obs.
25. Refert quoque ferè incredibilem historiam de mo-
niali quadam Matthæus de Gradi, Papiæ commoranti,
quæ tribus annis delicatissimum quantumuis cibum
semper euomebat, cum humorum aquosorum haud
exigua portione: quæ deinde exæstans maximo dolore
afficiebatur, ut furiosa & phrenetica impetuosè admo-
dum sese moueret: aliquando & in syncopem collapsa,
per semi-horam pro mortua habebatur; ita ut nulla
diuersiones iuuarent, nisi post quatuor aut quinque ho-
ras: deinde per se alleviabatur. Huic frequens sanguinis
missio facta est ex vena communi dextri brachij, ita ut

singulis

singulis tribus diebus per duos menses semper extracta fuerint ad minus semper septem uncia sanguinis pro vice, cum etiam viueret septendecim diebus absque cibo & potu; sumendo tantum modicum vini Veruacini singula die. Postea de octo in octo dies demissus est sanguis; & quod magis admiratu dignum erat, bona habitudine leta ac iucunda videbatur, cum tamen nihil cibi retineret. Fuit tamen hac phlebotomia curata, prater spem medicorum omnium excellentium, qui eam viderunt. vnde Gradus infert, hunc vomitum à toto originem habuisse, ab humore in os ventriculi delato: & hinc quoque sanguinis detractionem iuuisse credebat. Recte Auerrhoës 7. Collectaneorum suorum dixit, cap. De curatione cancri, quod sicut in natura fiunt monstra; ita & in medicina monstruositates apparent: de quibus multa refert Rabbi Moyses part. 24. suorum aphorismorum. In vomitu igitur saepenumero sanguinis missio non improbatur: nam si corpus morbidum est, ac vena sanguine turgeant, plurimum fracta vena ex stomacho reuicitur, vel duarum librarum interdum pondere (vt nos lib. 15. retulimus & exemplis approbauimus) tum à iecoraria vena incipiendum est, quæ acuto scalpello secanda est (teste Alexand. Veronensi medico) ne latere vulnere spiritus vitalis subducatur. At femina sanguinem euomentes, profluentibus mensibus, protinus liberantur, auctore Hippocrate. Virique sexui sanguinem euomenti, narium aut hemorrhoidum profluuium subuenit; si parcius, tunc phlebotomia prodest. saepe etiam in vomitu melancholico, vt hic in sinistro brachio vena vulnerata, auxilium attulit, ex liene facta fluxione in ventriculum, vt à iecore ex basilica dextra: propterea si sit vomitus

Si vomitus
periodicè
mouetur
quomodo
curandus.

De vomitu
quem phar-
macum ex-
citauit.

A ventriculi
raritate.

humoralis, periodicus, tunc plerumque vel à toto vel à parte per consensum stomachus afficitur, humorem ad se fluentem recipiens: & curandus est eo modo, quod dictum est. Sed antequam stomachus in vomitum effundatur, ea primum diligenter obseruanda sunt, ut materia in diuersum trahatur, ut iam diximus; & ut membrum recipiens validius fiat, & membrum à quo materia fluit corrigatur. Ante accessionem dandi syr. refrigerantes acetosi & parum siccatici, si materia fuerit calida ac mordens. Tum die integro deiectio ventris, ex thamarindis prunisq; nostratibus fieri potest; vel venter clysteri molliori. & stomacho ac iecori deinde imponenda emplastra ex santalis, rosis rub. myrti baccis, ciper. mastich. spodio, & similibus, cum oleo ros. & cera compositis; confuso aceto acerrimo. In phlegmatico melancholico humore qui periodicè effunditur, valent balani Indici seu myrobal., epithymum, agaricus cum sale Indo; finita accessione, & lienis imponendum emplastrum de melileto, myrto, ac ladanum ex vino meraco vel aceto. In phlegmatico quoque, humor deiciendus, ac aliud propellendus, & stomachus confortandus est; ac cerebrum, si inde emanat humor, firmandum est. Si vomitus à pharmaco excitetur, pharmacum imprimis educendum est, & venenositas detergenda; vel vomitu vel per aluum deiciendum: nimium enim stomachi tunicas lancinat, aut morder: huic curatio omnis necessaria est, quæ supra de bilioso humore posita est. Quod si vomitus venerit ab apostemate, vel vlcere, aut dolore ventriculi, tunc curatio petenda ex propriis capitibus, de quibus mox agemus. Si contingat à ventriculi raritate, vniatur & roboretur stomachus; cauendo à solutivis & iis quæ vomitum

vomitum incitant: & à vomitiis & valdè resolu-
tibus. & intus sumantur quæ stipticam viscositatem
habent, vt cotoneum, pellicula interna stomachi, & vi-
num moderatè stipticum, tum alia viscosa, de victu di-
cta, & ab auctoribus latius explicata. Si sit ex oppila-
tione pylori, si naturalis est, non recipit curationem: Ex oppilatio
ne pylori.
alia causa remouenda, & idcò si ab humore crasso &
viscoso, vti magna ex parte euenit, curetur abstergen-
tibus, incidentibus, & exhibitione hiera picra, in forma
elect., de quibus iam antea dictum est. At nunc pauca
de vomitu sanguineo adiciamus, quamuis de eo prius
loquuti sumus lib. 16. De cruenta spuitione.

OBSERVATIO XVIII.

De Sanguinis vomitu.

VIR ille qui ex ventriculo sanguinem recen-
tem naturalem per vomitum reiciebat, eum
vt compescerem à me postulauit. quod efficere
studui, primò sanguinis missione, etiam diuer-
sione per ligaturas & cucurbitulas in cruribus,
postea sequens exhibuimus: ℞ trochis. de carabe,
de terra sigillata ana ʒ β. aquæ bursæ pastoris,
portulacæ, plantag. ana ʒ j. misce. quæ ilico iue-
runt. At alter iuuenis, cui exhibitum fuit me-
dicamentum acre per empiricum, sanguinem,
~~laxatis venis seu venarum orificiis, vomuit.~~ Ad vomitū
sanguinis ex
pharmaco. Huic
commodè consulimus, vt lactis heminam cum
vini dimidia aut tertia parte, idque paulatim &
continuò haustrum sumeret. Hoc enim virus me-
dicamenti mitigat, eluit & pariter conglutinat,
Alexandro Veronensi medico teste, lib. 13. cap. 10.

Valet & syrupus ex mali punici succo: aliqui acetosum præferunt, niue refrigeratum, vt torpescere membrum faciat, & punctiones obtundat. Acetosus namque conglobatur, si quis intus reliquus fuerit, sanguinem discutit.

S C H O L I A.

Causa.

EVOMITUR nonnunquam sanguis ventriculi venis à copia sanguinis cum impetu ruentis apertis (idq; maxime, si venarum ora imbecilla fuerint) etiam à vitioso acridq; sanguine erosis. Assumpto quoque veneno plurimi vomitionibus periere. Quidam cathartica epoto vomitorio sanguinem euomuerunt, antequam morerentur. Innascuntur etiam interdum in stomacho caruncula hamorrhoidibus similes; ex quibus per intervalla sanguis vitiliter profluit: raro tamen id euenit: vt etiã ab impacta gula sanguisuga: vel fit iis qui aquam palustrem vnã cum bestiola incaute biberunt: & interdum sanguis ex capite, è iecore, liene, in stomachum profluit & transfertur, vel in feminis mensibus suppressis aut hamorrhoidibus, aut sanguinis missione vel venere intermissa, vt viduis & religiosis etiam pluribus contingit: vel ab ictu hamorrhoidis serpentis: à pluribus corporis partibus, & à stomacho sanguis profluit, vt latius ad longum lib. 16. De sanguinis spuitione docuimus, & precipue obs. 24. eiusdem libri; vt non opus sit ea hic repetere, aut diutius huic curationi insistere.

Signa.

Quod ad præsens attinet, satis est quod is sanguis, qui ex ventriculi venis vomitur, concretus non est, nec inde magna sanguinis eruptio potest contingere; quod graciles ventriculi vene sint. Aliquando qui vomitur sanguis, à remotis corporis partibus in ventriculum desertur:

vt si cum

vt si cui membrum quodpiam excisum fuerit, natura non minus sanguinis quàm antea generante, sanguis quo membrum illud ali debuit, ad ventriculum deferatur. A toto, adest plenitudo. à iecore aut liene, tunc adest in dextro aut sinistro latere tumor. A mensibus suppressis vel hemorrhoidibus, aut hemorrhagia, ex astantibus dignoscitur, & euacuatione solita suppressa. & qui ex alijs partibus deferatur ad ventriculum, qui euomitur, concretus esse solet, vel facile concrescit. Sanguinis itaque vomitus, nisi fuerit periodicus, cum corporis robore, periculum praesagit: cui nisi protinus subueniatur, animi deliquium affert. Ex vena scissura diu emanans, vlcera minatur, & abscessus; ob eam causam (vt Galen. demonstrat) medico opus est solerti & ingenioso, magnæq; experientia. Si itaque sanguinis vomitus ob membrum aliquod excisum fuerit, aut ab vniuerso corpore in ventriculum deferatur, incidatur dextri cubiti vena media: si ab hepate, dextri interior cubiti incidenda: à liene, eadem incidatur vena, sed in sinistro cubito: si à mensium suppressione, à saphena pedis dextri: si verò ab hemorrhoidum consueti fluxu retento, ischiadica vena in parte sinistri pedis minimo digito vicina, vt quidam volunt: si ab hemorrhagia è naribus solito fluore suppressa, ex exteriori cubiti vena sanguis mittatur eiusdem lateris cum nare, vnde sanguis fluere solebat. In hoc pathemate, quacumque à causa ortum sit (quoniam vires eo laborantis imbecillae plerumque esse solent) modica vena, dum inciditur, ductio fiat; ne maior quàm par sit, spirituum resolutio fiat. Parcè præterea detrahatur sanguis, idq; repetitis vicibus, si opus est. Ante vena sectionem, si alius resistat, sequens enema aluo infundatur, vel si sua

Periculum
ex sanguinis
vomitu.

Curatio.

sponte (vt conuenit) excrementa non deiecerit: R. cassia extracta, zach. rub. ana ℥j. olei viol. ℥ij. salis parum, cum decocto quatuor remolliuorum, prun. & borderi: fiat enema, quod ante pastum iniicitur: deinde fiat vena sectio, vt dictum est. Deinde tam intrinsecus, quam extrinsecus adstringentia adhibeantur: qualis hic pul. est. R. Lapid. hematit ℥j. baccar. myrti ℥ij. acacia. boli arm. veri. corall. rub. ana ℥ij. fiat pul. subtilissimus, ad modum alcohol; & sumatur ℥j. cum aqua plantag., adiecto exiguo aceto; idq. mane, ventriculo vacuo, & vespere, si opus est, adiecta ℥j. syr. ex ros. siccis, vel R. conser. ros. veteris, conser. rad. symphyti maioris ana ℥j. boli arm. loti in aqua ros. ℥j. lapidis hematit. pul. ℥j. corall. rub. ℥j. s. cum syr. cydon.: fiat elect. molle; capiat ad magnitudinem parue castaneae, tribus horis ante pastum Valet rob. ceras. siluest. acid. vel oxyacanthae, & syr. ex cotoneis, & de agresta; si duo cochlearia sumantur. Extrinsecus crura fricentur valide; usq. vincula dolorifica iniciantur, ipsiq. cucurbitula sine scarificatione affigantur. Si ab hepate sanguis deferatur, supra hepar cucurbitula defigatur; si a liene, supra lienem; si a matrice, supra matricem. Sumpto cibo, si aegrotus ipsum retinere nequeat, cucurbitula ventriculi r. gigni affigatur. Si neque restringatur sanguis, deinde sot. i sequenti vel simili vtendum: R. balaust. psidia. gallarum, rhois obsoniorum, baccarum myrti, ros. rub. ana q. s. decoquantur in aqua plantag. & aceto, in quo decocto calente spongia madefacta & expressa, ventriculi regio foueatur; deinde & hoc vnguento sequenti inuncta: R. olei myrti. cotonei, mastic. ana ℥j. s. hypocistid., boli arm., corall. rub., acacia, baccar. myrti ana ℥ij. aceti parum, cera modicum, fiat yng. quo ventriculi re-

culi regio manè & vesperi post sotum inungatur. Reliqua vide lib. 16. obs. 24. & 25. & alios auctores.

OBSERVATIO XIX.

*De Vomitu atræ bilis, vna cum vermibus
& scarabeis.*

Cum Balduinum Kerckweruium Brielen-
sem mense Octobri, anno 1567. duplici
tertiana correptum, curassem, deducor ad puel-
lam annum 22. attingentem, quæ vomitu con-
tinuo longo quidem tempore laborauerat, &
bilem tamquam picem valdè atram vnà cum
vermibus deiciebat, quos tunc spectauimus ad
palmam ferè in longitudine, coloris cineritij: &
paululum ante meum accessum nouem numero
euomuerat, omnes ferè mortuos. Atram verò bi-
lem picis instar, quam spectabam, prima fronte
sanguinem concretum esse putabam, qui ab vtero
in stomachum transmissus esset: sed cum statuto
tempore menses prodirent, atram bilem esse in-
tellexi. Verùm, cum esset bonæ constitutionis,
neque febricitaret, & circa stomachum doleret,
nonnihil appetitu quoque deficiente, hoc ipsum
ex humoribus corruptis fieri existimabam; vnde
& vermes generabantur, eo quòd fructibus au-
tumnalibus valdè crudis antea vsa esset. Alium
non probè deiciebat, nisi duobus diebus tantùm
semel; & stercora quidem dura feculenta satis na-
turalia & minimè nigra. At vomitus admodùm
frequens erat. Medicus assistens dederat pilulas
ex aloë: verùm parum profecit. At apozemate

G 5 sequente

sequente per me descripto, vomitus qui prius creber erat, nonnihil cessauit; postquam plurima nigra recrementa per inferna deiecisset: vnde & melius habere videbatur: & absinthij communis centaurij minoris, agrimonix, portulacæ ana m. j. sem. anisi, portulacæ ana ʒ j. folior. senæ ʒ β. rhabar. selecti ʒ j β. schœnanti ʒ j. glycyrr. rasæ ʒ ss. passul. enucleat. ʒ vj. fiat decoctio pro ʒ viij. col. zaccharo parū dulcoretur. dimidium cum sumpsisset, bene excreuit: primò feces, mox atramentilem copiosè: ac vomitus & ventriculi dolor nonnihil cessarunt. Die intermisso, reliquum sumpsit. Interim ad appetitum incitandum capiebat duo cochlearia subinde ex syr. sequentibus: & syr. de limonibus, syr. absinthij, de scolopend. syr. capill. Veneris (quia parū tussiebat) ana ʒ ij. & statim sumebat ʒ ij. ex tabulis hoc modo descriptis: & specier. diarod. abb. ʒ ij. specier. diatrag. frig. ʒ j. sem. zedoariæ pulv., rad. tormentill. pulv. ana ʒ β. dissol. in aqua portulacæ & agrimonix, adiecto zaccharo optimo q. s. fiat confectio in tabul. Et istis remediis vtrumq. habuit. Verū anno 1568. x. Iulij die rursus ad Cornelium Philippum Consulem vrbis illius ex febri continua acuta decumbentem euocatus, puellam denuò inuisi; quæ licet vtrumque nunc se haberet, tamen paulo antè scarabæos vomitu reiecerat (res portentosa & incredibilis, nisi ipse conspexissem) quos mater nobis ostendit, præsentente Petro chirurgo Brieleni & viro consulari, amico nostro haud vulgari. Referebat & mater viuum scarabæum reieccisse, qui per duos dies superuixerat: res

rat: referebatur autem ad incantationem hoc malum.

SCHOLIA.

VERMES vomitione reïci, haud insolens est, nobisq; non raro visum. testatur & idem Amatus Lusitanus curatione 5.6. ac 10. centur. 1. Generari autem posse in ventriculo, vt Amatus existimat, difficile fuerit affirmare; verisimilius est ad ventriculum peruenire. Vide Beniuenum de crassiore pituita expulsa, & cum ea etiam verme, longitudinis digitorum quatuor, satis pleno, capite rubro, leui, rotundoq; pisi magnitudinem excedente: cetero corpore lanugine quadam cincto, cauda furcata ad similitudinem nouae luna; pedibus quatuor, duobus in dexteriores, totidem in sinisteriores partiē coaptatis. Admiratus Beniuenus vermis formam, medicis eruditioribus ostendit. Nullum inuenit, qui monstrū simile se vidisse vnquam fateretur. Aderat tamen senior quidam, sed medica artis imperitus; qui testatus est similem se vidisse vermem, vomitu quoque propulsum, ab Alexandro quodam caenobita: qui statim, vt ille aiebat. proiecto eo, mortuus est. Vocitabat autem hoc monstrum cordis vermem. At contra ager ille Beniueny circa cor & ventriculum dolens, cum medicamento vomitionem fieri iussisset, vt primum vermem ipsum euomit, ad pristinam reuersus est sanitatem. At vermes reiectos saepe vidimus: sed scarabeos, nisi hoc tempore, numquam: quamquam alij quoque videntur vidisse, cum & Gordonius medicus suo tempore illustris, scribat part. 5. cap. 20. De vermibus, vermes, serpentes, scarabeos generari ex putredine in corpore humano; sicuti extra in mundo vermes & musca

Historia Beniueny.

Scarabæos in corpore generari posse scribit vt vermes Gordonius.

Bruchus in
filiqua car-
nea reclusus
vomitu re-
iectus.

Lapis vom-
itu reiectus.

musca ac similia generentur. Sed & Iulianus (testis
eodem Beniuenio) medicā artem professus, dum graui-
ter agrotaret; & aduenienti medico dolorem quo circa
ventriculum miserabiliter cruciabatur, exponeret, tam-
gente illo (vt fit) ac manibus locum pertractante, erupit
in vomitum: quo & ipse frustum carnis ad parua pil-
lularum magnitudinem, in quo vermis, non secus ac bruchus in
filiqua recludebatur, reieciens, ad pristinam statim re-
uersus est valetudinem. Ego quoque Delphis puellam
monialem in curatione habui, quæ cum diu doloribus
per integrum annum afficeretur, se tandem præ angu-
stia circa ventriculum mori exclamabat, & nisi in vo-
mitum prorumpere posset, se moriturā vociferabatur.
quare medicamentum vomitorium cum adhibuissem
frustum magnum carneum albo colore, albuminis ouis
instar, magno conatu reiecit, ita congelatum ac induratum,
vt cultella acutissimo vix diuidi posset; & ab omni
dolore statim liberata, deinde sana vixit. Carnis quo-
que frustulum, cum de pectoris morbis ageremus, tu-
sus reiectum à muliere, ex Beniuenio scripsimus, & quod
etiam nos in aduocato vidimus, de quo aliās diximus.
Sed, quod æquè admiratu dignum, refert Benedictus
Veronensis lib. 13. cap. 22. de generibus vomitus, quen-
dam lapidem, nucis inglandis magnitudine, euomuisse.
Refert quoque Nicolus cap. proprio De vomitu, inter
reliqua admiratu digna, lapidem omni magnitudine vo-
mitu reiectum esse. Ceterum qui eiusmodi vomunt,
non oportet vomitum inhibere, cum omnia talia præ-
ter naturam sint. Et sic qui hæc vel atram bilem ve-
rmes vomitu reiciunt, vt hæc puella faciebat, non
oportet inhibere; sed eius causam tollere, & talia quo-
que medicamenta præscribere, quæ vermes necant, &
expellunt.

expellunt: de quibus latius suo loco dicemus cap. proprio De vermibus. usq; expulsis ventriculum quoque roburare oportet. Hac de vomitu. Si de iis plura desideres, quæ vomitum excedentem & reprimunt & constringunt, vide Aëtium, tum alios auctores, iam superius citatos, & qui supra Rhasem scripsere.

OBSERVATIO XX.

De Stomachi dolore.

ICHTHYOPOLA Delphësis, qui in Flandrica platea comorabatur, ingenui stomachi dolore afficiebatur, cum insigni clamore, ut sese quietum tenere non posset, ob nimiam angustiam, qua affligebatur. Ad hunc accitus, cum decoctum florum chamomillæ in ceruisia communi præbuissem, emissis ructibus & in sudorem solutus, incantamenti instar omnis dolor evanuit: ut nullis aliis præsidiis opus fuerit uti.

SCHOLIA.

OMNIVM inter sanissima symptomata habentur stomachi dolores; deinde inflammationes, inflationes, abscessusq; molliores, ac ulcerationes. Sed nunc de stomachi prius dolore agemus, qui interdum impatibilis est, & mortem sæpe accelerat. In eius ostio sauior sentitur, quem & cardiacum quidam vocant, & e dolore, alij cardialgiam vocarunt, de qua prius dictum est; quæ refertur ad intemperiem calidam, cum materia biliosa. At stomachi dolor interdum & morbus longus est; in quo affectu brevioris sunt vitæ. Dolorem ipsum aut inflatio sequitur, aut ardor modo inflammationis, inter-

LII DE STOMACHI AFFECT.

Doloris sto-
machi diffe-
rentiæ.

Affectus præ-
ter naturā.

Pars affecta.

Varij stoma-
chi dolores.

intercisiones torsionesq̃, vel rofiones sequuntur; quæ tormenta stomachi alij appellauere. Est autem stomachi dolor, tristis & peruersa sensatio, ab aliqua lædente causa. Et dolor omnis, aut stomachum distendit; aut degrauat, aut pungit, vel mordet eroditve: aut imo afficit ventre, aut medio, vel ipso ostio. dolor quoque continuatur, & interimit: aut periodicus est; qui interdum confecto cibo sedatur; interdum hominem exinanito ventre vexat. Aliquando assumpto cibo torsiones solent quiescere: modo ingens dolor est, cum cibus tantum conficitur. Alius verò dolor vomitu bilioso sedatur aut acetoso, qui in terra ebullienti similis est; alioquin continua poena est. Aliquibus quotidiano pituita vomitu, manè præsertim, quiescit dolor. Acutum stomachi dolorem quedam consequuntur: frigidus sudor, cordis palpitatio, pulsus frequens, ac formicans, ac animi defectus. Dolor ventriculi, sensus est nociuus eiusdem, & symptoma tactus lesi. Quæ pars sit affecta iam satis constat: vel est in ore ipsius ventriculi, vel in ventriculo, aut parte eiusdem, nempe in concauitate vel tunicis ipsis. atque hoc symptoma pendet à morbi intemperatura materiali vel immateriali: à materiali quidem humorali, vel ventosa, vel à solutione continuæ. Hic dolor ratione sua essentia distinguitur, grauans extendens, perforans, pungens, mordicans; quamui plures haberi possint, vt ex Montano cap. De dolor capitis diximus. Sed dolores stomachi cōmuniter, iuxta Neotericos, ad quatuor referuntur; ad grauantem, extendentem, pungentem, corrodentem. Vel alia diuisio fit ex parte loci, partium stomachi læsarum. in toto, vel in parte, vt iam paulo antè diximus, vt in orificio vel fundo. Rursus quilibet ex his, intensus, remissus, mediocri-
continuu

continuus, periodicus, & sine periodicis. Et qui interpolatus est, ab euentu ipsius doloris varius quoque esse potest, dum cibus in stomacho est, vel descendit; vel stomacho vacuo, aut inanito, vel intenditur, cibo iam digesto, vel cum digeritur. Sedatur etiam (vt iam paulo antè diximus) vomitu, ructu (vt huic nostro agro eueniebat) aut ventositatibus superius vel inferius emissis, vel sensibili expulsionem humiditatis aquosae; vt contigit patri Ioannis Matthaei de Gradi. & nos hoc tempore puellam in curatione habuimus, cui idem eueniebat. Iam quoque dolores alij noui, recentes, breues, diuturni: quidam ad alios morbos succedentes, vel per se incipientes, vel simul concomitantes cum aliis symptomatis, vt fluxu ventris, spasmò, vel stomachi singultu: hac enim omnia ad morbi cognitionem, praedictionem, & curationem faciunt, vt exempla subsequèntia ostendent.

OBSERVATIO XXI.

De ingenti stomachi dolore in potatore.

ALBERTVS chirurgus Delphius, si quis alius potator egregius, anno 1565. sub Martij finem, cum plurimos dies noctesque vario potu ventriculum impleuisset, modò vinum rubrum bibens impurum, modò ceruisiam crassissimam, eamque valdè feculentam & recentem, cum puluere zinziberis & zaccharo; domum rediens, post mediam noctem excitatus intolerabilem dolorem in stomacho patiebatur, vt se veneno infectum clamaret: dolor enim adeò grauis erat, vt se in lecto continere non posset; cum

totius

totius corporis concussione, ut astantes hominem iam iam morituum existimarent: ac pro deplorato habentes, extrema inunctione per sacrificium peracta, ita illum in dolore reliquerunt donec manè ad eum accitus, apprehendi crura totumque corpus adeò tremore concuti, cum totius lecti commotione. At vix mihi interroganti locum affectum ostendere potuit: tandem ostendit se circa mucronatam cartilagine[m] adeò dolore torqueri, tamquam pugione perforaretur. astantes autem narrabant, post potum insignem & diuersum, hoc malum originem suscepisse. Vrina quam tunc inspiebam, minimè tincta erat, sed admodum cruda: non sitiebat, nisi exiguum potus flagitando, cuius si vel guttā in ventriculum demitteret, mox in gutture & in stomacho se suffocari clamabat; lingua minimè arida existente, neque potu descendente. Aderat inanis vomitus, vel nausea, eum ad vomitum frustra incitans. Sequens igitur vomituum præscribo: *℞. hordei mundati p. j. flor. chamomillæ (ob dolorem) p. ss. seminis anethi ʒ j. ss. bulliant in aqua communi; & huius colaturæ accipe ʒ iij. addendo syr. ex infus. ros. communi, oxymelitis simplicis, syr. de cich. Nicoli, cum rhubar. ana ʒ ss. misce. sumebat tepidè; & euomit ceruisiam satis copiosam & pauca biliosa. Dolore tamen aequè permanente, vocatur & secundus medicus, Cornelius Ericius, collega meus. Pulsus erat contractus; & ne copia ceruisiæ & vini suffocaretur, sequens medicamentum vnà præscripsimus: *℞. folior. senæ ʒ vj. agar. femin. albi leuis ʒ ij. cinna-**

momai

moni ʒ j. sem. anisi ʒ β. bulliant in ʒ ix. decoct. communis; & fortiss. expressioni addendo ʒ ij. syr. ex infus. ros. commun. misce pro ij. dosibus. Vnam cum statim sumpsisset, medietatem portionis euomuit, interim bis copiosè excreuit multa biliosa, fœtida & aquosa, in maxima copia; & simul plurima euomuit. Ab huius medicamenti operatione mox incidit in somnum, deinde & sudorem: & bene se habuit. Intereà ad ventriculi roborationē capiebat subinde ʒ ij. vel iij. specier. diarod. abb. in tabulis. Altero die cum rediremus, nullo dolore torquebatur: vti & nocte subsequente: vt se iam sanatum diceret: ideò reliquum potionis non dedimus, nisi tertio die alteram dosim: & aluum commodè reddidit, & perfectè sanus factus est, quamuis in primis ab astantibus pro mortuo habitus.

S C H O L I A.

INFINITÆ sunt causæ doloris stomachi: & inter Cause.
 Iprocatarcticas præcipuè cibus potusque inordinatè sumptus; vti in hoc chirurgo: nam oriri potest ex cibo, vt porro, cape, allioq; & his similibus, vento quoque septentrionali; vel si post labores sudoresq; nudum fuerit corpus frigori expositum: nam & dolor ex gelida pota subitò quandoque interimit, aut in colicum commutatur. Potionatis verò veneno, intolerabilior dolor habetur; & ex medicamentis valdè adurentibus, vel soluentibus, vel ex percussione, casu, offensione. Sic causa mediata doloris duplices esse possunt; vel primitiue, de quibus nunc diximus; vel corporeæ: vel immediata, vt intemperies calida, frigida, sicca: humida, sine
 H materia,

materia, dolorem non facit; vel est cum materia, aut acuta intus mordente, aut corrodeute & mordente intus humore, vel adurente, vel utroque modo, ut in calida inflammatione, ex humoribus simplicibus, aut compositis, quale est acetosum salsum crassumq³, phlegma, vel viscosum, vitreumq³, omnium teterrimum. Ad melancholicus item humor acetosus dolorem excitat periculosum. Sed inter omnes cruciatus, qui inter tunicas insedit humor vitiat³, seniores pœnas excitat vel oris stomachi præsertim. Ita & continui solutio spiritus interclusus. Quod ad causas corporeas attinet duplices quoque habentur: vel per communitatem seu consensum, vel per essentiam: per consensum, ut à toto quemadmodum in febribus; de quibus satis dictum est in libris nostris de febribus; aut crisi, aut à membro particulari, ut cerebro sibi communicante, aut absolutè, aut mittendo materiam catarrhalem; ita à nervis, splene atram bilem in ventriculum euomente vel mittente; à bile, ut in hepate seu fellis vesica: ab intestinis, ut vermicibus, ventositatē & vaporibus ex fecibus malignis eleuatis in ventriculum: sic à renibus ut in dolore calculi ab utero, ut mensium retentione, hæmorrhoidum. Per essentiam verò, sunt humores iam dicti in ventriculo fundo aut tunicis inherentes. Ad causas remotas referri possunt nocumenta concoctionis, & quacumque intemperiem ventriculi labefactant. Hæ causæ perquirendæ certis signis, ut exemplis docebimus, antequam curationem instituamus.

OBSERVATIO XXII.

De dolore ventriculi intolerabili, cum hypochondriorum suspensione.

GEERTRVDIS Bartholdi, cognata nostra, mulier si quæ altera pulcherrima, trigessimum annum cum complevisset, anno 1546. mense Iunio in intolerabilem dolorem stomachi incidit, cum hypochondriorum suspensione. Lotium huic extremè crudum & album erat, instar puræ aquæ. cum variis medicamentis curari non posset, dolorque magis intenderetur, & difficulter aluus solueretur, post absinthij decoctum, cum liquida pharmaca planè & semper abhorreret, summo diluculo huic adhibui stomachici laxativi calidi in tabulis confecti ʒvj. unica dosi, cum difficilis solutionis esset: quo medicamento octies aluum deposuit, & multa putrida & pituitosa excrevit. & quia operabatur non sine torminibus & angustia, pro ablutione pharmaci dedi cyathum vnum iusculi pulli: à quo postea cum vnū secessum adhuc habuisset, dormiuit per totam noctem subsequentem, vsque in maximam lucem diei subsequentis, cū antea præ dolore per quatuor aut quinque dies ac noctes non dormiuisset. A somno autem surgens, ab omni dolore liberata sana omnino euasit. Cæterum, quod ad stomachicum laxatiuum attinet, quod in officina à pharmacopœo paratum habebatur; hæc erat eiusdem descriptio: ꝛ. sacchari optimi lib. j. cinnamomi, zinziberis ana ʒij. caryophyll., ga-

H 2

langæ

*Magistrale
laxatiuum.*

langæ ana ʒ j. nucis muscatæ, spicæ, ligni aloës,
cardamomi, macis ana ʒ β. Si verò laxatiuum
facere volueris (quo nos hîc vti sumus) addatur:
ʒ j. scammonæ præparatæ. coquantur cum suffi-
cienti quantitate aquæ saccharatæ; & fiat confe-
ctio in tabulis. Attamen hîc cautio adhibenda,
quòd ea non liceat vti in magna dosi: nisi in cor-
poribus robustis, expertis & notis. Ided cùm hæc
mulier (vt aliàs sæpe experti eramus) difficilis so-
lutionis esset, & fortis admodum, dosim auximus
ad ʒ vj. alioqui vix ʒ iij. aut iij. dedissemus. Est
autem medicamentum forte, ob scammonæam,
& vehementis operationis; in hoc tantum casu
conferens, ad pituitosos & crudos humores in
ventriculo collectos habentes: vtile quoque ilio-
sis, cholicis doloribus à materia pituitosa vel ven-
tositatibus crudis; nequaquam verò in morbis
calidis; vt eo tempore medicus quidam, sed Em-
piricus in omnibus ferè morbis, etiam calidis &
febricitantibus, malè dabat, & numquam ferè
laxans pharmacum propinabat, quin aliquid &
huius laxatiui stomatici admisceretur. Præ-
ceptor meus Bononiæ, Elideus, medicus egregius,
hoc sequenti in simili casu utebatur: R. electuarij
de dactylis ʒ β. philonij Romani ʒ ij. cum aqua
chamomillæ, fiebat portio brevis. In summo do-
lore dabat aliquando ʒ j. philonij, prout particu-
laria suadebant. Vide & hoc sequens: nam com-
modè ab ipso quoque adhibitum aliquando fuit:
R. elect. de dactylis ʒ vj. philonij Romani ʒ j. cum
ʒ iij. aquæ flor. chamomill. At mulieri Braban-
tiæ, Alcmariæ, sexaginta duorum annorum,
simili

simili dolore correptæ cùm tabulæ post purgationem ex elect. de dactylis ad ventositatem & pituitam stomacho infarctam & suspensionem hypochondriorum exhibitæ essent, & non iuuant neque linimenta apta neque ventosæ siccæ applicatæ ventriculo (seu potius inter umbilicum & stomachum) solo hoc fotu tandem dolor sedatus est: qui ita habebat: \mathcal{R} . rad. althææ \mathfrak{z} β . flor. ros. rub. flor. chamomill., summitatum absinthij ana m. j. coquantur in aqua chamomill. & aqua communi q. s. pro lib. j β . in fine addendo vini Rhenensis optimi, aquæ ros. & aceti ana parum, & fiat fotus. quo omnis dolor cessauit. ad eò illud medicamentum approbavit, ac diuinum appellabat, vt memoriæ inscriberem, vt alios simili malo laborantes à dolore curarem. Ita quoque Margareta Cornelij Ioannis illius viri consularis filia, mense Nouembri, anno 1571. cùm in dolore stomachi intolerabilem incidisset, post purgationem vniuersalem adhibitam, hoc sequenti fotu ab omni dolore incantamenti instar fuit liberata: \mathcal{R} . absinth. communis & Roman. flor. chamomill. ros. rub. menthæ, omnium exsiccat. ana m. j. sem. sumach, myrtill. ana \mathfrak{z} β . flor. meliloti p. j. coquantur in aqua communi pro lib j β . colat. adde spec. diarod. abb. \mathfrak{g} ij β . specier. arom. ros. \mathfrak{g} j. aquæ ros. \mathfrak{z} ij. aceti ros. \mathfrak{z} j β . iterum semel ebulliant; & fiat fotus pro ventriculo.

S C H O L I A.

F R I G I D A M verò causam flatibus quidam haud imperitè iungūt: nam vehementes dolores, tensione

H ;

corum.

Piruita præ-
fertim cras-
sior est ma-
teria flatuū.

eorum excitantur. materia verò flatuum, pituita est. Ita in duabus istis mulieribus aderat pituitosus humor crudus, flatuosus, hypochondrium non minus quam ventriculum extendens. Est quoque pituita hæc crassior; vnde turbidus vapor, multusq; eleuetur, idq; à tepido calore. Sic 12. Meth. med. Galenus cap. 8. ait, grauissimos à retentis flatibus dolores fieri: retinentur obstructione vel densitate loci, in quo cohibentur, vt transpirare nequeant: aliàs si soli humores sint crassi & viscidī, non fit dolor vehemens. Gignuntur verò flatus, cum calefiunt humores crassi & glutinosi: sic enim in flatu crassumq; vaporem vertuntur. Neque enim necesse est exhalationem semper illam siccam esse & terrestrem, quam in meteorologicis materiam flatus dixit Aristoteles: sed sat est spirituosam & tenuem esse substantiam, præ ea, ex qua gignebatur. Agens verò est calor: locus autem (vt quidam volunt) in quo flatu includuntur, ventriculi tunica sunt. Nam si in medio spacio aceruetur, facile vacuatur: ex ea verò parte difficillimè, & longo tempore, ac non nisi vehementer extenuatus, & dissolutus: quod cum non nisi calidis fiat, metus est, ne rursus plus, eorum usu, flatu eleuetur, quam tollatur. Facit ad difficultatem cura, quod non sicut in acri humore, tunc sopientibus vti possumus, quæ & dolori prosunt & causa humorem sua frigidityte temperant: at hic causam augent, cum rebellem discussioni crassum spiritum faciunt, & tunicas densant, per quas debebat excerni. Hæc ferè Galenus de flatuoso dolore loco iam dicto. At 14. Meth. cap. 7. fieri flatu ait, vel cum calor debilis est, vel cum humidum crudum, crassum & glutinosum humorem contineat. Vnde excrementū quod natura excerni insensili tran-

spiratu

spiratu consueuerat, iam non transpirat : praesertim si densa sit pars in qua continetur. Quin subdit, Calor quoque auctior hoc facere potest; dum tamen tantus non sit, ut digerere possit. Idem etiam §. Aphoris. ultimo, Fit flatus vel imbecillitate caloris, vel ex crassitie humoris; ut hic fiebat. Ex quo patet, non esse temere admitendum, quod quidam sine discrimine dicunt, tepida esse quae flatus gignunt. Nam à valido calore ibi fieri aliquando ait, materia ratione; & frigidis curat. Praeterea id asserit lib. 12. cum multos melius curari colicos ait, sine calidis fomentis: quoniam ab illis saepe augetur dolor, aucta doloris causa, ex 6. De loc. aff. 2. Dolores à flatibus fiunt, vel cum frigidus crassusque humor aceruatus est in corpore crasso, & denso genitus, qui egredi nequeat, vel à flatuoso spiritu: has inquit causas esse probabiles. Retinetur crassitie, & densitate corporum: & humores tum alterare, tum tendere partem possunt, ut spiritus tendere. Quod verò imaginantur quidam, calorem plurimum extraneum facere flatus, cum naturalem minuit, fabulam esse putat Iacchinus, vir doctissimus. Quicumque enim calor vigeat, flatus tollit; nisi, ut diximus, qualitatis materia ratione etiam multos flatus faciat. unde neque in febribus vrentibus fiunt, neque in auriginosis, iuxta aphorismum. Quod si in prauis febribus appareat inflatus venter, id euenit, quoniam non sunt calore vehementes, & cum multa cruditate humorum. Materia verò aggregatur tum ciborum ratione, qui crassi natura sint & viscidum; tum ex multitudine & crebra cruditate: & in summa ex omnibus causis, quae pituitam gignere possunt. Quae verò calorem debilitant, vel spiritus resoluendo, vel per se refrigerando, ut frigida potus, aut frigida vina, dolorem

facere possunt, ut fieri frequenter videmus. Imò post frigida potum doloribus ventris quidam perierunt; quibus scilicet id viscus natura erat imbecillum, & aderam materia, è quibus flatus gigni poterant, in ipso ventris corpore aggregata. Sic dolor ab externo frigore excitatur; præcipuè si extrema patiuntur: quæ sunt partes nervosæ, & frigida & exangues; à quibus facile frigus peruenit ad ventrem. Auget etiam frigus dolores: quoniam densat tunicas adeò, ut non transpiret quod in eis continetur: hinc magis dolor excitatur, cum flatus exitum non inuenit. Et quia vnà cum pituita flatus aderat, tensio sentiebatur, ut desumpti putarent tunicas ventriculi: & etiam nos tensionem sensu seu tactu percepimus, quæ etiam super abdominis musculos sentiebatur. sed de ventriculi inflatione postea latius. Sed hic etiam aderat simul, ob materiam frigidam, grauitas ventris, sine siti atque ardore: & sentiebatur in stomacho quedam frigiditas. Nunc aliud exemplum adferamus.

OBSERVATIO XXIII.

De dolore stomachi, ex pituitoso humore ac tensione.

PVELLA admodum pituitosa, tempore hiemali, paupercula, cibo crudo viens, lacte & aliis cibis pituitosis, incidit in dolorem ventriculi vehementiorem: cui aderat distentio quadam. simul sentiebat magnam ventriculi granitatem; propter quam spirandi difficultas accidebat, ventriculo distento septum transuersum comprimente. non sitiebat, neque aderat ardor aut calor: cibis

cibis quoque ad infimas partes ventris descendentibus leuabatur nonnihil; & flatibus siue rutibus emissis, vel per aluum exclusis, & calidis iuuabatur: ita vt facillè intellexerim, ex pituita flatulenta, hunc dolorem originem cepisse, qui & summo studio statim anodynus placandus erat, ob os ventriculi exacto sensu tactus præditum. Ideò statim hunc fetum præscripsi: ℞. flor. chamæmeli, meliloti ana m. j. absinthij, flor. ros. rub., summitatum anethi ana m. ss. seminis lini, fœnigræci ana ℥ ss. seminis anisi, carui, fœniculi ana ℥ ij. coquantur in aqua communi q. s. pro lib. ij. in qua calida madesiat spongia: quæ deinde expressa ventriculo adinoueatur; eaquæ foueatur: & deinde oleo subsequenti inungatur: ℞. olei chamæmel., anethini, lilior. ana ℥ ss. his commissis fiat inunctio. Quibus aliquo modo sedabatur dolor, grauitate adhuc permanente. Ideò & has pilulas deglutiendas præbuimus: ℞. pilul. de hiera simp., mastichinarum, trochisc. agarici ana ℥ j. cum aqua absinthij, fiant pilulæ vij. tempore matutino dentur. quibus optimè aluum deponeret. Verùm cum adhuc materia tenaciùs ventriculi tunicis inhaereret, & dolor in totum non cessaret, licet nunc non ita vehemens esset; post decoctum absinthij, florum chamomillæ, sem. fœniculi & anisi in aqua decoct. addito oxymel. simpl. & compos., hanc purgationem exhibui, cum satis robusta esset: ℞. diaphœnici ℥ ss. aquæ flor. chamomillæ ℥ ij. misce. & sexies multa pituitosa excrenit; etiam ventositatibus emissis. & dolor ita mitigatus est, vt vix de eo ampliùs conquereretur. Tunc

ventriculum roborauimus intus sumptis tabuli
 sequentibus, seu rotulis: & specier. arom. ros. sine
 musco; specier. diacimini ana 3 j. dissolutis in
 aqua absinthij & flor. chamomill., adiectis 3 iij.
 sacchari albiss., fiant rotulae ponderantes 3 iij. ve
 3 β. & capiat ante pastum iij. horis vnam. Prate
 rea iussi vt hunc puluerem in officina pararet: &
 coriandri preparati 3 iij. anisi, cinnamomi selecti
 foeniculi, cari ana 3 ij. maceris 3 j. sacchari ad
 pondus omnium; fiat puluis, cuius detur 3 j. vel
 plus in fine pastus: & praecepi vt eo sumpto nihil
 biberet, neque amplius ederet. Extrinsecus vn
 guento sequenti ventriculum commodè inunxi
 mus: & olei absinthij 3 β. olei nardini, mastichini,
 cotoneor. ana 3 ij. garyophyl., menthae siccae, car
 damomi, coralli rub., mastichis, flor. ros. rub. ana
 3 j. ceræ exiguum; fiat vng. quo ventriculi regio
 inungatur manè & vesperi ante pastum: & postea
 applicetur ceratum Galeni stomachicum, ad scuti
 formam. Quibus praesidiis ab omni dolore libe
 rata fuit.

S C H O L I A.

Signa.

A causa fri
 da materia.
 II.

SIGNA doloris stomachi diligenter perscrutanda;
 Santequam ad curationem accedamus. Si fiat ex
 nuda intemperie, iam diximus signa, cum de imbecilli
 tate stomachi ageremus. & si cum materia, etiam ex
 parte signa declarauimus: quibus haec adiungere pote
 rimus. Si igitur à causa materiali frigida, grauitas ven
 tris aderit, vt iam diximus, sine siti ardoreque; & in
 stomacho frigus sentitur, calidis iuuatur: quibus si aeris,
 temperamentum, anni tempus & constitutio, victusq;
 ratio

ratio praterita respondeat, plurimum ad causa inue-
 stigatorem facient. Ex pituita salsa, in ore falsitudo
 molesta est, non sine siti valida. ex phlegmate aceroso
 vel melancholico humore (vt sepe iam dictum est)
 rofiones aderunt stomachi sine aestuatione: aut vomitus
 acres acetosi melancholiam demonstrant, quibus dolor
 sedatur, & lien tumet, tum difficilis malaq; concoctio
 in ventre fieri solet, quod & ex phlegmate contingit. A
 causa calida materiali, quae hominem supra modum in-
 quietat, punctiones, intercisiones, morsus siti q; as oris
 siccitas, vel amaritudo, stomachi ardor aestuans, & fe-
 bris interdum sentitur, ac pulsus, vt initio febris, coar-
 ctatus; tum vomitus: aluus biliosa est. At stomachi in-
 stabiles rofiones à iecore materiam effundi indicium
 sunt: inde pulsus ad interiora remittitur, ac extrema
 frigescent, animusq; linit. Quae praterea (inquit
 Galenus) agrum iuuare solent, humoris naturam de-
 nunciant: dolor à materia calida (vt tradit Hippoc.)
 hordeacea pulte sedatur. Ita in frigida, castoreo cum
 aceto scillite. Si doloris origo ex imo ventre oritur, ni-
 hilominus cibi desiderium aderit, illeso stomachi ostio:
 verum singultus ac erosiones molesta erunt. At humo-
 ris crassitudo, quo crassior est, eo maiorem affert dolo-
 rem atque tormentum, cum ventris grauitate; vnde
 pulsus inequalior fit, & vomentibus agris pulsus ad
 temperamentum redit. Periodicos dolores patiuntur
 cum plurimum melancholici, & qui praecordiorum
 dolores sustinent. Ex vento, adest flatus crepitusque
 ventris frequens ac singultus: tum nec in eodem loco
 figitur dolor: qui tamen veluti clauus infixus haeret, &
 cutim extendit: tum ad mota cucurbitula profunt. In
 his tormentis extrema si frigescent, vt Hippoc. scribit,

malum

Ex pituita
salsa.Acida & me-
lancholica.A causa ca-
lida materia
li.In imo ven-
tre.A crasso hu-
more.Periodici
dolores.

Prognostica.

malum augurium faciunt, si perseverant instanter: verò insuperabiles pustula orta fuerint nigra, ac prout nūc exulcerentur, letales sunt: letalis est & gravis somnus, siq; præterea dexter pes vésicam extulerit exitialis habetur: magisq; si ager dulcia admauerit. Vterum gestantibus peculiare malum est. Dolor quæque qui ex humore fuerit inter tunicas cohibito, agrius curatur. Dolor stomachi à causa externa vel primitiva, minùs malus; cum facillè remoueri possit, excepto illo qui à medicamento venenoso aut corrodente vel veneno fiat, vel gladij percussione: tales difficulter tolluntur; vii etiam illi magis mali qui ex causa corporea oriuntur: minùsq; malus ex vna causa, quàm ex multis simul complicatis, etiam si ex mordicatione febris ephemera vel alia subsequatur perdurans aut continua. At dolores stomachi ex apostemate vel vlcere vii vel numquam curantur, nisi nacti fuerint diligentem & expertum medicum. Omnis dolor rodens, acutus aut diu perseverans, deducit ad syncopem, imò ad mortem, teste Galeno 5. De loc. aff. cap. 6. cum ex eo narrat subsequutum spasmodum aut epilepsiam. Ita hisce diebus puer cum ieiunus esset, ac radicem angelicæ siluestris comedisset, ingenti dolore stomachi correptus mox epilepticus concidit, corpore toto, ac manibus simul conuulsis ad quinque horas: qui tandem difficulter à me curatus fuit. Erat puer quinque annorum, alioque valdè agilis. Pregnantes facillè stomachi dolore quoque apprehenduntur, ob menses restrictos: & facillè tunc animo linquunt, vt matri meæ charissima Margaretæ Nannæ, ex Baiarorum familia, contingere solebat: sed salis momento in os indito, mox reuiuifcebat, vt antea quoque dictum est lib. 17. nostrarum obseruat.

OBSERVATIO XXIII.

De dolore stomachi à rebus calidis assumptis.

MERCATOR ille, qui in foro Delphenſi habitabat, pro cuius ædibus Rex interſignium erat, tormina in ventre & circa vtraque hypochondria cùm pateretur, ebibit pluſquam dimidiam pintam vini Romani vulgò dicti, cum ꝑ. ij. pulueris granorum paradisi: nam hic aromatarius erat, sed eo vino ebibito incidit in ventriculi dolorem, tum ventris crudeliſſimum & atrociſſimum: ita vt præ angustia & rumpi & ſuffocari videretur: neque euomere neque ſecceſſum habere potuit. Vociferabatur ſe ignem in ſtomacho habere. Ad hunc eodem die accitus 20. Aprilis die anno 1563. ac eadem hora qua mori putaretur, ſtatim dedi ꝑ. iij. vel plures decoct. hordei in qua ꝑ. j. ſeminis anethi incocta erat, adiecta ꝑ. j. ſyr. ex infuſ. roſ. Eaquẽ potionẽ tepidẽ ſumpta, vinum euomuit, & liberiùs anhelitum trahere potuit: & à vomitu paulo meliùs habere cœpit; & incidit in ſomnum. Poſt ſomnum, quamvis minùs doleret, circa præcordia grauitas quædam remanebat cum dolore; & cùm aliu non redderet, paulo pluſ quàm dimidium portionis ſequentis propinaui: ꝑ. folior. ſenæ ꝑ. vj. ſeminis aniſi ꝑ. ſ. habar. ſelecti ꝑ. iij. ſchoenanthi ꝑ. ſ. ebulliant in ꝑ. ix. decoct. communis, & fortiſſ. expreſſ. adde oxyzach. ſimp. ꝑ. j. ſyr. ex infuſ. roſ. ꝑ. ſ. miſce pro duabus doſibus: vna aſſumpta quinques aluum depoſuit, & à dicto ſymptomate in totum liberatus eſt; ita vt alteram doſim non ſumpſe-

sumpserit. Potus huic erat pūsana hordeacea, eò quòd febrem timerem, sed ea non superueniente, optimè deinde habuit.

S C H O L I A.

CARDAMOMVM (quod vulgò granum paradisi dicitur) ultra tertium gradum calidum & siccum est, vel saltem in tertio gradu. habet enim vim valde excelsa factoriam. Diosc. potum ex aqua ad comitiales ischiadicos, tusses, nervorum resolutiones, rupta, vulsæ termina, latus ventris tineas valere scribit; & ex vine potum renibus, difficultati vrinae, à scorpione ictis, auxilio esse. Verùm hic aromatarius cum in substantia sumpsisset, præter iustam dosim, plurimum obsuit, & pane hominem necavit: quamvis eidem aliàs (vt narrabat) ad similem dolorem in minori quantitate sumptum profuerat: nunc autem plurimum, & ad inter-
 necionem ferè lasit. Caterùm dolor stomachi cum ex variis causis fiat (vt diximus) vario modo quoque curatur. Si enim ob intemperiem calidam, vel frigidam doleat, eodem modo curatur intemperies rebus contrariis & alterantibus. Sic & dolor ex vento frigidus, aut aqua gelida epota, contrariis remediis sanatur. Stomachus enim pane calido sape fouendus est, aut laseris assere talesfacto, aut cupressino, aut piceo: alij feruente cinere vtuntur in sacculo. In potu verò betonica farina cum vino efficaciter sumitur, si sine febre fuerit; alioquin cum calida aqua datur. At hic ob cardamomum sumptum, aqua hordei & eius cremor conueniebat: iuuabat & vomitus, quia calore & copia ventriculum extendebat: ita & tormenta acrosiones ex malo cathartico, vomitionibus iuuantur, clysteribusq; ita & ex cibis

Curatio doloris stomachi.

Dolor ex vento frigidus aut aqua gelida epota.

ex cibis pariter acutis fieri debet, pinguiaq³ cum insipidis dari iubent. Ex malo medicamento, venenato, crodente, ager vomere debet, atque pro veneni ratione remedia communia ac particularia ex libris venenatorum querenda sunt: sicuti & veneficiorum auxilia ex iisdem libris haberi debent. Vbi dolor vehementissimus est, & suspicio sit de aliqua materia venenosa aut medicamento venenoso assumpto, theriacam recentem dare prodest. Si ex quavis causa primitiva vel extrinseca venerit, ea ipsa tollenda. & si ex intemperie nuda, siue calida siue frigida, curetur vt de imbecillitate ventriculi prius dictum est. Si dolor sit à materia frigida, huius curationis exemplum posuimus. Hic in cibis, portionibus, stiptica vitanda tradit Galenus, ante stomachi exinanitionem, si pituita nimium redundet, nam crasse, dura, sicca, terrestres sunt materia (adstipulante Zoar) quæ dolorem stomachi inferunt. Iis exiguus cibus ac potus offerendus, facilis concoctionis, boniq³ alimenti, aliusq³ vtiliter exinanitur. Sed prius necessarius, modo in ieiuno, modo post cibum vomitus, vtilis exercitatio, gestatio, nauigatio, frictioq³. Nihil edendum, aut bibendum nisi calidum, vitatis tantum iis quæ pituitam contrahere consueverunt. Sed in iis considerandum est, an stomachi duntaxat causa fiat, an alterius membri propinquitate fuerit. Primum igitur materia digerenda, ac exinde purganda; vltimò stomachus omnino recreandus est. De vomitu verò, leuibus concitandus est, aqua tepida, cum acetoso syr. simplici, aut composito: si id fieri minimè potest, alius commodè mollienda est; nam aliud trahere violentè, periculosum est, quandoquidem materiam vndequaque contrahit. Aquosa pituita hydromelite ac syr. acetos. simplici compositione aptè

Doloris stomachi e cathartico remediun.

Curatio doloris stomachi à materia frigida.

apte preparatur, vel mentha syrupo: at viscosum
 phlegma oxymelite compos. vel scillitico; vel si ex icterum
 fluxerit materia, vel venis. At quamquam dolor
 ventriculi à causa frigida calidis medicamentis succurritur;
 tamen si hepar calidum est, verendum, ne dum
 uni mederis, alteri noceas; & calidum medicamentum ven-
 triculum iuuans, hepatis caliditatem augeas. Mitiget
 itaque dolor anodyni supra descriptis: cauendum tam-
 en ne hepatis regio fomentis illis vel vnguentis tan-
 gatur. Mitigato dolore, pilula exhibenda, ex hiera-
 adiecto rhabar. Si à cerebro verò, stœchadis syr. digeratur.
 Digesta materia aquosa, deiniatur cum aloë lota.
 At quod in tunicis ventris impactum est, hiera quoque
 perpurgatur: vel si valdè viscosum, hieris maioribus.
 Deinde stomachum, vt prius, tam sumptis quam ad-
 motis roborabimus; vt speciebus aromat. ros. & simili-
 bus: & cerata stomachica, emplastra, linimenta appo-
 nemus; & inungemus: vel sacculos iam saepe dictos
 adhibebimus: quorum copiam vide apud auctores, &
 precipuè apud Arculanum, vel Benedictum Veronen-
 sem, qui ea magis Latina in vsum suum transtulit. Si
 à bile dolor stomachi; rosionibus æstuat: solent autem
 qui tentantur stomachici, interpositis quibusdam dila-
 tis, hunc humorem euomere. sed qui perseverat dolor
 perniciosus est, & interdum hominem necat. is recte
 alius ducitur, poriones absinthij dantur: & si calida si-
 materia, in continuato dolore poriones ex violaceo &
 rosaceo syr. nymphaeae, & papauerinus, ex albo semine
 ac calyce. si autem bilis ventriculo innatet, vomitu eua-
 cuanda, aqua tepida ℥ vj. syr. acetari ℥ j ss. misce, &
 post cibum bibantur. digito inde aliquanto in os pos-
 & fauces immisso, aut penna vomitus eliciatur. Si

Curatio à
 bile.

verum

verò egrotus suapte natura non facile vomat, euacuetur sumpta portione sequenti: R. syr. ros. laxativi ℥ j ss. rhabar. puluerisati ℥ j. cum aqua cichorij & absinthij; fiat portio, quæ hora quarta matutina sumatur. Si verò bilis ab hepate in ventriculū per intervalla transmitti videatur, hoc electuario utere: R. diacydonij sine spec. ℥ j. confer. ros., acetosa ana ℥ ss. pul. elect. trium santal. diarod. abb. ana ℥ ij ss. cum syr. ex ros. siccis; fiat elect. molle: capiat ℥ ss. tribus horis ante pasto. Extrinsicus malua iuvat ex oleo ros. vel viol. addita santalorum farina, & inungatur oleo myrteo, & cotoneorum.

Experimento valet ~~ventris~~ gallinacei interior membrana ~~refecta~~ in farinam, ob eam causam, tunditur & datur. Quibus præsidis si non cedat dolor, soporifera non sine metu danda sunt. Si dolor sit ex atra bile, iis necessaria gestatio, navigatio, si longus morbus est, ac diebus interpositis accedat: & si fieri possit, ex nausea vomitus. Vitanda cruditas est, sumendi cibi faciles & stomacho non alieni, vinumq; austerum bibendum, interea humor digerendus cum siliquis fena, polypodio, & aliis melancholiam digerentibus; & venter repurgandus pilulis ex hiera & indis. deinde roborandus stomachus. Et si ex liene veniat, eius ratio quoque habenda, ut prius dictum est. Reliqua vide apud auctores.

AB
Doloris curatio ex atra bile.

OBSERVATIO XXV.

De dolore ventriculi & pylori, per modum consultationis.

REGNERVS insignis iurisperitus & advocatus, quondam Pensionarius Amstelrodamensis, consilium à me petiit, de dolore vetriculi
I fundum

fundum occupante, paulo supra umbilicum, diuturno & per interualla recurrente. cui hæc scripsi. Vt à dolore illo paulo supra umbilicum, vir doctissime, liberari possis, quamuis medicorum illustrium multis remediis vsus fueris: radicem huius mali omnium primò inuestigare oportet. Dolor hic ex ventriculi fundo, ob repletionem & obstructionem, nascens, vno tamen tempore subinde magis affligens, quamuis rarè omnino à dolore videaris planè liberatus; oriri quoque videtur etiam ab exortu intestinorum: quem ex pyloro intestinum recipit. Quidam tamen hunc non priùs vocare intestinum dignantur, quàm in orbes anfractusq. circumuoluatur: atque idè alij simpliciter productionem, alij cum appendice duodeni digitorum, Græci *ἐκφυσις δωδεκάδακτυλον* appellant. Cùm autem hic dolor sæpe sua interualla habeat, longiusque protrahatur, locum affectum & causam diligentius indagare oportet; antequàm curationem moliamur. Locus affectus, iuxta circumscriptionem doloris, videtur esse in locis iam dictis. Est in iis locis quedam obstructio seu *ἐμπειγξις*, quæ etiam ob imbecillitatem locorum dictorum facilè redit; cùm loci dicti iam longo tempore affecti facilè recipiunt, non tantùm nouum humorem, verùm etiam sua imbecillitate eundem, nempe pituitosum, gignunt vel fouent: qui cùm crassior existit, diutius ibidem moratur, ac difficilius soluitur: vnde malum diutius quoque protrahitur; cuius causa etiam concoctio impeditur, quæ fit in ventriculi fundo: & sic ventriculus crudum humorem quoque

quoque demittit ad pylorum. atque huius con-
 sequo, videlicet ex illa materia pituitosa, etiam
 ventositates crassiores & tenaciores, loca affecta
 extendunt, vsque ad vmbilicum ferè, & maiorem
 dolorem inferunt. Verisimile est ac concludimus
 quòd sit pituita inhærens fundo ventriculi, dein-
 de quoque adhærens & pyloro & intestino iam
 dicto. Nam superuacanea quidem pituita in ce-
 rebro, in ventriculo, & in intestinis gigni consue-
 uit: sed in cerebro tenuis & aquosa: in his verò
 crassa atque lenta: hæc enim peculiare est ventri-
 culi & intestinorum excrementum, non fex alui;
 quippe quæ cibi excrementum est commune:
 etenim cum illorum substantia frigida sit atque
 membranosa, crassum certè ac viscosum de se
 excrementum proferet; quale est pituita lenta.
 Hæc igitur secundum naturam gignitur, concres-
 citq. in intestinis: è quibus cernitur aliàs spontè
 fecibus circumiecta descendere, aliàs purgatione
 vel clystere manifestè deduci, aliàs dysenteria vi
 corradit. Quum autem parciùs ea vacuatur sen-
 sim aucta caloris vi, in vasis tandem crassescit, vt
 prorsus obstruens intestina quasi infarciat, fiatq.
 latentium difficiliumque morborum causa. Ta-
 lem pituitam crassam ego in fundo stomachi,
 tum intestino iam dicto collectam & adnatam
 esse existimo; magis tamen vno tempore quàm
 alio: ex qua etiam flatu gignuntur: vnde etiam
 tensio sentitur. sed cum fouentem causam magis
 habeat ob pituitam inclusam crassamque; ideò
 hæc ipsa remediis aptis detergenda & purganda
 erit: deinde loca ipsa affecta roboranda quoque

I. 2. erunt,

erunt, ne eadem gignant vel foucant, recipiant, colligantve. In curatione itaque (vt in omni stomachi oppilatione) damnamus astringentia, & quicquid crassum humorem generat; sed potius attenuantia, aperientia, simul detergentia & incidentia, ob pituitam crassam. erit itaque vtile oxymel simplex, etiam compositum & scillinum, & pilulæ ex hiera. Quare cum hunc virum inuiferemus in Haga Comitum agentem, & apoze- mata incidentia & detergentia & simul pituitam expurgantia præscripsissemus, melius habere coepit. Egregie profuit post pituitam crassam purgatam, vinum absinthite, & ceruisia absinthites; etiam stomacho exterius postea corroborato.

S C H O L I A.

DOLORE urgente, quoad possumus, cibo & potu abstinemus; quoniam concoctio bona esse nequit. Postea dabimus cibos tenues & qui vim extenuandi habeant: erit q³ exiguo potu contentus ager, & meraciore, vitabit q³ frigus in toto corpore, sed extremis præsertim: & cum materia adhuc adsit vnà cum dolore & flutu, propter obstructionem; licet fomenta (de quibus paulo antè diximus) dolorem sedent & insensibiliter vacuent, nequaquam iis utemur in hoc casu; quoniam affectum magis proritant, vbi adsit talis oppilatio & materia infixa est, vomitu non educemus, cum illud adeò crassum sit, vt educi non possit, nisi prius extenuatum fuerit, & via aperta. Transitum verò inter lienem & stomachum, si ibi adsit oppilatio, iis parare debemus: de qua agemus, cum de ictericis atris loquemur; & de iis que ad lienis tumores faciant. bilis autem

De oppila-
tione stoma-
chi.

atra repurganda, ac ne eadem regeneretur, victus rationem emendabimus. Si via quoque inter stomachum ac bilis folliculum, ex morbi regis curatione, praeclusa fuerit, remedia perquiremus, sicuti ad intestina, ubi praeclusus transitus est, ab iliatis & colicis doloribus. ita & iis utemur, quae vias inter iecur & stomachum, vel mesentericarum poros aperiunt; humores incidendo. si crassi sint, & detergendo & repurgando. Durescit & interdum stomachus sine abscessus vitio: unde agrè in coquendo rugas contrahit, maleq; digerit. ex frigore oritur, aut materia frigida in tunicularum meatibus combibita, atque in altera earum infixata. Verùm interior magis officit, apostemati quàm simillima duro: in eo tactus durus est, difficulterq; inclinatur ager: nam in poris tenuibus malum insitum est: tum demum stiptica dissolventibus utendum: & in duritia sine abscessu has potiones utiliter damus, ex mentha, calamintha, & absinthio, & catapotia, ex hiera cum agarico: & emplastrum utiliter imponimus ex mastiche, croco, meliloto, spica, bdellio, cera, & oleo lilino, vel oleo ex violis luteis. At de dolore ex abscessu calido, vel frigido, & ob stomachi vomitum, postea latius.

De dolore
ex stomachi
duritie.

OBSERVATIO XXVI.

De dolore stomachi ex casu oborto.

QVIDAM sacerdos (cui nomen erat Gerardus Backerus) Alcmariæ in via regia dicta habitans, cum anno 1546. è scala cecidisset, cubiti radium fregit: quem chirurgus tractabat. Huic autem post octo dies superuenit stomachi dolor vehementior, & totum pectus occupans. Lotium huic crudum erat: non febricitabat. idèd.

hunc syrupum propinaui: ℞. oxymelitis simplicis ℥ j. β. aquæ hyssopi, fœniculi, scabiosæ ana ℥ j. misce. & cum aluum non deponeret, ita eundem purgaui: ℞. Diacatholici ℥ vj. cassiæ recens extracta ℥ ij. mummia ℥ j. β. dissol. cum ℥ iij. decoct. pectoral. addendo syr. capill. Ven. ℥ j. misce. & sexies aluum deposuit, & dolor magna ex parte cessauit. & sequenti die, cum adhuc aluum deponeret, cyathum vnum iuris pulli dedi. Cum adhuc exiguus dolor in stomacho permaneret cum appetitus deiectione, hoc vng. inuncto dolor cessauit: & ventriculo corroborato appetitus rediit, ℞. olei mastichini ℥ j. olei absinthij, menthacei ana ℥ ij. flor. ros. rub. puluerisatorum, corticum granat., coralli rubei, cinnamomi, masticis ana ℥ j. ceræ exiguum; fiat vnguentum. quibus præstidiis à dolore fuit in totum liberatus.

S C H O L I A.

Hic dolor licet post octo dies à casu prius agrum affligebat, non est dubitandum, quin aliquo modo cadens à scala stomachum læserit. & si nos in principio fuisset acciti, ea de causa sanguinem detraxissemus: sed quia lotium nunc crudum erat, & aluus resistebat, hac purgatio satis ad rem fecit. Quomodocunque stomachus læditur siue casu, siue offensione, siue percussione, vel ictu, periculosum est: nam refert Alexander Benedictus Veronensis lib. 11. cap. 9. ex ictu, propter membri nobilitatem, permultos protinus fuisse mortuos. Nouimus (inquit Beniuennus libro 5. de abditis causis morborum cap. ex) fullonem quendam nomine Petrum, qui vnico pugno stomacho cuiusdam iuuenis violen-

De dolore
stomachi ex
lapidis vel
alterius ictu.

violentius impetito, hominem interemit. Caterum in
 eiusmodi casu inedia ager continendus est, ac protinus
 sanguis demendus est ex rectoraria vena, modo vires
 ferant: in cibo prisana vel alica danda est, sine vino:
 alius singulis diebus mollienda est, ac materia ad ex-
 tremam auertenda est. Alij suadent leniter astringentia
 dari in cibo & potu. & quandoque ex eo ictu sanguis
 erumpit; prodest rhabarbarum cum vino stiptico vel
 rubrica lemnia; emplastro imposito ex farina hordea-
 cea, scilicet ℥ iij. ladam ℥ ss. ros. ℥ iij. aloës ℥ vj. cum
 succo plantaginis, & oleo lilino. Si sanguis conglobatus
 sit, curetur vt iam aliàs dictum est. Interea quoque
 sciendum, quod stomachus interdum aut vulneratur,
 aut compungitur, aut mordaci humore exulceratur,
 vel scinditur; sed incautè acicula acuta deuorata, vel
 acu vel vitro, quandoque perforatur, & vento (vt prius
 diximus) aliquando intus incluso, magno extenditur
 cruciatu. Vidimus (inquit Alexander Benedictus Vero-
 nensis lib. 11. cap 7.) mulieres duas, quæ acus pariter
 criminales, vitri frusta, capillosq; plussculos (vt nos quo-
 que vidimus) vomitu reiecerunt: quarum altera, vt re-
 fert idem Benedictus, exanimata interiit, altera tres
 ingentes caudæ canina arefactos nodos euomuit, qua
 ratione aut quomodo prius ea hauserint veneficia, in-
 dubio est. Sic nos quoque vidimus pannum, clauos, fer-
 ramenta, & nescio quæ non vomitu reiecta. Sic etiam
 Beuiuenius De abditis morborū causis scribit cap. 20.
 mulierem quandam, anciam acum deuorasse; qua nulla
 inde noxa percepta, integrum annum ita vt erat sana
 permansit. quo peracto coepit dolor satis acutus mulie-
 rem ipsam circa ventriculum urgere. cum remedia à
 diuersis medicis nihil proficeret; & sic annis iam decem.

Quibus casu-
 bus intus
 stomachus
 vulneretur.

tali dolore, miseram vitam traheret, ecce acus illa tere-
 brato ventriculo, è paruo demissa foramine, profiliit:
 quam acum Beniuenius vidit, & mulierem curauit:
 qua paucis post diebus, vnitae vulneris facta, in pri-
 stinam sanitatem restituta est. Accedit & huic quod
 Ioannes Langius epist. 40. lib. 2. refert: In gynacio, ait,
 Ducis Iuliacensis, virgo dum sese exornaret, perterrita
 ingemiscens, acus quinque, quas in ore mordicus tene-
 bat, deglutiuit, & per vrinam illasa easdem reddidit.
 Idem Benedictus Veronensis refert de virgine Veneta
 lib. 2. cap. 9. & causam huius reddit lib. 5. cap. 13. in
 suis Anatomicis libris. Ego quoque vidi mulierem Del-
 phensem, in insigni calcariis, ad quam accitus si in cum
 altero medico: qua cum in gutture doleret, Chirurgus
 incautè stylo immisso (vulgo probam vocant) ferreo, è
 manibus elapso in ventriculum, saepe dolore tenebatur;
 & paulatim macie consumpta, cum praesidia hic nihil
 iuuare possent, tandem obiit. vti & inuenis quaeque
 Harlemensis, qui squillas (vulgari nomine garnaren-
 dictas) cum circa Oceanum mare cum puellis luderet,
 deglutisset viuas, oborto dolore in ventriculo hic quo-
 que mortuus est. Caterum illi qui ex veneficio acus
 & alia enormia reiciunt, tum crimes, quidam genista
 // flores recentes aut arefactos, in potu dedere, vt concita-
 tis vomitionibus, omnia ex faucibus erumpant. Nos
 quoque vidimus puellam Delphis in ventriculo dolen-
 tem, per inferiara modo excrementa picis instar nigra,
 vti saponem excreuisse, & lapillos & osium frusta
 etiam per vomitum: qua longo tempore laborans &
 macilentior facta, tandem etiam interijt. Ea vulnera
 aut alteram tunicarum dantaxat ledunt, aut ambas
 lacerat. Latiora stomachi vulnera, quae pro Hippocratis
 sententia

sententia exitialis sunt, singultus & bilis vomitus insequitur, sanguisq; per aluum interdum; & si quid cibi vel potionis assumptum est, ex patefacto vulnere redditur: venarum subinde pulsus elanguescunt, sudores tenues oriuntur, per quos extremae partes exitialiter frigescent. Signa tunicae interioris lasa sunt, dolor vehemens, assumpto acetofo aliquo, vel acuto vel salso; tum vomitus, aut excrementa sanguinea; tumet deinde venter, ac dolet, non sine febre. At si circa os stomachi punctura fuerit aut vulnus, ubi malum grauatum est in anteriori parte, ad decimum tertium spondylion vehemens dolor infigitur; vel magis aliquo acuto assumpto, tum anhelitus difficilior redditur, animus linqvit, sudore extremorum pergelido. At si vna ventris pars percussa fuerit, minus periculi facit: tum supra vmbilicum dolor habetur, & aluus sanguinea reddit. At in medio si offenditur venter, inter

Prognostica
& signa par-
tis ventriculi
lata.

Curatio.

utrumque augurium est. Leues stomachi ictus, Galeni verbis, sanari possunt: Aeger primum temperato conclavi, non in plano, sine vento fumoq; collocandus est; animo securus, sine multo sermone, sed tacitus quiescat, vel supinus dormiat. Cibus liquidus damnatur, quiq; plurimus, ac difficilis concoctionis: laudatur stipiticus, aridiuscula substantia, non multi alimenti: & ad septimum vsque diem à vini porione abstineat. exactis septem diebus, stipiticum nigrum extincti saepius chalybis aqua dilutum, prodest: quo nec nimium à sui vendicari debet, ante septimum: ex eadem aqua, cum syr. rosato, aut rhodozaccharo vetere, vel cum syr. myrtino interdum bibat, & parcius; tum & vinum mali punici, saporis medij, modicè bibat. Aluus, iniecta glande oneranda est, aut clystere mollienda. Eo mem'o

vulnerato, sanguinis protinus missio necessaria est, aut
 ventris lenis delectio, ex aloë lota, ac rhabar. torrefacto,
 aut myrob. citrinis. Vomitus hic damnatur. aut si hu-
 more mordaciori contigerit malum, eundem matuti-
 nis potionibus preparabis, ac deinde cathartico per-
 purgabis: deinde iis quæ leuiter vulnera agglutinant,
 dabis: nec differendum est; mora enim difficiliora red-
 duntur vulnera. Profundiora stipticis sanantur, ba-
 laust., plantag. ros. & similibus. Agglutinantia stiptica
 sunt, terra Lemnia, bolus Armen., thus, mastix, tragac.,
 aut emplastica extrinsecus imposita. Sed quia hæc
 ad chirurgiam pertinent, ex iis petenda quæ & vulnera
 ventriculo extrinsecus inflata sanant.

OBSERVATIO XXVII.

*De Stomachi dolore, à parte dorsi posteriore
 ad anteriorem transiente.*

IVVENIS quidam Delphensis, Ioannes Van-
 deranus dictus, intensissimo dolore dorsi affi-
 ciebatur, è regione ipsius stomachi, tamquam
 pugione perforaretur, cum ingenti clamore. Do-
 lor autem à parte posteriori incipiens in dorso,
 ad partem anteriorem stomachi transibat, cum
 maxima difficultate anhelitus; ita ut ex punctione
 vehementiore tum dolore suffocari videretur. Ad
 hunc in nocte accitus sum: cum sine febre esset,
 cum pulsu æquali, licet parum veloci, & utcum-
 que magno, minimè tamen duro; & vrina tenuis,
 cruda, parumque subspicea spectaretur, nequa-
 quam tincta, decoct. flor. chamomill. ℥ iij. & syr.
 ex infus. ros. ℥ j. exhibuimus. & quia tempus
 valde

valde frigidum erat, inunximus tam partem posteriorem quàm anteriorem oleo anethino & chamæmelino. Manè cum redisset, licet melius dormierat, dolor tamen nondum erat sedatus. ideo hanc potionem sequentem propinaui: R. folior. senæ ʒ iij. seminis anisi ʒ ss. bulliant in ʒ v. decoct. pectoral. & fortiss. express. adde electuarij lenit. syt. ex infus. ros. ana ʒ ss. misce. qua ter quartè ventrem deiecit: ac post excrementa deiecta, & ructibus emissis, ilicò hic dolor sedatus est.

S C H O L I A.

DOLOR stomachi non semper in parte anteriori hæret, sed etiam è regione ventriculi dorsum fatigat; ut sæpe usu venit, cum dorso incumbat: quemadmodum etiam euenisse Mariæ Comitissæ illustri filie Domini Principis constat, cum de tali dolore & inappetentia apud me conquereretur. Vnde etiam quidam, si dolor sit in parte anteriore, dorsum quoque inungunt, vel cataplasmata applicant: quod & nos frequenter cum magna vtilitate fecimus. At alij cuidam, qui simili dolore afficiebatur, vomitorium medicamentum dedimus; & egregiè contulit. Refert Amatus Centuria I. curat. 73. de ingenti ventriculi dolore: Venerabilis Abbas, inquit, cum gravissimo ventriculi dolore infestaretur, ut alta voce exclamaret; post multa adhibita remedia, vomitorium ex hell-boro illi propinauimus: quo alba quædam ororum albo similia euomuit; & sanus ilicò factus est. veluti nobilis quidam Neapolitanus, qui cum simili dolore premeretur, post ebibatam integram libram aquæ florum Naraziorum tepidam, similia euomuit & sanus factus fuit.

OBSER-

OBSERVATIO XXVIII.

De ventriculi dolore ab assumpto veneno.

IN pago quodam nō procul à ciuitate Pithue-
 rienſi, in qua vrbe tunc praxim exercebam,
 iuuenis exiſtens, cūm ex Italia, ex Iacobi Sylurij
 medici regij cōmendatione anno 1545. Pithue-
 ros acceſſiſſem: eo tempore tres comederant ex
 vno paſtillo, & veneno infecti ſunt: atque om-
 nes dolore intenſiſſimo circa ſtomachum corri-
 piebantur. Vnus autem ex iis lotium ad me miſit:
 quod cūm ſpectaſſem, tenuis ſubſtantia erat &
 viridis coloris, ſuſpicionem veneni præbens.
 Nam vrina viridis, teſte Auicenna lib. 1. ſen. 1.
 ſumma 2. doct. 3. cap. De ſignificatione vrinae
 viridis, ſpaſmum in pueris ſignificat, aut vene-
 num in potu ſumptum: & ſi fuerit in ea hypoſta-
 ſis, ſpes erit vitæ; alioqui metum incutit. Cūm iſ-
 qui vrinam adferebat, rem geſtam narraret, ma-
 gis ſuſpicionem augebat. Præſcribo itaque vom-
 itorium medicamentum; & vt ſimul pingua de-
 uoraret: quibus, vt poſtea intelleximus, ſtatim ab
 omni dolore euasit, & curatus fuit. Alter verò,
 antequam conſilium peteret ſubitò interiit. Ter-
 tius autem cūm intellexerat priorem per me ſa-
 natum, tardiùs tamen & ille lotium ad me tranſ-
 miſit, in re tam ſeria ludens. Huic quoque vom-
 itorium præſcriptum eſt, ex decocto raphani &
 oxymelite, vel ſimili; & ſumpta theriaca & hic
 conualuit. Eſt enim theriaca commune reme-
 dium contra venenum ſumptum: proprium an-
 tidorum

tidotum praescribere non poteram, cum non sci-
rent cuius generis venenū esset. Quibus remediis
consopito stomachi dolore, uterque curatus est.

S C H O L I A.

VENIEBAT eo tempore mihi in mentem historia
illa quae anno 1538. mense Iulio Bononia con-
tingerat, de tribus fratribus nobilibus & valde diuitibus,
in vniis edibus cohabitantibus, & duobus uxorem &
liberos habentibus. quorum fratrum natu minimus,
nescio quo odio aut similitate, vel hereditatis desiderio
impulsus, duos fratres, tam uxores ac liberos veneno
perdere decreuit, & fere totam familiam perdidit, ar-
senico in vini cadum iniecto; ex quo bibebant ignari.
Postquam longo tempore ex eo vino bibissent, cape-
runt tandem veneni symptomata in ventriculo ac ven-
tre & venis persentiscere. Quando & amicorum qui-
dam ab iisdem conuiuiis excepti deprompto ex eodem
cado seu vase vinū liberalius bibissent, statim & illi ubi
domum redeunt, dolorem & puncturam in ventriculo
sentiebant: atque mordacitatem quandam, & corro-
sionem, & inextinguibilem sitim tandem senserunt:
nam hac plerumque sunt symptomata arsenici: est
enim calidum & siccum, ut refert Auienna cap. pro-
prio. Horum vnus suborta veneni suspitione, statim
epoto oleo euoruit, & liberatus est: adit tamen ad
propinquos, eos de veneficio insimulans. hi se excusant,
atque similiter iam dies aliquot se affligi queruntur.
Excussis exploratisq; omnibus, denique in cado vinario
arsenicum inueniunt, quod in fundo crustas effecerat.
Comperta re statim medici accersuntur. Cum iam ma-
lum in venas grassari cepisset, & putredinem vnā cum
febre

Historia mi-
rabilis de
veneno as-
sumpto,

febre creauisset, Dominus Matthaeus Curtius, medico-
 rum in Italia tunc facile primus, consuluit ad repri-
 mendam putredinem, intentionē exsiccandi habendam.
 Ergo bolum Armen. cum Saccharo rosato exhibuit.
 item syr. de corticibus citri, acetosum, limones, arantio-
 rum & granatorum succum, & id genus acidorum
 per se edere, tum cibus miscere iussit. Quod si inter ini-
 tia, dum adhuc in ventriculo venenum hareret, fuisse
 vocatus, humectantia & lubricantia conducere dice-
 bat, ad expellendum vel vomitu vel alui deiectione
 periēre ex isto veneno tres. Hispanus tamen medicus
 qui adhuc meo tempore vivebat, cum Bononia age-
 rem, quem & saepe in praxi comitabar, cum consilia
 haberentur, humectantia & infrigidantia intentione
 utendum esse suadebat, & iis dabat, quibus in hoc casu
 succurrebat, pharmacum ex agar. trochis. ℥j. β. habar-
 tantundem, diacastia ℥vj. elect. de succo ros. ℥iij.
 mucchari ℥j. Hac iuueni robusto viro exhibita ben-
 eduxerunt, & eundem à febre probè liberarunt. Aga-
 ricum tamen in aqua nenupharis infudit, & eam ex-
 pressam miscuit. Ad tormina quae in intestinis manser-
 rant, clysteribus lubricantibus est usus. De venen-
 pulcherrimus est locus apud Galen. de loc. affect. lib. 6.
 cap. 5. ubi inter reliqua, ita inquit de veneno per o-
 sumpto: Quum enim homo suapte natura probis hu-
 moribus abundans, ac sanorum more educatus, dere-
 pentè moritur (ut lethali assumpto veneno fieri solet
 deinde corpus aut liuens, aut nigricans, aut variun-
 esse, aut diffiliens conspicitur, aut pra. mareore scatur-
 Signum molestumq. reddit odorem, tunc venenum sumpsi-
 giunt. Memini ego puerum apud Delphenses, cum
 pulcem ex arsenico, quas glires interficiuntur, incaut-
 sumpsi

sumpsisset, solo vomitorio ex oleo & in sculo pulli venenum euomendo statim curatum fuisse. Solent in Italia in principio hausti veneni assidue lac bibere, cum oleo amygd. dul. Et hoc quidem iam saepe expertum est Auicenna. De cura icteritia in fine decerptum. Ego solo oleo amygd. dul. epato cum ceruisia butyracea in multis vsus sum, quos curavi, de quibus suo loco dicemus cum de venenis agemus. Narrat Amatus cent. 2. curat. 65. de puero, qui epoto arsenico post annum prius obierit. At ego noui qui multos annos superuixere, sed in magna miseria, cruribus resolutis, ut vix incedere possent; & mulierem post duos annos tandem vita orbatam. ita & religiosa quadam Delphis veneno infecta, longo tempore, sed miserè, superuixit.

OBSERVATIO XXIX.

De Ventriculi dolore ex obstructione hepatis,
& vteri inflatione.

ELISABETHA Guilielmi, 36. annos nata, vxor Ioannis Stopij, Alemariæ anno 1551. dolore intolerabili ventriculi afficiebatur, & circa hypochondrion dolebat, partim ab hepatis obstructione, partim ab vteri inflatione: qui dolor admodum vehemens ab imo ventre vsque ad stomachum ascendebat; quæ eiusmodi doloribus alias obnoxia ex ventositate; quibus valde angebatur. Ad illam ingressus, libenter enema iniecissem: sed cum nullo modo admitteret, decocto sequenti bis in die vtebatur, cum alius resisteret: R. scabiosa, sceniculi cum toto, viol., capill. Ven., melissa, florum chamomillæ, meliloti ana m. j. cassuthæ,

cassuthæ, agrimonix (ob hepatis oppilationem)
 ana m.ß. rad. glycyrr. ʒß. sem. anisi, carui, ameo
 ana ʒj. sem. fœniculi ʒß. flor. cord. p. j. follicul
 lenæ ʒj. epithymi ʒij. polypod. quer. ʒß. pruna
 damas. num. xv. vuar. ab arill. repurg. ʒj. horde
 mundati p. j. iuiubar. sebesten ana num. v. co
 quantur in sero lactis, pro lib. jß. zaccharo dulci
 coretur colatura: in qua pēdeat globulus sequens
 exprimendus dum porio sumeretur: ʔ. rhabar
 selecti ʒj. (erat enim ipsa magna ex parte biliosa
 quamuis nunc etiam pituita præcipuè erat collecta
 et) agarici trochis. ʒß. spicæ, schœnanthi ana
 gran. vj. fiat nodulus. alius vtcumque eo decoct
 soluebatur, dolor tamen non sedabatur. Locum
 igitur dolentem inunximus vnguento sequenti
 prius fomento infra scripto vtentes: ʔ. vnguent
 nostri pectoral., dialthæ, olei chamæmelini, an
 thini ana ʒß. misce. ʔ. rad. althææ ʒß. folior. mall
 uæ, flor. chamomillæ, meliloti ana m. jß. artemisi
 siæ, absinthij, cassuthæ ana m. j. sem. lini, fœnigr.
 malux, anisi ana ʒij. sem. fœniculi ʒj. coquantur
 in aqua pro lib. jß. pro fotu in fine decoct. ad
 dendo vini Rhenensis optimi parum, & aceti ʒ
 ß. quo & hypochondrium dextrum & ventricu
 lus, & imum ventris circa vterum fovebantur
 cum spongia calidè immersa & expressa. & ali
 quo modo dolor remissus est. Verùm cum rursus
 alium non deponeret, hoc modo illam purgavi
 mus: ʔ. diacatholici ʒß. diaphœnici ʒij. agaric
 trochis. ʒß. pul. zinzib. gra. ij. dissolue cum ʒiiij
 decoct. superscriptæ. in aurora cum sumpsisset
 egregiè alium deposuit, multa pituitosa deiecit
 & emisit

& emissis multis ventositatibus, dolor sedatus est. Die subsequente tamen rediit, & cum balano rursus aluum deposuisset, rursus sequenti fomento vti sumus: ꝛ. flor. meliloti, chamomill. ana m. ij. artemisiæ m. j. absinthij p. j. rad. althææ ℥ ij. sem. fœnug. ʒ j. β. sem. anisi, fœniculi, mal. ana ʒ j. aceti ℥ ij. coquantur in aqua communi, pro fortu: etiam hoc deinde emplastro infra vmbilicum imposito versus dextram partem, vbi tunc dolor erat: ꝛ. flor. meliloti, chamomill. summitatum anethi cum flor. ana m. j. β. sem. maluæ ʒ ij. sem. fœniculi ʒ j. β. rad. althææ ℥ iij. coctis in aqua ad mollitudinem & contusis adde farinæ sem. lini, fœnugræci ana ℥ β. olei lilior., amygd. dul. ana ℥ j. β. olei anethini, chamomill., scorpionis ana ℥ β. misce. Ventriculus tunc minùs dolebat: sed magis dolor erat circa imum ventrem, versus dextram partem; sed inferiùs, vt locum hepatis non attingeret. Interim pro corroboratione stomachi, cum oleo absinthij ventriculi regionem inunximus. Vrina huic minimè inflammata erat: ideò obstructio illa quæ in hepate erat, potiùs erat ex humoribus frigidis quàm calidis: & quia dolor ad vteres tenderet, versus inguina, etiam ad regionem renum, ideò commodè aliquid olei scorpionis adieciimus; & egregiè profuit, & liberata ab illa obstructione, quæ locos dictos affligebat, plurimum lotij profundebat: & tandem cataplasmate seu emplastro appposito, dolor iterum cessauit. Interea his tabulis utebatur: ꝛ. specier. diacimini, trionsant. (vt hepar minùs calfieret) ana ʒ ij. diambæ (ob vterum) specier. arom. ros. K (ob sto-

(ob stomachum) ana ꝑ.β. dissolutis in aqua arteri-
misia & absinthij, adiect. zacch. albiss. q. s. fiat
confectio in rotulis, ponderantibus ꝑ. iij. sumebatur
ante pastum per ij. horas: dolore non amplius
redeunte. Eodem ferè tempore alia mulier, illius
quoque vicina, iisdem malis cum affligeretur
iisdem ferè præsiidiis, vel parùm immutatis, &
hæc similiter conualuit.

S C H O L I A.

DOLOR ventriculi si ex vitio aliorum membro-
rum fiat, siue ex vtero, iecore, liene, patet ex iam
dictis, quòd illis membris prospicere oporteat: & in qua
minera mali seu materia lateat, & ad ventriculum
transferatur, primò tollenda est: & quia hîc erat ma-
teria frigida atque flatuosa, & eductu difficilior
cum dolor quidem remitteretur, sed postea rursus
rediret, repetenda erat purgatio. Interea & ventri-
culi quoque ratio habenda erat, eundem roborando oleo
absinthij exterius inuncto, ne vapores flatuosos recipe-
ret. idèd & diaciminum & arom. ros. conueniebat.
Quare cum talis morbus aliquando per intervalla huius
mulieri reuerteretur, de præseruatione consului, vt
optimam victus rationem institueret, vt minus pituita
gigneretur, neque ventositas accederet, ex iis que fo-
mitem præbeant: quare imperaui vt omnia frigida &
crassa vitaret, olera, carnes vetulas, duras, & molle-
nimium, fructusq; frigidos, legumina, & vt somno
longiores fugeret & vigilias superfluas, quæq; viscera
grauant; vt & extrema membra ac ventrem potiùs
calida conseruaret quàm frigida, præcipuè pedes; & in-
viceretur, quæ flatus discuterent, & pituitam attenua-
ren.

rent modicè, non tamen valdè calfacientibus, ob hepatis caliditatem. Et ita nunc ferè omnes dolores stomachi absolvimus: quibus distinctis remedia sunt petenda ab effectibus suprà enumeratis. Quòd si dolor fiat à nimio sensu, vt qui facilè in animi defectionem incidunt, non erit præter rationem, imperare vsum iheriacæ recentis, factis quibusdam prius euacuationibus per clysteres & pilulas conuenientes. Caterùm si dolor fiat ab inflammatione, apostemate, abscessu, vel vomica, aut ab vlcere stomachi, de iis nunc per ordinem dicemus; cùm seorsum de iisdem tractandum sit.

Dolor à nimio sensu quomodo curetur.

OBSERVATIO XXV.

De ventriculi phlegmone seu inflammatione.

CUM stomachus, veluti ceteræ corporis partes, inflammatione tentari possit, modò in ore ventriculi, vt i. obser. huius libri diximus, modò in alia quavis ventriculi parte; id ex dolore simul cum positu dignosci potest, quæ pars affecta sit, similiter & ex proprii eiusdem partis muneris oblatione; appetentiæ, si quidem in ore ventriculi; concoctionis autem, si in eius cavitatè excitetur. Sic iuuenis occurrit qui nobis proponebatur curandus: qui cùm continuò febricitaret, ac lotium valdè rubrum haberet, dolorque immensus ac assiduus in ventriculo adesset, qui nullis medicamentis admotis mitigari poterat, tumorem manifestè conspiciens, & æstum tactu percipiens, cùm & manifesta grauitas ei aderat, simul & febris continua, vt diximus (quæ omnia inflammationis ventriculi signa sunt) in-

flammationem adesse percepi. Quare tenui & exquisito victu præscripto, vt Galen. monet lib. 13. method., præsana cremore contenti, à carnibus, vino & aliis cibis calidis abstinuimus, potuque aquæ hordei mundati & glycyrr. vrentes, malis que acidis, aëremque temperatum seu parum ad frigidum vergentem, elegimus, & somnum moderatum aut paulo breuiorem admisimus: nam si longior fiat, quàm oportet, potius inflammatio augeretur, detento insimul in tali somno intus non solum præter naturam calido innato, sed & alieno, & eo qui præter naturam est: ad quorum detentionem non immeritò inflammatio ipsa (vt diximus) augeretur. similiter quietem iniunximus; & vt motum omnem vitaret præcepimus. Nam prima sunt in curatione ipsa (teste Celso cap. 5. lib. 4.) quies & abstinencia: ideò & immodici animi affectus non parum nocent, & propterea vitandi sunt. & hac quoque de causa mandauimus vt parum loqueretur. Quod ad medicamenta attinet, confestim, cum nihil prohiberet, ex vena interna cubiti dextri sanguinem vt cumque detrahère iussimus. deinde oleo rosaceo cotoneorum, puluere ros. siccarum adiecto, venter huius æmulo, cum pauca cera, ventriculum iniunximus. Purgationem eo tempore non dedimus, cum in principio essemus: sed frictionibus & ligaturis ad diuersionem commodè utebantur: & si aluum non redderet, vt lenibus clysteribus ea tantum leniretur consulimus: mox & fotu ex floribus ros. rubear. absinthij Romani & portulacæ decocto parato vt vteretur præcepi: & vt

per os

per os exhiberetur id quod sequitur: R. syr. de end. ex succo acetosæ, syr. de ribes ana \bar{z} j. aquæ plantag., ros. acetosæ ana \bar{z} iij. vini granat. acetosorum \bar{z} j. misce pro iuleb. tam ob sitim quàm febrem. Postea, cùm materia magis fluxa esset, ne aliqua sumeret quæ intus materiam costringere possent. Quare & hunc syr. vel similem cepit: R. syr. viol. ex infus. rub. syr. de acetos. citri ana \bar{z} j. aquæ end., cichor., borag. ana \bar{z} j β . aquæ absinthij, fœniculi ana \bar{z} β . misce pro ij. dosibus. & tunc prius pro leui purgatione cassia accepta, quam antea dare tutum non erat. Oleis suprascriptis, olei chamomill. & absinthij parum addidimus. fotum quoq. adhibuimus, ex floribus chamomillæ, meliloti, ros. absinthij, viol., maluæ, rad. althææ, & sem. sumach., decoctis in aqua ros. & chamomillæ, addito in fine pauco aceto. & dolore sedato, inflammatio cessavit, tum febris ipsa, apostematis resolutione facta. Tunc quoque præscriptum, ad ventriculi roborationem, diarod. abb. in tabulis. & perfectè conualuit. Venit tunc mihi in mentem historia illa Amati de mercatore, quem Ancone curavit, qui in ore ventriculi inflammationem patiebatur, qui sævissimus aliqui morbus sæpe est; à quo qui evadunt Iouis filij, & albæ cornices dicendi sunt. Leni itaque clysteri fecibus eductis internam venam dextri brachij pertundere iussit, sanguine ad uncias decem extracto; & loco dolenti sequentia apposuit: R. olei cydon., myrtill. ana \bar{z} β . pul. myrob. citrin. \bar{z} j. boli Armen. \bar{z} β . eoq. tepidè locus affectus inungebatur. At cùm his parùm proficeret, &

dolor ingens, cum anxietatibus & nausea perseveraret, ex eodem vulnere brachij iterum sanguinis missio ad uncias octo repetita fuit: & emplastrum hoc admotum: ℞. farinæ hordei ℥ j. ros. rub. ficcar., santal. rub. ana ℥ β. pul. sumachiorum, hypocystid. ana ℥ ij. olei ros. omphacini, succi omphacij, id est, agrestæ ℥ β. cum succo end. & ros. q. s. fiat emplastrum: quod sic frigidum, ob intensam caliditatem, dolenti loco admovebat, & sæpe innovabat: quo vir ille melius habere cœpit; neque dolor ita intensè eundem vexabat. Porro ut alius singulis diebus responderet, admodum sollicitus erat, præcipuè lenibus clysteribus, ut hoc sequenti: ℞. iuris pulli, vel decocti maluar. ℥ xv. olei ros., viol. ana ℥ ij. vitelli oui num. ij. zacch. ℥ j. β. cass. extractæ ℥ j. talis communis ℥ j. misce; fiat clyster. Elapsis verò quinque diebus, locus, ut antea, malè affectus, fomento ex ros. & chamomilla parato fovebatur; ac postea hoc aliud emplastrum apponebatur: ℞. acanthi, id est, branchæ ursinæ, ros. rub., rad. malvauiſci ana p. j. in aqua fiat decoctio; & abiecta aqua in mortario marmoreo, omnia optimè pistentur: quibus adde farinæ hordei, chamomillæ, seminis lini, fœnug. ana ℥ β. santal. rub. alb. ana ℥ ij. cum oleo ros. & chamæmelino & pauca capi pinguedine fiat emplastrum: & loco dolenti tepidum admotum fuit. Tertio die, post admotionē emplastri, ruptus est phlegmon: & æger per vomitum saniei parum reiecit, veluti per egestionem: se tunc sic multo melius habere sensit. Sequentibus diebus aquam mellis ad vlcus lauandum bibebat, cui quandoque thuris

mannam,

mannam, Galeni consilio miscebat: quibus intra 20. dies sanitatem obtinuit. Cibus huic præsana erat, ad octo præcipuè priores dies; cuius vice ad amygdalatū, multa destillatitia rosacea paratum, quandoque veniebat: postea verò ius pulli gallinacei illi elargiebatur, aut ex eo paratam panatellam, vel eius carnibus concinnatum contusum. Potus verò aqua hordei per se, aut mixtum illi granatorum vinum, erat. Sed & aër circumdans, frigidus quoque erat. Hæc Amatus centur. 3. curat. 93. At iuuenis, de quo prius dictum, per modum resolutionis curatus, ruptionem non fuit expertus.

S C H O L I A.

VENTRICULVS secundum suas tunicas, siue internam siue externam, potest pati tumores præter naturam, & præcipuè phlegmonem: quam quidam volunt fieri ex calidis succis, vel ex sanguine, vel ex bile, vel ex utroque humore permixto; idq; in ore ventriculi vel in alia quavis eius parte: quam ex dolore simul cum positu dignosci volunt (vt paulo antè diximus) & ex propriis eiusdem partis muneris oblesione; appetentiæ si quidem in ore ventriculi; concoctionis in eius cavitate. At quòd ipsa morbus compositus sit in magnitudine primò, & secundò in intemperie, & tertio in soluta continuitate, patet apud Galen. lib. De diff. morb. tum 3. De temp. lib. De inæquali intemperie, ac reliquis plerisque locis. Quapropter non ab re eam insequuntur, tumor præter naturam, grauitatis, ac multi caloris sensus, & dolor circa partem affectam. accedunt adhæc sitis valida, & febris ardens. Tumor

Partes affectæ dignotio

Quis affectus præter naturam sit inflammatio. Eiusdem inflammationis signa.

Causæ.

Vnde tu-
mor, tensio
& dolor ac
calor.

Vnde febris

autem & calor etiam tactu à medico iudicari queunt. Nausea quoque consequetur, propterea quòd inflammationis causa in ventriculi tunicis contineatur. Verùm ubi biliosus magis redundet succus, ita ut inflammatio erysipelatis naturam referat, vehemens erit ardor, sitis immoderatio, ac ardentissima febris, sed minor tumor ac grauitas. Ex quibus etiam signis interstingui poterit diuersa causa eiusdem inflammationis; præcedente victu ratione, ætate, temperamento, annis tempore ac reliquis non prætermisissis. Est omnium horum tumorum eadem generatio, scilicet ex supernacuata materia affluxu, siue ab initio inutilis sit, siue utilis suæ naturæ, sed parti molesta. influit autem generatim per venas, per quas nutritur. Quòd si sanguis sit, primum maiores tenduntur, mox minores, donec resudat in ipsam carnem humor, eamq; spongia ritu madidam reddit, ac spacia, quæ fibras interiarent, & in quibus arteriæ non mouentur, replent: vnde durus repletionis tumor fit, & tensio; & reinitur comprimentis; & dolor adest. Calor verò tum ex natura humoris gignitur; tum quia collectum in arcto loco & impactum, non transpirat; vnde necessariò putrescit. putredo verò calorem gignit: qui si in ea parte sit, quæ vel ob vicinitatem, vel ob præstantiam cordi calorem communicare potest, febrem facit, aut ephemeram aut putridam, prout maior vel minor est communicantia. Vnde 10. Method. 6. febres ex phlegmone aliquo modo dici possunt putridæ, si causam respicias, licet reuera sint ephemeræ naturæ: quando solus calor communicatur cordi, non autem putridus vapor, vide 1. De feb. diff. 5. & De venæ sectione ad inirium. Sed nunc sicut ex sanguine plus iusto influente, phlegmone in eo gignitur; ita & ex aliis

ex aliis humoribus tumores alij fieri possint. videtur enim quod simili ratione fiat generatio, iuxta Iacchini-
num doctissimum, eorum scilicet influxu, ex 13. meth.

1. & De venæ sectione. Quod si res ita habet, cur ergo auctores phlegmones solius meminere? respondet Iacchinus: Atqui erysipelatis stomachi alibi fecerunt mentionē, vt 10. Method. & 4. De vict. 2. Quod verò scir-

rhosi tumores fiant, nos, inquit Iacchinus, vidimus in dissectionis: vt Florentiæ in muliere è domo Puccina. Respondetur primò, sub phlegmones voce comprehendere etiam erysipelata, vbi non est exactè loquendum. Alij verò tumores rarè accidunt, quoniam in membranas duras non facile confluere potest crassus & viscidus humor; præsertim in internam. Aliquando in externa consistere: & memini (inquit idem Iacchinus) me ad

tactum scirrhusos tumores sensisse; duos inquam, sine dolore. Hi ergo si accidunt, ex communi ratione curandi scirrhus, curantur; addita solum curatione à parte:

quam in vno exemplo phlegmones monstrare sat erit: & iure; quoniam maximè periculosa est, & curatio multum artificij exigit. Sed hic videndum, etiam ventriculum posse in tumorem eleuari ex solo vento: cuius, habemus exemplum apud Beniuenium De abditis causis cap. 40. Annus 16. agentis Petri Guicciardini filio

ita ceruix ventriculi sine vlllo doloris sensu eleuabatur, vt magnitudinem cydonij pomi æquaret: nec manifesta causa ostendebatur, cum omni nocumento careret. Quare rem admodum diligenter vestigare coepi; admiratus quænam abditæ huius mali causa esse possent. Sed quum nullum prorsus præter ventum inuenirem, à quo, ventriculi capite paulatim eleuato, ita eiusmodi fieret tumor, vt & ossa talem situm adepta, nec vltra

K 5 ad pri-

Quomodo tumores in stomacho etiam ex alijs humoribus. vti ex sanguine, fieri possint.

Scirrhusi tumores post dissectionem in stomacho inuenti.

Duri tumores in parte externa aliquando confiteri.

Elevatio stomachi.

ad pristinum statum reuersa, figuram illam illis impressam tanquam naturalem custodirent: ferrea demum lamina, quæ ex cingulo quoque surgebat ferreo, stomachum comprimi iubeo; quo paulatim ad sedem suam retrocedere cogeretur: quod factum est. Nam haud multo post hoc vno tantum presidio ita repressus est tumor ille, vt ad pristinam ac naturalem formam ipsius ventriculi ceruix penitus reuersa sit. Hæc Beniuenius. In iliaco dolore, cum excrementa per os redduntur, ventriculus quoque in tumorem quandoque attollitur (vt nos vidimus) partim quidem ex flatibus, sed magna ex parte ab excrementis eò perlatis. Quandocumque autem tale aliquid contingit, non modo spes vita superest; sed mors serè imminet. At stomachum indurere diximus paulo antea, scholio obs. 25. huius libri, eiusq; curationem, sed breuem, adieciimus: sed durities illa non est omnino sine dolore. At erysipelas licet æquè aut magis periculosum quàm scirrhus tumor ventriculi, præcepta tamen curatiua habet simplicissima; scilicet solis frigidis intus, & extra admotis. sed nos de phlegmone prius agamus, id est tumore facto à mediocri sanguine & vtili. Hic ergo in partem influit ex maioribus venis, quæ eò confluunt: confluxus verò causa est, vel ex ipsa parte attrahente, vel ex quapiam alia transmittente (iuuat enim modò subtilissimas Galeni demonstrationes 13. Method. in Epitomen cogere) quæ transmittunt, robustiores necessario sunt, vel natura, vel ex accidente aliquo suscipientibus comparata. Transmittunt autem, quia ipsa se grauari sentiunt, vnde vi vtuntur noxiorum, seu onerosorum expultrice. Quæ verò grauant, aut quantitate molesta sunt, aut qualitate vitiosa & noxia: vt calida, frigida, acrida. Ex altera parte,

Erysipelas
stomachi.

Phlegmone
ventriculi
ex sanguine
mediocri &
vtili conflu-
ente.

parte, quæ attrahunt, confluxum causant: attrahunt
verò calore partis, aut dolore. Opus verò caloris Ascle-
piades nolebat attractionem dicere, vt Galen. scribit:
ipse verò vult attractionem dici; cùm ille confluere
humores, non autem attrahi in partem calfactam di-
ceret. Et quidem non facile decernitur (dicente Iac-
chino) quis horum rectius sentiat. Asclepiades calore,
vt puto, consideraui fundi & liquari circumstan-
tium partium succos: aperiri partis meatus ac laxari.
Huius facilis sit confluxus: vt contrà frigidis arcetur. Nec
Galenus aut ratione, aut experimento monstrabit,
quòd calore attractio fiat. Nam quòd in magno mun-
do à sole sursum feratur vapor, attractio non est: si
quidem per se mouetur sursum, ex forma quam à ge-
neratione acquisiuit. Ratio verò, solùm rarefactionem
& heterogeneorum solutionem à calore fieri inuenit.
Secundo De diff. feb. 11. loquitur disiunctiue, quòd
calor vel attrahit vel recipi facit. Adde, pro Asclepia-
de, quòd calor, cùm intemperiem efficit, dolorē efficit.
Ad dolorem non propriam attractionē reducit Galenus,
sed ad transmissionem, vt statim dicemus: Dolor enim,
inquit, confluxum excitat: quoniā natura dum causam
cōtristantem expellere tentat, si quidem primo impetu
non prosperè succedat; maiore impetu nixa, sanguinis
aliquid, & spiritus eò trudit. sic ad dolores plagarum,
tumorem insequi cernimus. Hoc ergo non est dolorem
attrahere, sed doloris occasionem esse, vt humores in
partes transmittantur. Quòd si 2. De diff. feb. & alibi
centies attrahere dolorem inquit, non propriè de at-
tractione loquitur, sed cum ea similitudinem habet,
quatenus pars dolens ipsa à dolore repletur. Idèò re-
ctius loquitur 3. Meth. cùm inquit: Dolor est fluxionis
causa:

AS

g. communis

causa: non dicit, fluxionem trahit. & rursus 6. De usu partium, attractionem triplicem ponit; vacuo, calore, familiari qualitate: doloris verò non meminit: sed hoc, quia non erat ad propositum, cum de attractione cordis ex arteriis loqueretur. Considera ex eo loco expertum attractionis caloris: ut flamma ex ellychnio oleum attrahit, & hoc caloris vi ex lucerna: unde eam exhauriri videmus. An non videas magis num siccitate attrahat, an calidi? sicca enim humidum attrahere vehementer videmus; ut spongiam, lixum: hinc ergo ellychnium. Sed tunc aliam causam attractionis dare oportebit: nempe quæ à siccitate fit. Præterea si hæc esset attractio, tunc siccum, id est, igneum, humidum sibi contrarium attraheret: contraria verò se refugiunt. sed hæc aliàs. Signa phlegmones ventriculi, si ex ipsa natura haberi debent, partim affectus naturam sapient, partim affecta partis. Atqui affectus signa hæc sunt: dolor primum, qui ex solutione continui fit, facta ex materia replente, & tendente sensitiuas partes: mox tensio, seu renixus partis, quæ repletionem accidit. Cum enim durum vniuersim fit, quod tactui non cedit, s. De simpl., alia dura erunt concretionem, alia repletionem; cuiusmodi est phlegmone. Quod verò materia à qua fit, sit sanguis, necessario calor aderit parti; & non solum ex natura materiae, sed etiam ob putredinem, quæ ex necessitate sequitur. semper enim humida & calida corpora cum in calido loco manent, non persflata citissime putrescunt. At non persflantur, quod omnes meatus, per quos transpiratio fit, sunt adstricti, vel obstructi. unde & probè Thessalici phlegmonem adstrictam passionem dicebant. Rubor verò ex natura humoris accidit. Hæc indicant omnem phlegmonem,

Hæc doctrina multis partibus erit communis.

monem, quæ sub sensum venit: sed si interna sit, non omnia hæc sentiuntur; quedam tamen. Primum ergo dolor sedem affectam demonstrat, si præsertim non extimas partes attingat, quod tactu distinguitur. Vnde internas partes afficere monstratur: quæ & ex vehementia eius coniectura fit. Mox sensus tactus aut visus tumoris circumscriptionem sentit: sed hoc non semper euenit, ut cum remotas partes obsederit. Ideo, quod dicit & apostema manifestum fuerit, id est, tumor apertus; efficax quidem nota est, sed quæ non semper sentiatur. Fit tertio coniectura ex febre, quæ necessario adiungitur. Est autem necessitas generationis ex putredine, ut in lib. De vena sect. habetur, & I. De diff. feb. 5. quæ cum necessario putridum calorem excitet in parte; si quidem pars illa, vel quia vicina est, vel quia nobilis, multis vasis abundans; vel ob multitudinem materie collecta calida; communicabit cordi calorem suum igneum: vnde vniuersum corpus incallescet præter naturam; & ita fiet morbus febrilis. Quod si non modo calorem, sed & putridum vaporem insuper impertiri possit, iam non febris modo, sed putrida fiet. Cum igitur venter vicinum positum habeat arteria, & iocinori, facile febrem faciet, & eam putridam, & continuam: cuiusmodi sunt omnes febres, (ut ostendimus in libris nostris De febribus) quæ ex viscerum tumoribus & inflammationibus fiunt. Hæc Rhases. Sed super eundem scribens Iacchinus (cuius verbis hætenus vsi sumus) coniecturam, inquit, solum affectus facies, nisi & alterum addatur: calor loci perceptus, & ab agro & astantibus, cum palma ventrem attingunt. Adde & sitim, quæ necessario euenit: nam cætera symptomata, quæ Galen. numerat, insequuntur, præcipue

Phlegmo-
nes interna
signa.

præcipue os ventris afflictum: idè adaugent coniecturam affecti loci, sed non affectus. siue enim conuulsio seu delirium sequatur, siue cibi horror; omnia inquam ad ventris morsus sequi dicuntur; sicuti & animi deliquia. Op has causas Auicenna vaza quadam signa addit, vt certificet coniecturam: Si inquit dolor remedijs non soluitur, & durat, significat apostema. Sed signum est inefficax, nisi intelligatur cōinuitas caloris: hoc enim aliquid facit ad agnitionem cum reliquis. Similiter & vitia pulsus & anhelitus, communia alijs causis esse videntur, non propria phlegmones. Hæc de signis phlegmonem indicantibus. de prognosticis postea.

OBSERVATIO XXXI.

DE ventriculi phlegmone seu inflammatione lethali.

GRAVITER & continuo febricitabat Harcko quidam Alcmarianus, admodum senex, qui iuxta Sacellum Sancti Spiritus, ex phlegmone ventriculi decumbebat, & ex cōtinuo singultu, qui procul dubiò etiam ex inflammatione ortum habebat. Ad hunc cùm circa quartū diem prius accitus essem, vix remedijs adhibitis, facto etiam prognostico, eodem die obiit. Neque admiratu dignū, cùm morbus hic semper periculosus sit: nam & de morbi magnitudine quid attinet dicere, cùm & per se lædat plurimas & necessarias actiones, vt nutritionem; & dolorem prosterntem vires inferat: habetq. id præcipuum, vt principes partes in consensum maxime trahat. Sed de his latiùs in scholio.

SCHOLIO.

SCHOLIA.

VBI stomachus inflammationem sustinuerit, magna opus est diligentia, teste Alexandro Tralliano lib. 7. cap. 14. quoniam maximum morbum & necessitatem corpori affert. Quod si imbecilles fuerint vires, ijs qui ea laborant (vti huic seni erant) mortifera vt plurimum esse solet. quamuis non solam ij, sed etiam qui valentiores ipsis sunt, ab ea interim consueuerunt. Nam quibus vel iecur, vel ventriculum phlegmone obsidet, veluti pleuriticis, peripneumonicis ac synanchicis, vna salus est, videlicet ipsum viriū robur, ex Gal. decreto 10. meth. med. Curatio quamquam ex communi phlegmones curatione pendeat, vt augmentum inhibeamus, & factam phlegmonē curemus; ea tamen oportet ad ventriculi phlegmonem accommodare. Prescribemus itaque victum refrigerantem (vt iam diximus) & tenuissimum: & si naturam erysipclatis magis referat, magis refrigerantibus vtendū, vt lactuca, cichorea, vel endiuia, vulgō scariola dicta, in aqua hordei decoctis; & ptisana, postea in iure pullorum galinaceorum decoctis; abstinentes à vino & carnibus, vt dictum est. Venam quoq. statim secabimus, precedente clystere emolliente, si alius strictior: pariterque ad diuersionem frictionibus, ligaturis, cucurbitulisque ac reliquis diuersionibus vtemur circa initia; abstinentes à medicamento purgante, ne materiā ad locum affectum & inflammationem trahamus; ex Gal. decreto. Huius habemus historiam apud Grad. supra 9. Almanforis, cap. proprio, de puella iuvene robusta, quæ cum die 3 ab initio apostematis medicamentū solutiuum, contra opinionem alterius medici, cepisset, 5. die obiit, vomiti-

Signa prognostica.

Curatio

Venæ sectio
& diuersio

A purgatione in principio abstinendum.
Error cuiusdam medici notatur.

Vomitus
non conue-
nit.

Topica.

vomitum hic perpetuò etiam euitandum volunt, cum ventriculum dilaceret: alij tamen tempore maturationis conuenire existimant, vt rumpatur: præstat tamen ab omni vomitu abstinere. Quòd purgatio non conueniat in principio, constat ex Gal. 13. methodi medendi. Post hac ad ea quæ extrinsecus applicantur confugiendum, & mixa curatio debet esse: ex astringentibus & laxantibus: quamuis circa initium semper astringentia intendi debeant, iuxta eundem Alexandrum: & si eis duntaxat vtaris eo tempore, non peccabis, ex Gal. auctoritate 13. meth. medendi. Valet itaq. oleum omphacinum, rosaceû, cydoniorum vel de absinthio, si valida non fuerit inflammatio, aut feruor; vel ex ros. & absinth. p. j. flor. chamomil. rad. ac folijs althææ p. media in aqua pluuiali decoctum facit, & pauco aceto aut vino albo fiant epithemata vng. vt iam ostendimus exemplo paulo superius dicto. Et vbi iam laxantibus magis indigeas, vt pote in incremento aut vigore, adde prædictis laxantia, & augeas vt chamamelum, althæam, semen lini, melilori & fenugraci & adipem anserinum, oleû chamamel. anethinû, liliaceum, & mastichinum, ac vtriusq. amygd. ijs omnibus aut quibusdam simul permixtis, varia medicamenta compones, vt usus postulat, & epithemata, cataplasmata, & vnguenta. de quibus vide Aëtium & alios auctores. Vbi ~~moderata~~ fuerit inflammatio, etiam ceratum Gal. 4. meth. sufficiet: & vbi stomachus magis corroborari postulet, aloën augere conuenit, admisceréque cum eo succum absinthij, aut oenanthem, aut succum capreolorum vitis. Ceterum vbi phlegmone prorsus inclinauerit, & alius non deijciatur; tunc poteris exhibere mannam, thamarin-

dos;

dos, syr. ex infus. ros. viol., vbi vehemens sentiatur ardor, vel cassiam, cum cichori aut hordei decocto. & quamvis Gal. 13. meth. & filiculam & corticem nigri veratri approbat; iis hoc tempore præstat abstinere. Si quid verò scirrhosum relictum est, vti phlegmone est, ita vt emollientia requirat, etiam corroborantia ac astringentia cum eis permisceri debent, ex Tralliani decreto: quorum medicamentorum magnam copiam reperies apud eundem, & Aetium & Paulum. Si itaque durus tumor appareat; siue quia ab initio vera phlegmone non erat; vel erratum est in remediis, resoluendo fortius quàm expediat; tunc malagmatis est vtendum: quale ex meliloto fit. cuius generis est & illud à Rhase ultimo loco descriptum. egregiè valent, cum & vini adstringentem adiunctam habeant. Oportet vt illa medicamenta quæ ventriculo vel iecori apponuntur, habeant aliquid adstrictionis, vt Galenus monet in historia ex Theagenē philosophi cynici. est namque ventriculi (vt paulo ante diximus) sicuti iecinoris, maximus, & toti animali communis vsus. Stomachum enim providentissimus artifex Deus in medio totius corporis posuit, tanquam ciborum receptaculum, aut promptuarium quoddam, vt ab eo cetera membra nutrimentum sibi ipsis exposcerēt captarētve. Idco semper roborandum est. At erysipelatis intentio magis est refrigerandi, vt phlegmōnes vacuandi, 13. meth. & 14. hinc fit, vt eius curatio sit refrigeratio; quali vititur 10. methodi 5. & 9. meth. 5. Modicè tamen fiat, id est, quantum exposcit affectus, ne forte in affectum frigidum transmigret: sic enim scirrhi gignuntur.

Quo tempore purgatio præberi possit.

OBSERVATIO XXXII.

*De apostemate frigido ventriculi ac diuturno
in abscessum & pus transmutato.*

PUELLA paupercula, octodecim annos nata
in platea Diui Petri dicta, Alcmariæ, habi-
tans, per integrum annum circa stomachum in-
tolerabili dolore cruciabatur : quæ cum medicis
non vteretur ob paupertatem, fortè fortuna mea
transcuntem vicini ad puellam introduxerunt.
Magnum tunc tumorem circa mucronaram car-
tilaginem conspeximus, valdè eleuatum & du-
riorem, tactui resistentem. quem locum cum le-
niter attingerem, ferre nō poterat. Crura autem
et reliqua membra, stomacho nō concoquen-
te, macie consumpta videbantur, nutritione mi-
nus accedente. Præ nimio dolore misera exclamabat,
se apostema ac abscessum in stomacho
habere : quod & signa præsentia indicabant.
Astantes mulierculæ nescio quæ non adhibue-
rant ad dolorem tollendum ; priùs existimantes
hunc dolorem tamquam ventosum se posse au-
ferre regula calefacta apposita ; modò etiam ta-
bula lignea, vt vulgares facere solent : eaq. externa
causa vel simili, sua caliditate materiam ad sto-
machum conuertunt ; eaque attracta, cum non
possit debitè à natura regulari, porositates con-
cavitatesque medias stomachi subintrat, ac vni-
tatem soluit, ac apostema per se aliquando indu-
cit ; talis error plerumque ab astantibus imperitiis
inducitur : etiam subinde à medicis indoctis, dum

vento-

ventosam magnam ventriculo, corpore impuro
 existente, apponunt; vel pannos calidos, aut fri-
 ctiones fortes ventriculo adhibent; idq. in prin-
 cipio, existimantes omnem dolorem ex ventosi-
 tate oriri. Cùm hæc itaque integro anno dolore
 confecta ad extremam maciem deuenisset, facile
 ex signis præsentibus intelleximus ibi abscessum
 diuturnum frigidumque adesse, cùm nulla siti
 premeretur, quamquam subinde leniter febrici-
 tare videbatur. Et quū iam longo tēpore aluum
 non deposuisset, & libenter clysterem emollien-
 tem prius iniecissem, quem nullo modo admit-
 tere volebat, mandavi ob dolorem, vt talis focus
 fieret, prius epoto decocto sequenti, parato ex fo-
 liis senæ, foliis caulium rubrorum, scabiosæ (quæ
 omnia apostemata interiora resoluit vel maturat,
 vel rumpit; quod non solum in hac puella, sed
 etiam in alio abscessu interno siue pectoris seu
 alterius cuiuscunque expertus sum,) ficibus ad-
 iectis & vuis passis absque arillis, dentis leonis
 (ob febriculam) foliis maluæ, & rad. althææ, de-
 coctis in fero lactis: qua bis in die, cùm pauper-
 cula esset, utebatur ad aluum emolliendam. quæ
 licet in principio minùs conuenissent, vt scholio
 præcedente dictum est: tamen hîc, cùm in decli-
 natione diu malū extitisset, & maturatione opus
 esset, commodè hoc decocto vti sumus: tum foru
 ex decoct. folior. maluæ, rad. althææ, flor. camo-
 mill., menthæ, & absinthij vtriusque, tam ad do-
 lorem sedandum, quàm ad maturationem; reli-
 quiis contusis, & butyro recenti mixtis, cataplas-
 matis modo stomacho appositis. & præter spem
 L 2 intus

intus ruptum est apostema; & abscessus ille annuus, vomica instar: & euomit sanie sanguinolentam: & per inferiora satis copiose sanie excreuit, tumore detumescente, & dolore omnino consopito. Quare statim ad deterfionem puris, vti sumus decoctione hordei non excorticatori, pauco melle rosato adiecto, ad detergendum vlcus: & egregie hæc ipsa conualuit, cum admiratione multorum. Quidam vulgares eo tempore, qui tunc aderant, huic puellæ dedissent oleū oliuarū pro vomitorio, etiā post abscessum disruptum, ad leniendū vlcus, vt illi adserebant quibus restiti, neq. admittebā; auctoritate Galeni edoctus; qui nos lib. 5. meth. med. ita admonuit. Caterū (inquit) qui è ventriculo eluere puri volunt, non sine periculo vomitum prouocant, sicuti si aliter infixam illi pituitam per oxymel & radiculam detergerent. Tutius itaque est decoctione vti, quum vomenti periculum sit, ne & quod ulceratum sit, dilaceret, & succum quempiam inutilem ex vicinis attrahat. Absque morbo itaq. continuò decies in hora capiebat cochlear vnum atque alterum, vel paulo plura ex decoctione hordei, cum pauco melle ros., cum subitaneis eiusmodi vlcera indigeant mundificatione, ne profundantur, aut tunicas stomachi penetrent. Hoc enim modo hanc miseram paupereulam puellam, vlcere absterfo, sanitati pristinae restitimus, diuina gratia nobis assistente.

SCHOLIA.

APOSTEMATATA & abscessus, iuxta iuniores, qui Aucennam sequuntur, & supra Rhasem scripsere, fiunt, vel per modum congestionis paulatim; vel per viam defluxus, ab omnibus humoribus; vel ex vno, vel duobus simul mixtis. & calidum quidem ex sanguine vel bile; frigidum ex pituita vel humore melancholico; cui & nonnulli addunt apostema ventosum, si & ventositas simul adsit. Si igitur calidus est abscessus, aut ex cholera vel sanguine oritur, aut viroque humore, aequaliter, aut inaequaliter. In bilioso abscessu, dolor tactu veluti clauus infixus, inest feruentissimus, cum ardenti febre, naturaliꝫ circuitu, siti audissima, cibi radio, vomitu quandoꝫ bilioso, cum furore phrenetico; vrina citrina vel flaua conspicitur. Ex sanguineo vero abscessu ventris superior pars magis tumescit, ac extenditur, cum maiori pulsu, ac gravitate; vrina purpurea cernitur, venarumꝫ pulsus maiores sentiuntur, tumor ipse mollior efficitur: si vitium vetus fuerit, corpus macie conficitur, caui oculi fiunt, vrina subsistit, aluus liquida redditur; & assumpto cibo stomachus malè afficitur. Abscessus frigidus, nempe humore congesto, mala concoctione, nimio ocio, humoreꝫ eodem confluyente fit. ex pituita abscessum grauitas sine siti indicat absque ardore stomachi: tum nulla febris adest vehemens, vel periodica tantum, os saliuā abundat, venter ac facies pallent, turgent sine duritie; nullam cibi desiderium est, pulsus mollis, vrina crassior, alba; corpus graue redditur, ac torpore quodam afficitur; qualis lethargicis euenire solet, lasa ex aliqua parte memoria. Ex melancholia apostema durum est, in quo dolor non

Abscessus
calidus.

Biliosus.

Sanguineus.

Frigidus.

Pituitosus.

Melanchol-
cus.

Signa oris
ventriculi
laxi in ab-
scellu.
Os stomachi
quibus parti-
bus consen-
gat.

In fundo sto-
machi.

In parte an-
teriore seu
posteriore.

In tunica in-
terna.

perpetuus est; sicuti neque cibi appetitus: venter in eo
quandoque sponte fluit: sed semper corpus macie confici-
tur, ructusq; acidos edunt, agri insomniculosi: vrina
tenuis, ad glaucum vergens; pulsusq; tenuis est, ex ab-
dita febre: is anhelitus grauis est, ac animus tristis, ac
semper mœrens. Ostium ventriculi, praesertim in ab-
scellu calido, sauisimo dolore afficitur: animus enim
vel primo die protinus linit, non aliter quàm prae cor-
diorum abscessu: vnde neruorum distentiones, mentis
animiq; furor oboritur: multi namq; & attoniti fiunt
ex cerebri & cordis haud dubia communicatione cum
ore stomachi. in quibusdam nimia inedia sensilitate
adedò obfuere, vt similiter caderent, spasmatum membra
omnibus. Maxime mentis alienatio comitatur si si-
apostema calidum: si frigidum, caros, stupor. Si sit in
fundo stomachi, dolor est minor; & excrefcit, non im-
mediatè post cibum, sed per horam post eius assumptionem:
tumor quoque & dolor prope vmbilicum, per
duos digitos aut tres, aliquando declinans magis ver-
sus dextrum, modò sinistrum: magisq; leditur conco-
ctio quàm appetitus: & in fundo magna ex parte sub-
sequitur maior lubricitas ventris. Si in parte anteriore,
magis subiacet sensui, & dolor in parte anteriori senti-
tur; & non tolerat ager compressionem. Si in postero-
ri, è contra dolor in posteriori parte sentitur. Si sit in
omnibus partibus, accidentia omnibus partibus sunt
communia. Si in tunica interna, symptomata valdè
intenduntur: dolet supra modum, appetitus deicitur:
syncopis, tremor ob cordis consensum sequuntur: &
vomitus, si in superiori parte; vel secessus si in fundo: ve-
licet in contrarium euenire posset, dolor augetur, quasi
immediatè sumpto cibo, & in descensu; & dolor circa
spatulas,

spatulas, ob œsophagum seu gulam extensam per deorsum. Si externa tunica, accidentia magis remissa, neq. fit dolor maior sensibilibiter post assumptum cibum; nisi esset multa quantitatis. Tumor & durities exterius magis percipiuntur; neque aliquid sensibile per vomitum aut secessum educitur de apostematis materia; neque ita laditur virtus appetitiva aut coctrix: modò habent ventrem mollem, modò duriorẽ, deficiente virtute retentiva, aliquando expulsiua. His addunt signa temporum apostematis & resolutionis, maturationis, ruptionis & indurationis: de quibus de pleuritide dictum est. reliqua vide apud Arculanum, tum reliquos.

In tunica externa.

Prognostica signa ex superius dictis etiã patent, quòd confirmatum ventriculi apostemata ut plurimum interficiat; calidum tamen velocius quàm frigidum. Et si ad maturationem & exituram tendat, sepe desperatio- ni propinquior quàm spei est. In cancroso nulla spes relicta. Pituitosum magis quàm biliosum sanatur. & in tunica externa minus malum quàm in interna: exterius medicamenta imposita magis iuuant: & in tunica interna magna ex parte calida sunt per viam defluxus; frigida per congestionem. In fundo minùs mala quàm in ore, imò pessima. ratio in promptu est: fundum minùs sentit, & forcius est in resoluendo, ob caliditatem. Hac quoque mala censenda, si frigus membrorum extremorum accedat; imò lethale, iuxta Hippocratem, si frictionibus & pannis calidis non remoueat. Biliosum quoque deterius sanguineo: & melancholicum pituitoso. Interna quoque si ad saniem perueniant, vix vel nunquam curantur, ob membrum nobile: quamut hac puella curata fuerit, est ex raris contingentibus. Ita & Gradus in toto tẽpore sue praxeos, tantum bis tẽrve

Prognostica.

Curatio ab-
scessus cali-
di.

curatos vidit. Quomodo calidus abscessus seu apostema-
curetur, iam ex parte dictum est. Calo primum frigidus
& humido ager contineri debet: vbi sine animi pertur-
batione, sine lectione, balneo, sine frictione stomachi de-
gere oportet. nec somnus longior convenit. Valet &
cibus facilis coctionis: ac paulatim frigida ac humectans
natura, tum actu tum potentia offerendus est. Vinum
obest, & carnes, & omnia tragemata ex saccharo &
melle. Valet syr. viol. ros. thamarindi & puls hordea-
cea, cum succo punici: & syr. ex succo nymphæ: vi-
ctusq; iam dictus vsque ad septimum: deinde atriplex,
cucurbita in cibo danda. Suppurato abscessu, refrige-
rantia & adstringentia paulatim remitti debent. Aluus
lenienda clysteri tantum mollienti. & si ex sanguinis
vitio sit, valet syr. ros. oxyzach. In bilioso, viol. nymph.
pap. & protinus vena secanda, ut diximus. sed à ca-
tharticis abstinendum. Parti affecta frigida prius im-
ponenda, leuiter astringentia: incrementum malo partim
dissoluentia, partim astringentia: vbi constiterit mor-
bus, dissoluentia & laxantia augenda; ita tamen, ut
non careant restringentibus, ob partis nobilitatem. in-
clinante malo, ad maturantia & dissoluentia venien-
dum. In fine demum, si non resoluatur abscessus, sed
suppuretur, maturantia ac emollientia conueniunt;
adiecto tamen leui constringente, & ventriculum ro-
borante, ut succo absinthij. Prorumpente demum pure,
ulcerum curationes sequuntur. quorum copiam præsi-
diorum inuenies apud Alexand. Benedictum Veronen-
sem; quæ magna ex parte ab Arculano excepit. At in
abscessu frigido, si initio discutientibus non curantur,
(sicuti priores abscessus) materia enim crassa est, ac pa-
rum obsequens; diaphoretica plurimum valere volunt,
hoc

hoc est, resoluentia. Quidam ea admiscere ausi sunt: quod alij minimè censent, nisi commixta quoque cum calida materia foret. In phlegmatico igitur conuenit in principio oleum ros. & absinthij aquis portionibus, imposito emplastro ex far. fœnug. lini, hordei, lupinorum, meliloti añ ʒ j. absinthij, schœnanthi añ ʒ ij. ros. rub. myrti, aloës añ ʒ iiij. cunsa & cribrata rosaceo excipiantur, adiecto adipe gallinaceo, anserino, & succo plantag. sanguinalisq;. Alij sacculis vtuntur duobus, aut spongiis decocto perfusis, & expressis inter duas tabulas, ex decoct. ros. cauliculorum myrti, mentha, absinthij, santal. schœnanthi, nardiq; paribus portionibus, exiguo vino austero decoctis, & percolato sicco. Interea rhodomel in potu iuuat, cum plantag. & absinthij aqua. Increcente abscessu inungemus oleo ros. chamamel., anethino, nardino añ ʒ ʒ. cera quod satis est: adiecto spica, macerus, schœnanthi exiguo, & superimposito emplastro ex farina lupinor. fœnug. añ ʒ ij. ros. meliloti, chamomill. anethi, apij añ ʒ ʒ. cum brassica succo, & oleo chamameli. In statu, vtuntur oleo nardino cum spica, schœnantho, cypero & aceto, & emplastro ex melil., chamomill. rad. alth. ammoniaco, adipe anserino, & gallinaceo, & similibus: & si ad collectiones veniat, radice liliorum cocta & imposita & quicquid collectiones aperiat, si suppuretur. Sed vnum inprimis animaduertendum est: si venter intempestiue fluat, tum emollientia plurimum obsunt: sed astringentia imponenda sunt, donec subsistat alius, ex palmulis emplastro frigido, aut calido pro abscessus qualitate cum succo vua acerba aut absinthij, aut si opus sit, materia mixta vtrumque commiscebimus. In abscessu melancholico, inter initia rosaceum, lilinum, lutearumq; violarum,

Apostematis
seu abscessus
frigidi cura-
tio & pitui-
tosi.

Cautio.

Abscessus
melancholi-
ci.

larum, aut narcissinum cum aceto commixta valent, inuncto stomacho, & subinde hoc emplastro imposito: *℞* farina fœnugraci, sem. lini, althæe añ \mathfrak{z} ij. meliloti ros. anethi, myrti añ \mathfrak{z} β. ex iisdem oleis cum adipe gal-
linaceo, ac anatino misceantur. Cùm increscit tumor, inungimus violaceo oleo ex luteis viol. lilino, adipe ana-
tino, anserino, addito croco. In statu, ex adipe anatino, anserino, gallinaceo, ceruino, vitulino añ \mathfrak{z} j. styracis li-
quida, bdellij, myrrhæ, spicæ, mastice, cyperi, carthami sem. interioris añ \mathfrak{z} β. amygd. amar. \mathfrak{z} j. gummi in vino dissoluantur: deinde tunc fas amygdalas cōcicito, & reli-
quas species, adipēs postremò infunde: id emollit, discu-
zit & confortat. Si phlegmone indurescat, valet em-
plastrum de meliloto; & Nilei malagma, quo veteres utebantur, qui gloria sua fraudandi non sunt.

OBSERVATIO XXXIII.

De ventriculi ulcere.

PVELLA quindecim annorū, per biennium ferè cùm de dolore ventriculi conquerere-
tur, anno tertio tumorem manifestè viderunt pa-
rentes in eo loco: neque tunc quicquam consilij
aut remedij tentatum. Hinc ruptionem animad-
uerterunt: excreuitq. puella materiam biliosam,
pituitosam ac saniosam per alium. ex his apo-
stema apparuit. Hæc cùm Bononiæ in Italia de-
cumberet, tunc prius vocatus est Elideus, medi-
cus Hospitalis Bononiensis Vitæ dictæ, præceptor
meus. Is indicatione sumpta ab ætate, virtute,
temperamento, loco malè affecto (quoniam lo-
cus vehementer sensibilis existit) continuique
solu-

soluzione; iudicauit necessariū exiccantibus abstergentibusque vtendum esse, ac magna opus fore diligentia, tum quia locus est principalibus membris subministrans; tum quia toti corpori nutrimentum præparans. Quare loco potus & digestionis, præscripsit aquæ mellis vsum. Cibum verò facillimæ coctionis, exiguæ quantitatis, ex hordei cremore, nonnumquam ex panata, exiguo cinamomo adiecto: & aliquando vinum in pauca quantitate admisit. Pulsus huic erat creber, debilis, paruam habens inæqualitatem, vt fit in affectibus vetriculi: vrinæ albæ, crassæ, nō coctæ: Stomachum inunxit oleo mastichino, cum lana succida applicando. Tertia die vidit eam lienteria laborare: & quemadmodū Gal. 6. par. aph. 1. causam eius fore dicebat, vel imbecillitatem virtutis retentiuæ, vel vlcerationem ventriculi & intestinorum; sed præceptor certò persuasum fuit, hanc prouenire ab exulceratione stomachi, ob loci dolorem, ruptionem & saniosam materiam; non ab ipsius virtutis debilitate. Idedò adhibuit fomentum exiccantium & constrictiuum; nempe ex absinthio, mentha, flor. ros. malicorio, gal- lis, balauistiis, myrtillis, mastiche, olibano. exhibendo prætereà miuam cotoneorum, cum quibusdam adstringentibus. Hinc tandem excrementa meliùs cocta visa sunt; & sanata est.

S C H O L I A.

EXVLCERATVR sæpe stomachus, leuiter ta-
Et a tunicarum superficie; modo grauius ambabus
tunicis erosis, vel perforatis letaliter. Exulceratio alia
recens

Exulceratio-
 num stoma-
 chi differen-
 tiæ.

recens est, alia inueterata, ex acutis humoribus in stomacho congenitis, aut capitis acutis destillationibus, aut abscessuum adaperto pure (vt in hac puella, tum praecedente) aut pustulis in eo ortis, ex quibus pestifer exit liquor. Ex vulneribus quoque praesentis, aut perperam, vel per incuriam relictis. Venena item philtrante portionatis exulcerant & stomachum & intestina omnia, sicuti & cathartica ab imperitis oblata; veluti

Lib. 12. c. 17. scammonium & euphorbium. Refert Benedictus Veronensis obiter exemplum vnum cuiusdam religiosi vicinum quendam in podagra dolore auxilio praesentissimo curaturum se promiserat; audierat enim hic bonus homo pilulas, quae ab euphorbio in officinis nominem habent, huic morbo saepe profuisse: ex solo igitur euphorbio confici pilulas a speciariorum non minus quam ipse erat imprudenti, iussit: assumptis catapotis, dysenteria eo die ager correptus fuit perniciosam; atque altero sepultus. Exulcerato stomacho febris adest subinde, lingua aret, sitis quoque viget, animus quoque subducitur, si vlcerum ingentia fuerint, & in ostio praesertim stomachi. A cibo salso, praesertim quoque frigido, aut calido, vel acuto, veluti sinapi, aceto, assumpto, summus dolor. Purulenta praeterea vel cruenta vomitiones, immixtae tunicarum crustis, indicio sunt. Oris item graueolentia ex crudis veluti piscibus, vel adustis ossibus: & ventrilienteria adest molesta. At exulcerationis varietas, magnam differentiam habet: in primis oris stomachi summum dolorem ac accidentia sequuntur terribilia; difficultas anhelitus, sudores extremorum frigidi, ac animademum defectus: cibus quoque deuoranti cum os stomachi pertingit, maximum dolorem infert; delapsus exinde, quiescere statim permittit egrum. At quae in imo

ventre

Signa.

Vlceris signa
in ore ventriculi.

ventre sunt vlcera, minus ladunt: sed malè digerit
 ager. Verùm si vlcus in œsophago infederit, inter scapu-
 las (vt narratum est) dolor figitur, ac in deuorando
 cibo excruciat ager; minus tamen quàm si in ostio
 fuerit. Intestinorum gracilium, ac stomachi vlcera cùm
 in eodem ferè sint confinio, doloris loco ferè non discer-
 nuntur: tempore tamen cruciatus, differunt; gracilium
 enim intestinorum tormenta sauius sentiuntur, ac in-
 ter excrementa tunicarum ramenta conspiciuntur; si-
 cuti inter vomitiones vlcerum crusta cernuntur ex
 stomachi vlceribus: qui acri cibo assumpto, protinus læ-
 ditur, quo intestina tenuia non laduntur. Quibus sto-
 machus supra modum exulceratur, numquam sanan-
 tur: & si vetus vitium est, lenteriam inducit, aut ex
 acutis humoribus vel corruptionibus, dysenteriam
 minatur: iis plerumque os graue olet, vti apud Dodo-
 naum cap. 25. de honesta matrona constat, annos
 (plus minus) 40. nata, quæ ex ore fœtentem spiritum
 multis emiserat annis; quæ longo tempore morbo con-
 fecta è vira decessit. & ventriculus exterius ab omni
 parte superficie tenus inuentus est exulceratus, & quæ
 ipsum cõtingebant vniuersa, non tamè alia, quàm quæ
 ventriculo contigua erant, parte. Exulcerato stomacho
 (vt Paulus scribit) in omnibus quidè edulis obsoniisq;
 acria vitanda sunt, atque eadem pariter in potionibus.
 sed mitigatoria vtrique laudantur, quales pulles sunt
 sine oleo, ex amylo, hordeacea, farina, ac terra Samia
 Lemniac, rubrica, ex lacte aut melle. Et quoque sine
 medicamento mordaci purgandus est ager. Nostri re-
 centiores, præter aëris temperacemntum, animi securi-
 tatem laudant, ac temperatum somnum: ac inter ci-
 baria quicquid actu vel potentia leuiter exiccat, qualis
 panis

In imo ven-
 tre.
 In œsopha-
 go.

Differentia
 vlcerum in-
 testinorum
 gracilium &
 stomachi.

Prognostica.

Curationes
 vlcerum sto-
 machi.

panis similagineus est, sine sale, sineq; multo fermento, ac prisana, alica, far ac amyliū, lens excorticata, oryza, & faba fracta. Auicula quoq. profunt, vt galerita, per-
dices, atagenes, phasiani, turtures, turdiq; inter qua-
drupedes, lepores iuniores, capreoli; hœdi, vituliq;, ver-
uecesq; iuuenes: laudauere & intestinorū hœdi ac vituli
ex aceto condituram, ac eorundē extrema pariter con-
dita, tum oua sorbilia in aceto cocta, aut caseum recen-
tem: vel ipsum lac, cūm abstergere volumus, cum ferro
ignito aut lapidibus ignitis vlcera sanat, vinū rubrum
subacre, nullarū virium, ex aqua in qua chalybs ignitum
multoties extinctus fuerit; vel ipsa eadē aqua cum syr-
ros. valet & in ipsis cibariis posita. Initio enim abster-
genda sunt vlcera, tum cibo tum potione: tunc stiptica
damnantur. Tum cūm vlcera persananda sunt, stiptica
damus: prodest panis cum mastiche, aut balausliis con-
fectus; & caro ipsa veru affata, ex cydoniorum succo,
aut mali punici vino, vel cum omphacio vna. Sorba-
quoque immatura arida in puluerem redacta dantur
in eduliis. Ex potionibus, qua mordacem humorem
compescunt, singulis propinamus. Interea vomitiones
& cathartica vitamus. Si purgandus, sufficit cassia.
quibusdam valentibus adhuc, profunt vena sectio, vel
vrinam ciere. Si eueniat ex destillationibus, iis succur-
rendum, vt dictum est. Abstergunt zacharū cum aqua;
vel mel, vel mulsa, cum passulis. Si vlcera sint in gula
aut ore stomachi, adglutinantia admiscemus; vt ante-
quam in ventrem descendant, hereant, quale gummī
arabicum est aut tragac. at si in imo fuerint pura, vno
haustu assumi debet. Rupto verò apostemate, lac capri-
num manē in potu valet, si recens ac tepens fuerit:
ante cenam verò duum horarum intervallo hordea-

Vomitiones
& cathartica
in vlceri-
bus stoma-
chi vitanda.

ceam cum zacharorofaceo aut melle damus. Quæ in omnibus ferè vlcerum generibus calidis ac æstare offerimus: hyeme verò ac materia frigida, rhodomelite viimur salubriter, percolato; aut hyssopi decocto cū melle. In phlegmate verò salso, aqua brassica opus est, aut oliuarum muria: modus est à quatuor ad sex vncias. Mundis & absterfis vlceribus, quæ vulnera consolidant damus, pastillos ex succino. Quæ ad œsophagi vlcera valent, prius dictum est: reliqua vide apud Arculanum, & Alexandrum Veronensem, qui eadem habet. Balnea ferrata & aluminata laudantur. Vlceribus vetustis, ex quibus corrupti humores fluunt, oliua & ruta folia, ac agrimonia in nigro vino cocta ad duas partes, percolato decocto, manè & vespere detur ad ℥ vj. vlcera enim omnia interiora sanat. At si stomachus erosionibus perforetur, iis præsidii vtemur, quæ in sanguinis vomitu diximus. Si fluxus acciderit ventris, valent trochisci ex spodio: quo tempore adstringentibus opus est. In vehemēti vlcerum tormento, philonium ocysimo præsidio iuuat; exiccando plurimum refragatur vlceribus, ac absumendo humores fluentes. Alij athanasia compositionem prætulere: & ad vlcera & ad fluxum Paulus dat cydonium malum cum pulve.

OBSERVATIO XXXIIII.

De stomacho natura angustiore.

VIDI, inquit Galenus lib. 2. artis parvæ, ventriculum cuiusdam ita paruum, rotundum, ac propensum in ilia, vt propria circumscrip̃tio perspicuè appareret spectanti & attrectanti. Ita & apud nos puella quædam Delphica perpetuò malè habebat in stomacho: nam
à natu-

à natura angustior factus erat. quem his notis deprehendimus: nam plurimo cibo distentus stomachus lædebat: sed exhibito exiguo cibo, idque frequenter, minus offendebar, & commodius tunc cibum concoquebat. Hoc autem innatum vitium, iuxta Galenum, immedicabile iudicauimus: & ideo eandem incuratam reliquimus. Tantum in mandatis dedimus, ut parum & frequenter cibum concoctu facilem sumeret, ut minus dolore afficeretur.

SCHOLIA.

Innata stomachi vitia.

Morbi instrumentales.

SUNT autem & naturalia vitia incorrigibilia: ut si stomachus natura angustior factus fuerit: cuius notas nunc posuimus. At si venter natura laxior est, cibibus intus importune innatat; nec in concoquendo quod satis sit, corrumpitur stomachus: ita enim à natura materia diminuta, aut nimia efficitur: plurimum tamen cibi sustinet magnitudo stomachi: & instrumentarij morbi sunt. Parem offensionem habet stomachi rotunditas; in quo cibis grauior sentitur, qui ad inhaustus protinus delabitur. Ventrì quoque positus notatur: nam si ad extrema vergat, aut nimium diaphragma supprimat, damnatur: quoniam ille concoctioni hic respirationi aduersetur. Inter instrumentarias quoque affectiones annumeratur staminis leuior contextus; unde & naturalis calor infirmior redditur: textura tamen alioqui crassior quam par sit; ad concoquendum incongrua est: rugas enim eo modo difficulter contrahit: tenuitas ipsa, aut ex humiditate laxante aut siccitate consumente generatur; aut calore continuante absumitur; ut in morbis longis accidere solet.

ex frigido quoque (et si raro contingat) extenuatur venter. Est & aliud stomachi organicum vitium, nimia quadam stomachi asperitas, aut aliquibus leuitas importuna, qua cibus ad intestina citius quam opus sit, labitur. In illa venter asper est, veluti in bubus, denticulatus callus est in ore, & in ventre, ubi crenes maximè conspicuae sunt: in homine multo minores ad os stomachi, ut scobina fabri, leuior asperitas, sicuti pyloroni versus in media in modum rubi ad conficiendos cibos extans callus cernitur: nec in omnibus pares crenes (ut vidimus) apparent; teste etiam Alexandro Veronense. nostri recentiores non ad concoquendum cibum, sed ad retinendum facere putant; unde nimia asperitate, qua diutius cibus retineatur, siue nimia leuitate, qua citò profluit, corpora facile consumi tradidere. Asperitas pinguibus molliibusq; cibis; altera stipticis leuatur.

Asperitas
stomachi
vel nimia
leuitas.

In positu aliud quoque vitium est naturale, qui tumor ventris dicitur: extrinsecus enim prominet, pro-

Proulimate-
sis.

limatesis vocatur, hoc est prominens positio: sanari id malum minimè potest; difficulter enim cibos concoquunt: sacculo occurrimus pluma anserina pleno, aut pelle vulturina. Differt ab inflatione ventris seu ventriculi, de qua prius dictum est & postea latius dicetur.

J. Sennig
com. m. d. 28.
L. 4. c. 28.

OBSERVATIO XXXV.

De ventriculi cruditate.

PVELLA annos 24. nata, textoris filia, nobis vicina, alioqui pulcherrima, facie supra modum pallida, ventriculi cruditate longo tempore laborabat; cibum non concoquebat, neque rectè permutabat: Lotium in ea valde crudum, M album,

album, inconcoctum, sine hypostasi spectabatur
ructus perpetuò emittebat, & subinde acidosis: sitis
nulla premebatur. Hæc cum adessent, facillè in-
tellexi hanc cruditatem procedere ex ventriculi
frigidityte, & simplici intemperie frigida, etiam
humida admixta: nam facillè cibus in stomacho
crudus innatabat; quem subinde euomebat, tan-
quam rariùs, frigidityte magis superante. Vsa fue-
rat longo tempore cibus crudus; & , vt ab aliis in-
tellexeram, victus rationem non obseruabar.
Hanc autem, ne in maiorem cruditatem incide-
ret, admonui, vt neque in multitudine, neque in
qualitate eorum quæ in cibo accipiuntur, neque
in acceptionis oportunitate, neque in ordine de-
linqueret: & vt quæcunque concoquere valeret
ea tantùm ingereret; & non quæ appetitus expo-
stularet. Propterea rectè dicebat Aëtius, ne qui
in cruditatem incidat, cautione in omnibus præ-
dictis est vtendum, vt neque in multitudine eo-
rum, neque in qualitate, neq. in ordine sumend-
delinquant; & ea tantùm ingerant quæ cōcoque-
re possunt. Mensuræ itaque vt maximè omnium
curam haberet imperaui, & appetentiam refre-
naret, neque plus quàm vires tolerarent, accipe-
ret. Iuxta quoque tempus accipiendi cibi, neque
impetuosè, neque acruatim, neque solidis parti-
bus, aut absque commanducatione eos ingereret
neque etiam potus cibum interpellaret. id enim
vniionem ciborum impedit, singulosque ventr-
innatare facit; vt idem Aëtius refert. Iussi præ-
tereà vt & ordinem præposterum caueret; ne sci-
licet mala cotonea aut punica aut aliquid aliud

tale in primis ingereret, deinde verò olera assu-
 meret, aut alia quæ aluum emollirent: nam & in-
 tempestivam assumptionem evitare oportet; ne
 antequam hesternus cibus probè descenderet,
 pranderet, aut etiam præter consuetam horam.
 cum enim nulla exercitatione sese exerceret, pe-
 ius habebat; nam sedentaria erat, & sartrix. tales
 enim semper desides; hoc malo magis afficiun-
 tur, quàm aliæ puellæ quæ ambulando vel aliter
 se exercent. Concoctui difficilia quantum posset
 vitaret, etiam admonui; ut sunt carnes natura
 duræ, falsæ, fumo induratæ, bubulæ, aut ætate se-
 niores. & ided abstinere iussi quantum posset à
 pinguibus, salitis ac vetustis, & ab oleribus frigi-
 dis, quæque flatu pariant; à cibis corruptis, fœ-
 tidis, ac graveolentibus, à fructibus dulcibus, fla-
 tusque generantibus, & immaturis, bellariisque
 quæ difficulter concoquuntur, & cibis peregrinis
 & inconsuetis, placenis. Deinde ut post assum-
 ptum cibum, motus inæquales ac conturbantes
 vitaret, consului, & æstus nimium, ac refrigera-
 tionem; hæc enim concoctioni ciborum resistunt.
 Sed, ut præcipuè hypochondria ac pedes mode-
 ratè calidos custodiret: manuque inter dormien-
 dum os ventriculi apprehenderet: id à Gal. ma-
 gis laudatur, s. de med. simpl. fac. cap. 5. quàm
 calor ille qui à fomētis paratur. Somnus & quies
 his conferunt, & erectior decubitus: & ea quæ ca-
 piti subiiciuntur sublimius insternantur, & re-
 clinatio ipsa in sinistram latus fiat. frequentes
 agitationes etiam si vigiliis infestantur, cibos per-
 turbant, intestinaque inflata reddunt. Sed cum

hic intemperies frigida esset & humida; tam aër quàm cibus, & alia magis ad caliditatem & siccitatem vergant: & sic potius assis quàm elixis & valde humidis vteretur iussimus. Et cùm intemperies simplex facilè tollatur, amotis causis, vt de imbecillitate diximus; ideo hanc frigiditatem calidis curare nitendum esse duximus; & cùm vnà humiditas adiuncta esset, etiam siccantibus: ideo & aromata cōcessimus, & carnes assas cum aromate conditas. & exhibuimus diarrion piperon & diacalamentum cum vino, vel, quia non satis diues, cum ceruisia, in qua decocta erant hyssopus, mentha, absinthium, & calamintha.

Sic alteri puellæ eodem malo laboranti, magis diuiti, sequens claretum cōmodè dedimus: ꝛ. cinamomi electi ℥ β. zinz. ʒ j. maceris ℥ β. nucis muscatæ ʒ j. garyophyl., piperis longi, granor. paradisi añ ʒ β. cum vini Rhenani vel alterius odorati lib. ij. fiat claretum, addito zacch. ad ℥ viii. Puellæ verò priori, cùm nō ita diues esset, etiam dedimus decoctum absinthij in ceruisia coctum: & ventriculum commodè inunximus oleo nardino, mastichino, & absinthij; adiecta cera exigua; appposito cerato ex mastiche, speciebus aromaticis quibusdam adiectis, & oleo nardino. In eiusmodi malè coloratis & non concoquentibus cibum, hoc puluere cōmodè vtimur: ꝛ. anisi ℥ ij. seminis fœniculi, cinamomi, cardamomi, zinz. añ ℥ j. spicæ, croci, basiliconis, carui, fem. apij, petrol. añ ℥ β. limaturæ ferri præparati, ad pondus omnium adiecto zacharo, fiat puluis: datur ante prandium ʒ β. Appetitum excitat, cibum

*pul. magis
xalis*

bum concoquit, stomachum calefacit, ventositates dissolvit, frigidos crassosque humores ad intestina pellit, colorem plumbeum corrigit, bonumque reddit; ac sanguinem purificat. Hic pulvis quoque saepe expertus dicitur ad male coloratos: & limaturæ ferri præparati ℥ v i. cinamomi ℥ ij. spec. diarod. abb., succini añ ℥ j. zacchari ℥ v. fiat pulvis. His quoque valet decoctum azari & alia diuretica, cum in talibus sanguis aquosus fiat ob improbam concoctionem. Etiam hic sequens decoloratis convalescentibus prodest: & specier. diarod. abb., carabe, cinamomi añ ℥ ij. sem. anisi ℥ j. galangæ ℥ j. limaturæ chalybis præparati ℥ v i. zach., lib. β. misc.

S C H O L I A.

COMPLURA sunt, quæ concoctricem facultatem ledant: sicuti enim concoctio alteratio est, quæ stomachus sibi cibos assimulat; ita cruditas, seu mala concoctio est, ubi à scopo illo degenerat. Hoc autem sit trifariam, inquit Galenus: vel quia nihil immutantur cibi; & hanc quidem propriè cruditatem dicant: vel quia non mutantur perfecte; & hæc bradypepsia nominatur, quando etiam semicrudi manent: vel quia in alienam qualitatem mutatur; quæ dyspepsia dicitur. Hæc verò duplex est: vel enim in acidam qualitatem vertuntur, (ut iam sæpe diximus, etiam de stomachi imbecillitate;) vel in nidorsam. De his vide Gal. & præcipuè de alteratione seu concoctione (quæ nihil aliud est, quam ciborum in convenientem animali qualitatem alteratio) lib. de diff. sympt. Ceterum accidit quandoque frustratio; quæ quidem alterationis, seu concoctionis

Cruditas
trifariam
accidit.

coctionis symptoma est, eodem Gal. teste 3. de caus. symptomatum. Verum quum frustratur, propterea quod nulla omnino alteratio fiat, id symptoma praecipue à Graecis ἀπεψία, à Latinis cruditas nominatur (modo quo in animi functionibus immobilitas, & insensibilitas dicitur;) significantibus his vocibus actionis amissionem ac priuationem. Quandoq; vitiosa alteratio fit, quae iterum à Graecis ἀπεψία, à Latinis quoque cruditas appellatur: significatur tamen non sicut prius priuatio, sed deprauatio duntaxat ipsius alterationis. Atq; haec rursus deprauatio duplex esse potest, vel quod tardè & non conuenientem mutationem cibis suscipiat, vel quod corrumpatur omnino, ita vt natura gratiam prorsus recipere nequeat: priorem quidem Graeci βεβηκυμένη, Latini tardam concoctionem nominare solent: secunda verò nomen proprium non inuenit; vt patet eodem 3. de causis sympr. Sed quamuis diximus ἀπεψία nominari posse tam priuationem concoctionis, quam etiam eius deprauationem: tamen aequiuocè quae vitiosa facta est, cum ea quae omnino non sit, sic nominatur. Propterea clarioris doctrinae gratia priuationem

ἀπεψία, βεβηκυμένη, βεβηκυμένη.

alterationis ἀπεψία: eius verò vitium, βεβηκυμένη, sicuti tarditatem seu imbecillam alterationem βεβηκυμένη nominabimus. Omnes tamen vniuersali vocabulo, poterimus iuxta Alimorum vocare cruditates: cum in qualibet earum concoctio ipsa frustretur; & ex eisdem fere causis oriantur maioris duntaxat & minoris rationibus disidentibus. Venter hic secundum eius spaciū seu cavitatem oblaesus est; cum & ipsum coctionis instrumentum sit à natura fabricatum, quomodocunque concoctio vitiosa fuerit, modò vitia eiusdem à quopiam externo errore non proueniant. fieri

Quae pars in cruditate afficitur.

namque poterit cruditas aliqua (vt dicemus) absque hoc, quòd ventriculus afficiatur, vt apud eundem Galenum liquet 1. & 5. de loc. aff. tum 3. de causis sympt. Erunt itaque facultate ipsa oblata pradiſta symptomata in genere noxae functionum naturalium, altera tricus videlicet. Verùm in vno symptomate, vt puta in $\beta\pi\epsilon\delta\omega\pi\epsilon\iota\alpha$, ipsa actio erit diminuta; in $\alpha\pi\epsilon\iota\alpha$, ablata; & in $\delta\omega\pi\epsilon\iota\alpha$ deprauata. Duo autem priora symptomata facile dignoscuntur: nam ciborum assumptorum qualitas, siue ructare velint, siue vomere, plane seruetur: licet in $\beta\pi\epsilon\delta\omega\pi\epsilon\iota\alpha$ acidi quandoq; ructus fiant; interim ventriculus halituoso impletur spiritu. Verùm deprauatam concoctionem victus iniucundus proueniens, manifestè indicabit; qui modò vnum, modò alterum vitiosum saporem praesefert. Et si per aluum corrupti cibi deiciantur, necessarìò aderit deiectionum graueolentia. Exempla infra scripta hac melius indicabunt.

Quis affectus praeter naturam.

OBSERVATIO XXXVI.

De duobus agris agrè cibum concoquentibus.

STOMACHVS (vt iam diximus) aliquando agrè cibum conficit, & immutat, aut seriùs, quàm naturale sit, concoquit. Vt nuper accidit in iuvene quodam, qui consilij causa nos accedebat, & conquerebatur de grauitate & praecordiorum inflatione, & quòd diutiùs indigestus cibus in stomacho detineretur, nobis notam vehementioris imbecillitatis ostendens: decem enim horis quandoque incoctus permanebat; idque vitio humoris calidi: nã stomachus morderi, ac erodi, in nauseam effundi videbatur, vento intus murmurante;

murante; ructu quoque ad os ex imo ventre prorumpente fumido & grauiter olente: caputque huic graue erat; & quiescere nesciebat: siti urgebatur, volæ utræque feruebant, cum cibi tædio. Huic longum somnum utilem esse diximus, & ut in quiete maneret, sine exercitatione, & ut in latere sinistro dormiret; id enim mirè ex Aristotele conuenit: & rursus in ventrem redormire, plurimum ad coctionem facere, quidam volunt. attamen qui in dextro latere somnum ineunt, alio magis cōsulunt. sed ambulationes somnum antecedere debent, quoad cibus ad imum ventrem resideat. Et quia videbatur hinc materia aliqua biliosa erodens, & quòd nauseam pateretur, ubi cibus inconcoctus permaneret, nec alio auxilio iuuaretur, aqua hordei tepida cum syr. viol. expellendam esse proposuimus: quòd si difficulter vomeret, ob nauseam, infusum rhab. vel syr. ex infus. ros. pallid. cum rhab. ut sumeret præcepi: & ventre exonerato ut stomachum roboraret, vino mali punici, medijs saporis sumpto; ac ut eduliis acetosis acidulisque iuuaretur, vinoque austero nullarum virium epoto, & aqua antè infracto. Propter capitis dolorem etiam fronti adhibui oleum rosaceum, exiguo aceto infusum. Ac stomachum inunximus oleo ros. myrteo; emplastro imposito ex malo cotoneo, baccis myrti, santaliq̃ue farina, & spodij puluere inspersis, oleo ros. vnctis & cera q. s. vel absque malo cotoneo. Quibus præsidiis hic inuenis bene habuit. Quem admodum & alter, qui ex humore frigido acidum ructum emittebat; ac sapor in ore acidulus erat.

erat. huic, cum pituita etiam ventriculū gra-
uaret, decocto absinthij sumpto, cum oxymeli-
te, cumque ad vomitum procliuior esset, deco-
ctum raphani exhibui cum oxymelite tepidē.
rursus post menthæ, calaminthæ, melissæ, absin-
thij decoctum, purgaui cum pilulis infra scriptis:
& pilul. de hiera Gal., pilul. stomaticarum añ ʒ j.
pilul. de agarico, rhab. electiss. añ ʒ ss. cum syr.
de mentha, fiant pilulæ v i i. dentur manē. Postea
capiebat aromaticum rosatum: & subinde ute-
batur vino generoso, & diatrionpipereo: & sto-
machum inungebat oleo nardino & spicato. At-
que iis tum alijs, his, vel similibus remedijs, à ma-
la concoctione & imbecillitate stomachi à causa
frigida, conualuere.

S C H O L I A.

CAUSA autem eorum symptomatum (etiam di- Causæ.
ctorum scholio precedente) communis, altera-
tricis facultatis frustratio est. Prima verò eiusdem fru-
strationis causarum genera duo sunt; vt Gal. lib. 3. de
caus. sympt. inquit: Alterum ex facultate ipsa læsa:
Alterum ab externo quopiam errore proueniens. Vir-
tutis autem læsio adhuc bifariam esse potest: aut culpa
proprie substantiæ, ex aliqua primarum qualitarum
intemperie: vtpote cum præter naturam calfacta, in-
frigidata, humectata, aut exiccata fuerit. vel leditur
virtus ipsa ab aliquo instrumentali morbo, vt erysipe-
late, phlegmone, œdemate, scirrho, abscessu, & alijs
eiusmodi: quorum omnium occasione, venter facultate
eius concoctrice oblæsa malè concoquit. Verum in eius-
modi ventriculi temperamenti vitijs propria eius sub- Causa in-
terna.

M s

stantia

stantia labefactata, concoctio laeditur: in ceteris morbis, qui tantum sunt instrumentales, duntaxat impedita. Qui vero ex intemperie simul & instrumentali morbo compositi affectus sunt, utroque modo sunt noxi, ex sententia eiusdem Galeni praecitato loca. Ex tot itaque internis causis affectus ventriculi male concoquit; ut docte etiam annotavit Altimarus, cap. proprio de cruditare. Verum ipso minimè affecto, a nonnullis etiam causis concoctio impedi potest; ut propter cibi ac portionis immodicam copiam, vel propter eorum qualitatem alienam, aut sumptionem intempestiuam, intelligo acceptionem ciborum, antequam prior cibus probe subierit, ac etiam praeter consuetam horam, similiter propter incongruum ordinem, vel somnum exiguum & immodicas vigilias, exercitationesq; mox à cibo factas; aut vitiosum excrementum. quamquam si ex eo concoctionem frustrari contingat (etiam ventriculo minimè affecto) inter internas causas connumerari debet. At si ex immodica cibi ac portionis copia, vel prava eorundem qualitate, seu intempestiuitate, vel incongruo ordine aut exiguo somno, haud agere à laborante ipso seu astante percipi poterit. Interim vero ubi corruptela assumptorum sequatur, ex ipsa corruptionis differentia alimentorum qualitas praesumpta argui poterit: nam si in fumosam qualitatem corruptela vergat, argumentum est ex calidioribus magisq; biliosis cibis provenire: si vero ad acidam, ex his qui frigidiores natura sunt, magisq; pituitosi. At si in ventriculo cibi non suapte natura in sumum transmutentur, & quispiam fumosum ructum emittat, efficientem huius causam, calidam ipsius ventriculi intemperiem esse coniiciendum erit. Si vero saporem acidum referunt,

Signa causarum & ab errore commisso.

Ex corruptela assumptorum.

Si ob calidam aut frigidam intemperiem ventriculi fiat cruditatis signa.

eam frigidam esse necesse est; quamvis similiter in excrementis fiat, cum in ipso ventriculo contineantur. nam acidas qualitates quidem creant, quæ pituitosa sunt & frigida: fumosas verò quæ calida & biliosa, ut liquet eodē 3. de caus. sympt. Ut verò distinguas verum intemperies aliqua duntaxat calida vel frigida, an vitiosus quispiam humor ventrem infestet, dare oportet cibos, qui suapte natura, modo incorruptionis, quàm maximè aduersentur, ex Gal. auctoritate 1. de loc. aff. ut panem illis, qui in sumum transmutare cibum consueverunt; mel autem iis, qui acidum à cibo saporem percipiunt. deinde considerare excrementa, tum ea, quæ euomuntur, tum quæ per aluum deiciuntur; num humor aliquis cum illis quidem biliosus ac calidus, cum iis autem pituitosus ac frigidus excernatur; an nullo vacuato humore, ipsa exiguam quandam mutationem habeant. Nam si sine humore, perquam exigua in ipsis facta mutatione, deici videbis, intemperie duntaxat ventriculum laborare percipies. si verò humor quoque deiciatur, qui cibum corrumpere possit, videbis cibos huiusmodi humore submersos, & ab ipsius ventriculi actione manifestius alteratos. Verum ubi in tunicis ventriculi impactum contineatur excrementum, id quod ex inani nausea, sine vomitu, quæ irritat duntaxat & nullum humorem euacuat, dignoscet; si calidum fuerit, præter nauseam, sitis vehemens aderit (ut iam sæpe dictum est) & interdum febris; si frigidum, maior ciborum cupiditas excitabitur, nec siti nec febre affligentur. Intemperie calida aut frigida breui eò perducitur ventriculus: in humiditate & siccitate non ita actionem amittit, nisi prolixo temporis spacio; eodem Galeno teste, 3. de sympt. causis. Signa sicca intemperiei
&

De sicca &
humida in-
temperie.

Signa mor-
borum in-
strumenta-
lium.

Causa bra-
dypepsia.

Causa pro-
pria aepsie.

Causa dys-
pepsia.

& humida, vti & frigida & calida, diximus de imbecillitate ventriculi. Humidam itaq. intemperiem, præter ea qua ibidem diximus, hydrops plerumque præcedit: vti & siccam, senium, vel marasmus; eodem Galieno auctore. Si verò ab instrumentalibus quibusdam morbis prædicta symptomata oriuntur, ex eorundem instrumentalium morborum propriis indiciis cognoscuntur: de quibus satis in præcedentibus quoque diximus. Sed qua ex iam dictis symptomatis magis parata sunt hac incitare, videndum est. Sciendum est autem quòd promptius *βραδυπεψία* oritur exiguo somno, ex cibis qui difficulter corrumpuntur, & si ultra quam vivere tolerantur sumantur; iuxta Gal. & Aetium cap. 24. lib. 9. Quemadmodum vbi citra corruptelam concoctionis omnino privatio sit; ita ut quales accepti sunt cibi, tales permaneant; iuxta omnem eorum qualitatem, quæ propriè *ἀπεψία* dicitur, scire licet prorsus superatam esse ventriculum, aut ab immodica ciborum multitudine, aut ob virtutis imbecillitatem, aut à valido frigore, aut ob vehementem insiti caloris refrigerationem; vti apud eosdem liquet. Aded enim in tali statu ventris non concoquit; ut etiam concoquere prorsus non tenet. Circa mediocres etiam, & consuetos cibos si nihil in totam effecerit ventriculus, maximam eiusdem esse intemperiem prodit. Caterum si cum corruptione cruditas oboritur, quæ propriè *δυσπεψία* dicitur, ex calida vel frigida intemperie, præsertimq. ex calida, excitatur cum nullum esculentum calfactum durare impunit possit, ut constat apud eundem Gal. Similiter oritur ex recrementis calidis aut frigidis, aut vitiosis, ciborum qualitatibus iuxta ventrem consistentibus: aliquandò etiam ex inordinata sumptione ciborum, aut potuum.

aut intempestiuitate fit, ut apud eundem Aëtium pa-
 ret. Ex quibus itaque causis quodlibet prædictorum
 symptomatum oriri paratum sit, ex his liquidò con-
 stat. Nunc ad prognostica accedamus. Cruditās assi- Prognostica.
 dua maximè vitanda, cum ex ea viriosi humores, mor-
 big³ gignantur, siue ex boni siue ex mali succi cibis
 fuerit orta: quamquam ea deterior sit, quam viriosi
 succi cibaria effecerunt: ut liquet apud Gal. lib. de cibis
 boni ac mali succi. Equè mala quoq³ est in amara bile
 redundantibus cruditās, citissimè enim febrem accendit:
 quodcumque tamen prædictorum symptomatum ex ci-
 bis oritur, ex facili corrigetur. Mala quoque intempe-
 ries stomachi postquam est inueterata & antiqua &
 confirmata, curationem non recipit. Quòd autem ex
 ultimo virtutis collapsu in lienteriam, aut tympaniam
 hydropem finiatur, testis est Galenus, eodem 3. de causis
 symptomatum. Omnes quoque magna ventriculi in-
 temperies, veluti & aliarum partium, virtutem deii-
 ciunt, ut ibidem patet, & comment. aph. 20. 2. lib. Et
 propterea cum circa mediocres, & consuetos cibos nihil
 in totum effecerit, maximam ostendit ventris intem-
 periem. Pessima in amara bili; in qua cibi in nidoru-
 lentam & fumosam qualitatem corrumpuntur: quando
 ea quæ in acidam vertit, ut raro talibus naturis contin-
 git, minus nocet, Galeno auctore 8. meth. med. Nidoro-
 sa ac fumosa cruditās tunc minus noxia est eisdem, si
 alius lubrica fuerit: si astringitur, grauis est; si qui-
 dem ex astrictione eius vitiosa natura, in febres prom-
 pte incidant; præsertim si ad solita conuertuntur ope-
 ra, eodem Galeno teste. Omnium etiam prædictorum
 trium symptomatum pessimum est æt³ & si vitio fa-
 cultatis fiat: sicut Reg³ & si minus affert periculi.

Ex

Curatio.

Ex assidujs cruditatibus colica & iliaca passio-
 contingunt. Ex corrupta digestionē seu concoctione
 hydrops, carcinoma, herpeta, noma, erysipela, vitiligo,
 lepra, scabies & similia, vt quidam volunt, oriri solent.
 Sic ex corrupto succo sanguis cum ceteris humoribus
 corrumpitur. & sanguis corruptus, omnium pessimus
 est. Quod ad curationem attinet, qualis victus omnibus
 communis sit, obs. 34. precedente diximus: diuersa ta-
 men ratio victus pro causarum diuersitate, vii & me-
 dicamentorum, prescribenda est. Quae autē conueniunt
 frigida, calida & sicca & humida intemperiei, ea pe-
 tendae ex iis quae imbecillitatem ventriculi curare possunt:
 & si sit cum humorum abundantia, ex iis quocumque
 quae ibidem diximus, tum etiam de nausea & vomitu
 quomodo tales sint curandi, facile intelliges. De imbecillitate
 itaque ventriculi, tum etiam quae dicta sunt a
 nausea, vomitu, quae alterant, purgant, ac roborant &
 corrigunt intemperiem, & quae excrementis corrigendis
 satisfaciunt, conscripta inuenies. At si ex aliquo in-
 strumentali morbo praedicta excitentur symptomata,
 nemini dubium est, quod in eorum curatione, & ipsi
 quoque delentur: aliam enim inflammatio, aliam ery-
 sipelas, aliam abscessus, & scirrhus requirit: de quibus
 omnibus in precedentibus dictum est. Verum ubi ex
 alimentorum multitudine, quae concoqui nequit, au-
 eorum vitiosa qualitate cruditas fiat, confestim procu-
 randum erit, vomitu, aut purgatione per infernas par-
 tes, ipsos expurgari. eiciendus etenim est cibus, si co-
 cuit intus, aut compurruit, ex Celsi auctoritate, lib. 2.
 cap. 5. modò suapte natura vomant: nam cogere cui
 qui vomere non potest, absurdum est ex Gal. 1. de loc.
 aff. Si facile vomant, vt promptius id fiat, danda illi
 sum

sunt aqua tepida multa, paucio aceto aut syr. acetoso permixto seu oxymelite: at si vomere haudquaquam valeant, praesertim ubi multum aut corruptum nutrimentum notabiliter ad inferiora ventris sit motum, adiuuandum est, ut citius descendat, aut glande subdita, aut leui per inferius infusione, per clysteres videlicet, ut 8. meth. med. à Gal. scriptum est. Veluti etiam, si crudum, aut diminutè concoctum in superiori ventriculi parte alimentum adhuc consistat, modò concoqui possit, aliquid diatrionpiperion dabis, simplicissimo quidem modo, quo ab eodem Gal. 4. de sanit. tuend. scriptum est. vel si id haberi nequit, tantundem piperis longi aut albi, si hoc adsit, aut nigri exhibere conuenit.

Similiter extrinsecus adhibitus cōcoctio iuuanda erit, ut si expansa manu (ut paulo ante admonuimus) os ventris apprehendatur, aut puerulus carnosus admo-ueatur: ut Aërius refert. Vide de his Gal. 5. de simpl. & 7. meth. ubi scribit & humanum corpus illi imposi-tum iuuisse. Alij in quiete paruos catellos ventri impo-suere. sed puellus ne sit humecta cute; sudore profuso, refrigerant potius quàm calfaciant, inquit Gal. Valent & calida exteriori adhibita: quorum syluam inuenies in precedentibus, & apud Gal. 8. meth. conscriptam. Quid si non modò ex alimentorum praua qualitate, sed intempestiuitate, aut inordinata eorum sumptione, seu exiguo somno, cum corruptela cruditas generetur, non alia ratione curari debet, quàm si ex praedicta ali-mentorum vitiosa qualitate, aut multitudine fuisset excitata. Illud tamen particulatim attendendum erit, quòd quibus ob flauae bilis copiam in ventriculo con-tentam vel calidam admodum eiusdem intemperiem *Sorella*, seu cruditas cum corruptela accidit, cibos corruptu

corruptu difficiles, difficilesq; concoctu offerre conuenit. Nam qua concoctu difficilia sunt, non facile alterantur, ac corrumpuntur. sed si in multum calorem inciderint, concoquuntur magis, quàm si moderato occurrerint, ex Galeni decreto 1. de aliment. facul. quod etiam confirmauit Celsus eodem cap. 5. lib. 4. Hac libuit hic addere ex Alimaro. Sed exempla subsequentium, variam esse curationē pro causa adhibendā, ostendent.

OBSERVATIO XXXVII.

De quodam ex cibo corrupto in stomacho existente, laborante digestionis corruptione.

QUIDAM hoc tempore cū circa stomachum malè haberet, & cū excrementa, aut ventris crepitus flatusque supra modum & præter naturam olerent, corruptam digestionem seu concoctionem animaduerti. Hic enim præcipuè ex eduliis, quibus delectabatur, nempe piscibus, ructus acidus emittebat: quod signum erat frigidae intemperiei ipsius ventriculi. Deinde cū ex liene (nam subinde in hypochondrio leuem obstructionem seu dolorem sentiebat) melancholicus humor ad ventrem effunderetur, cibum magis corrumperebat; quod non solum ructus acidi, sed ea quæ cum cibo euomerentur, subinde aciditatē habebant. Quamobrem huic, cū nauseabundus esset, per vomitum prius cibum corruptum, deinde per ventrem educere decreui. Post cibum assumptum dedi decoctionis betæ, atriplicis, ficuum ℥ iij. sy. acetosi simplicis ℥ j. oxymelitis ℥ β. prius inuncto ventriculo.

culo, vt paulo laxior eſſet, cum oleo amygd. dul.,
 vt melius euomeret: facile enim vomebat. Poſtea
 dedi decoctum betonicae, menthae, abſinthij,
 hyſſopi; adiecto ſyr. acetoso ſimplici & compoſi-
 to: & commodè cum purgaui cum pilulis de hie-
 ra cum agarico, & pilul. aromaticis, maſtichinis
 añ ʒ j. cum ſyr. menthaceo; conficiendo pilulas
 ſeptem. Lienem inungebam cum oleo de cappa-
 ribus. & ventriculum quoq. corroborabam cum
 ſpeciebus diagalangæ, & aromatico roſato; exte-
 riùs inungendo cum oleo menthaceo, abſinthij,
 & maceris; adiecta pauca cera: ſuperimpoſito
 deinde emplaſtro ſeu cerato maſtichino.

S C H O L I A.

DI X I M V S diſteſtionis corruptione fieri, cum
 in ſtomacho cibus boni ſucci corrumpitur, aut
 aduritur, aut acore, vel tetro ſapore vitatur, quoniam ex-
 inde natura refugit. Cibi verò qualitatem acidam fa-
 ciunt piſces, caroq; gelu coacta: vti & qualitatem fu-
 moſam, mel, raphanus, allia, naſturtium, ſinapi, & ſi-
 milia; & oua fricta facile in ſumum mutantur. ſape
 verò in conualeſcentibus, materia acetat & recidiuam
 minatur, reliquis putreſcētibus: quod in acutis febris
 malè pronunciat ex caloris defectu; at in longis morbis
 diuturnitatem morbi præſagit. Contingit aliquando,
 imò ſapiùs, & ventriculi debilitatem & malam conco-
 ctionem ſue ciborum corruptionem relinqui in conua-
 leſcentibus, morbo acuto ſeu longo ſuperato; aliquando
 quidem tantam, vt neque aſſumat alimentum, aut
 aſſumptum nō elaboret; eſt q; indicium reliquias mor-
 bi relictas in cauſa eſſe, quod ſuctionis ſenſum non per-
 cipiat.

cipiat: aliàs autem quoque accidit vt suctionis sensum percipiat quidem, quæ à membris extenuatis ipsius corporis fit, eaq; ratione alimentum expetit; elaborare tamen assumptum non potest, ob debilitatem relictam. At in sanis hac eadem contingunt ob nudam intemperiem, vt diximus, vel cū materia: sicuti enim acescunt ructus ex causa frigida, vt diximus; ita & fumosi superfluitates sine cibi vitio, ex calore malum oriri significat. Egineta ex calida habitudine frigidam curam omphacij succo dari suadet, aut cytoniorum malorum decoctum. sed de his, vti etiam de bile, si cibos corrumpat, illa ipsa aut vomitu deicienda, aut leuiter per aluum expurganda, denuò roborato ventriculo, vt iam sæpius dictum est: quibus adiungere poteris ea quæ nos de imbecillitate ventriculi prius diximus, & quæ a longum referuntur apud Benedictum Veronensem lib. 13. cap. 1. & 2. 3. de imbecillitate stomachi eiusque notis & curat. & quæ idem de agrè concoquentibus & vitiata concoctione agit in eodem libro. interea diligenter cauendum ne frigidissima etiam in bile aut ex temperie calida stomacho affecto applicentur; cuius vide exemplum apud Beniuenum de abditis morborum causis cap. 15. de quodam cui ex incuria medicamentum frigidissimum stomacho appositum fuit morte subsequente; & cap. 16. de quodā interempto ex frigidissimo aqua potu: de quibus aliàs diximus, tū alio quoque, & lib. 1. obs. nostrarū de feb. scholio obser. 1.

OBSERVATIO XXXVIII.

De stomachi resolutione.

Vis aliquando in stomacho attrahendi vel ex toto corrumpitur vel læditur: aut enit

(vt Galenus docet) nil attrahit, aut ægrè aut parum trahit, ita vt ex toto auferatur aut diminuat, aut omnino corrumpatur. id vitium aliqui resolutionem vocauerunt, quod œsophago (vt aliàs diximus) plurimùm euenit: morituri enim aut omnino defecti viribus, nihil deuorant, aut difficulter assumunt. Idem & in perniciosis febribus vel ipsa instante crisi, extraria & præternaturali frigidityte vel humida addita resolvente, aut calida & sicca rarefaciente, vt in acutis contingit febribus, in quibus sine alio faucium vel gutturis vitio neque cibus neque potus ab œsophago canalicula apprehendi potest. Mirum est (inquit Benedictus Veronensis) nec tamen ab re, quòd cibum nonnumquam cathelctica vi dicta ita resoluta, capiunt; potum autem nequeunt. Hoc quidem malo, ex imbecillitate stomachi laboranti cuidam spica & nuce muscata, adiecta exigua mastiche, cum paucò vino rubro sumptis, rectè occurrebamus: nam calidis & siccis vis attrahendi conseruatur; caryophyllo, cinamomo, cymino & iis similibus iuuatur: sicuti in ardenti febre succo cucumeris aut cucurbitæ decocto. Refert Beniuenius se nobilè quendā, Iohannem nomine, Neapolitanum (cap. 66.) hoc vitio diu affectum, cùm à medicis aliis curari non posset, curasse (cùm ex calidiore habitu ventriculi vitium contractum certis indiciis intellexisset) iis, quæ aridum ac iam tæbe consumptum corpus desiderat. Primo die solas lactucas ex aceto & oleo commanducare præcepit; veruecinam carnem potiùs quàm auem exhibendo, & vinum

N 2 frigidum

frigidum & austerum: ac genere victus frigido
ac frigidioribus medicamentis vtens, intra duos
menses agrum restituit.

SCHOLIA.

PESSIMUM vitium est resolutio stomachi à La-
tine dicta, cum cibi non tenax est; quo corpus (vt
Celsus tradit) non alitur, sed tabe consumitur. Sed qui
hoc vitio, seu imbecillitate ventriculi, laborant, stoma-
chici quoque appellantur: quamuis & illos quoq. qui
nec cibum continent nec desiderant, aliqui & dissolu-
tos inuálidos vocauere: vel textura rariore affecti, im-
becilliterq. attrahentes, vel parum appetentes, stoma-
chi inuálidi etiam dicuntur. quamuis etiam vulgus eos
quoque stomachicos vocant, qui appetentiam perdid-
erunt; vel quibus post cibum ventris os grauatur; & qui-
bus nausea contingit, & ad vomitum impelluntur, ci-
biq. corrupti sunt, & nidorosi vel vitiiati: & eos quibus
ructus molestiam parit, vel cibi vix descendunt. quo-
rum tamen curationes (vt iam ostendimus) pro va-
rietate causarum tum affectus perficiuntur. De imbe-
cillitate stomachi vide Benedictum Veronensem lib. 13.
cap. 3. habes ibidem diuersas curationes, tam ex frigida
& humida causa: & quæ studiosis victus ratio conue-
niat; cum ferè omnes, vti religiosi & togatorum ferè
magna pars, stomacho sint infirmiores, cum plurimum
sine corporis exercitatione viuant. At de resolutione
agit cap. 9. & 10. vbi quadam selectiora remedia bre-
uiter quidem enumerat. Si retentrix vis sit laesa, vel
quia stomachus nihil retinet, aut parum comprehendit,
nec concoctionem aut digestionem opportunam expe-
ctat; aut si pertinacius quàm opus sit retinet, vel dige-
sto

De potentia
retentrice
laesa.

sto etiam cibo retinet tamen interdum, sed tremulo ut dictum est, modo, vel spasmoso, siue singultu. Sic in lienteria cibum non continetur. Summa, retentrix corroboratur stipticis frigidis. At vis expultrix lasa vel ex toto sublata, inertem in ventre cibum derelinquit; sicuti in ileo morbo: aut debilitatur & lassescit; ita ut serius irritata cibum expellit, vel partem duntaxat, aut modum exuperat irritata virtus, aut corrumpitur; unde ructus, vomitus, fluxus. Expellendi vi concitata, cibum non diu patitur concoctum, & prauum humorem expellit, & cibum indigestum emittit. nimio enim frigore vel humore laxatur, combibito inter tunicarum stamina, ut dictum est. In causa est & membri leuitas, humoris mordacitas, leuitas grauitasue, vlcus, abscessus, aut flauæ bilis inopia, vel si pyloron nihil recipiat: & arida sine potu & stiptica. Expultricem corrumpirarum est; rariusq; euenit, ut ex toto cibum expellatur, præterquam in vomitu symptomatice: at si expulsua infirmior, digestionem corrumpit; vehementior vero, ut in lienteria, inconcoctionem affert: remedia de lienteria dicemus. sed si nihil expellat, ob frigiditatem, laxantia quadam vmbilico imponunt, ex succo cyclaminis, cucumeris erratici, colocynth. cum felle vaccino, & aliis. Ex caliditate & siccitate, ex herba mercurialis succo, & ebuli rad. cum oleo viol. & cucurbitino, & similibus, diacrydio adiectis. In communi expultrix potentia ex calido & sicco laeditur; frigidis & humidis succurritur. Interea sciendum, quod non omnibus eodem modo cibum in ventre moram trahit; quidam quoties assumunt in die, toties ventrem exonerant; alij semel, alij sæpius, quidam alternis diebus; nonnulli quarto aut octauo quoque die. In stomacho plurimum à sex

De expultri-
cc.De mora ci-
bi in ventre.

horis ad 12. vsque, aut quintam vsque decimam moram trahit, pro stomachi, ac aëris qualitate, & modo, proq³ corporis exercitatione. Causa varia ex cerebri affectu, laesa animali potentia, aut studiorum occupationibus, aut retentrice vi validiore, vel imbecillitate expultricis, aut ventris exterioris musculorum infirmitate, vel si bilis in imum ventrem non effusa fuerit: plurimum facit ea de qua dictum est leniens, aut nimia crenarum asperitas: obest & spiritus intus inclusus, abscessus, vermes intestinorum, ac varia membrorum oppilatio. huc spectant stiptica commanducata ante cibum, retardantis digestionem. Quae autem duriores aluum emolliant, iuuant ad expulsionem; ut caro pinguis pulli, ouum sorbile, adiecto zacharo, emollit; ius pingue, lac recens, ius gallinacei veteris, aut gallinae, ventrem cathartici modo turbat; pruna, cerassa, mora, fici recentes, aridae, prae pingues, & carica, vua matura alba, & passula. ex oleribus beta, atriplex, spinachium, blitum, mercurialis, brassica semicocta: vel efficacius, si nudis pedibus aestate pavimento aqua aspersa ambulauerit; duram enim aluum emollit, nec alio auxilio quandoque laeuatur; lapulus quoque iuuat. Frequentius in prandio bibere aluum liquidum reddit: pruna Damascena matura, & dulcia Hispanica leniunt ventrem: ex prunis compositio simplex & cassia, & syr. viol. butyrum verò recens, aut adeps gallinaceus aut anserinus, cum psyllij decocto lentore, vel alibaea, illinitur ventri; asperitatem enim stomachi emolliunt. At si bilis flaua interclusa fuerit, aperientibus opus est, ut postea de ictericis dicetur, in intestini oppilatione, quae iliaco profunt damus. In summa, calida & humida in communi expultricem vim corroborant; sicuti per interualla

Ventrem
mouentia.

Expultricem
vini corro-
borantia.

terualla acuta & amara salsaq³ excitant in prima mensa, propterea caparum & sinapis vsus, piperq³ longum quandoque assumptum prodest. Cibus verò ex stomacho citius defluit, ex nimia neruorum cerebri ad ventrem pertinentium debilitate; sed rarius: frequentius verò retentrice infirma, aut nimium valida vi expultrice, & humida quādoq³ stomachi habitudine immateriali, vel cum humore salso, acuto vel acetoso aut lubrico, aut vlcere innato, ab exiguo naturali calore propè extincto, cibus protinus, Galeno teste, profluit. Hic victus ratio priori morbo dissimilis esse debet. Prodest animi securitas & quies: cubiculo calido ac Curatio. siccō, temperantie proximo, vti debet, somnoq³ longiore; a cana verò statim procumbendum est, in sinistrum ferè semper latus: ante cibum fricari supremæ partes conuenit. Panis ex similagine conficiendus est; parumque fermentari debet, exiguo sale addito vel nullo: mastichis pollinem ingerito, ac coriandrū præparatum. Pro plebe sorba arida tunsa misceri iuuat. In obsoniis auicula, turtures, phasiani, perdices, turdi, lepores & similia, assa præsertim. Vinum rubrum astringens bibendum, aqua ferrata temperatum. In prima mensa, quæ leuiter adstringunt offerimus frigidiuscula, si calida causa fuerit; aut contrà si frigida, stomachus oleo lentiscino, mastichino illinendus.

Quibus cibis citius quam oportet est stomacho defluat.

OBSERVATIO XXXIX.

De ventriculi inflatione, cum ingenti dolore.

INFLATUR aliquando venter, crasso intus incluso vento, ex damnatis cibis; qualia sunt legumina omnia, & dulcia, vna recens, ficus, poma,

ma, mustum, allium, cæpe, eruca, brassica, bulbi, lac, omnisque caseus; aut si cibus, qui faciliter concoquitur, secūda apponatur mensa, aut venus crudo stomacho frequens: vel summatim, si infirmus fuerit calor cum crassis & crudis humoribus, vel melancholicis, vt in hypochondriaco affectu. Sic pictor quidam Alcmarianus, familiaris noster, cū in autumnō flatulentis cibus vteretur, & subinde mustum bibisset, annos 28. natus, stomachum quoque debilem habens, incidit in ventriculi dolorem intolerabilem, cum eiusdem inflatione etiā exteriū apparente; quæ & tactu sentiebatur. Ad hunc accitus, cū medicamentosas potiones omnes quæ in officina pharmacopœi parantur, respueret, nec vllas admitteret, imperaui vt chamomillam communem & Romanam concisam, adiecto momento seminis anisi & cari, decoqueret in ceruisia communi: quam cū bibisset, flatū per superna & ventris crepitum emisit; & illico leuamen sensit, præcipuè ventositatibus vnā cum ructibus superius emissis. Sed cū dolor nonnihil adhuc perseueraret, certis tandem rationibus persuasus, pilulas v i i. ex 3. j. pilul. hieræ simplicis Galeni, deuorauit. quibus ter aluum deposuit; & ventriculo mox inuncto oleo chamæmelino, anethino, rutaceo simul mixtis, tumor atque inflatio ventriculi cessarunt. intereā tamen iubebam vt ad magnitudinem fabæ maiusculæ omni manē ex hac mixtura sumeret: & pul. seminis dauci, petros. añ 3 j. seminis anisi ʒ ij. β. conseruæ buglossæ 3 j. conser. florum rorismar. 3 β. specier. diaga-
langæ

langæ 3j. sy. de corticibus citri parū, fiat mixtura. etiam lumbat diagalangam in tabulis, duabus horis ante cibum 3ij. vel iij. Quibus præfidiis hic sanitati probè restitutus fuit. Huic tamen lactis vsum interdixi, quo maximè delectabatur; minimè enim iis convenit, teste Hippocrate, quibus præcordia plurimùm prætenduntur; magis si sonant intestina, ex multa intus materia.

S C H O L I A.

ACCIDIT quandoq; (vt etiam Donatus recensuit) ipsi ventriculo, vt instrumento coctionis, retentrice, seu complectenti ipsius facultate imbecilla existente, affectus quidam, qui à Græcis, præsertim à Paulo cap. 38. lib. 3. & à Galeno 3. de caus. symptom. πνευμάτωσι γαστρός dicitur; quamuis quandoque ab eodem Gal. (vt patet 14. meth. med.) ἐμφύσημα nuncupetur; à Latinis autē inflatio ventriculi appellatur: quæ affectus nihil aliud est, quàm eiusdem ventriculi distensio & dolor, ex flatuoso spiritu: Flatusus enim spiritus in eo gignitur, aut per os excernitur, & sic ructum creat; aut per sedem. In ea autem venter seu ventriculus vt coctionis officina afficitur. At affectus à Gal. 14. meth. med. inter morbos reponitur in quantitate seu magnitudine. Differt tamen ab œdemate, quoniam œdema prementibus nobis cedit, digitiq; admodum altè in ipsum descendunt: inflatio verò digitis pressa, vestigium non retinet, ac sonitum veluti tympanum reddit, ex eodem Gal. 14. meth. Grauitas quandoque & distensio non solum circa ventrem ipsum, sed iuxta totum pectus: aliquādo verò retrò, iuxta collum, ac deorsum, & ad ipsa vertibula irruit; sæpe autem

πνευμάτωσι.
ἐμφύσημα.

Quæ pars
affecta.
Affectus quis
præter naturam.

Signa.

N 5 vtrunque

utrimque occupatos tenet: aliquando & tumorem circa os ventris efficit; ructusq; inanes fiunt, modicè alluantes; & inhibiti flatuum, qui per aluum excerni consueuerunt. Quibusdam eorum dolores accidunt, ac appetitus perditiones, ac capitis dolor, ut patet ex Aëtio, Archigenis auctoritate, cap. 27. lib. 9. Si verò ante perfectam restitutionem cibum accipiant, amplius membra ipsa inflantur, & cum dolore distenduntur: leuantur autem alimento infernè subeunte, & flatibus siue per ructus, siue per intestina exclusis, ut idem Aëtius inquit. Vbi verò flatuosus spiritus per intestina mouetur, multiformes edit sonitus; quorum non omnes nomina sunt sortiti: verum prudenti viro ex diuersis sonitus differentius, quale quantumq; excrementum sit, ac quo maximè loco voluatur, patere potest; ut eodem 3. de caus. sympt. apud Gal. legitur. Quomodo

Flatuosi spiritus vel flatus generatio.

Causa.

Causarum diuersarum notitia.

spiritus flatuosus vel flatus ipse generetur, iam ex parte diximus scholio obs. 22. huius libri. Breuiter, cum inflatio ventriculi fiat à multis flatibus, qui solent fieri à debili calore, tanquam à causa efficiente; ab alimentis flatulentis & humidis, vel à pituitosis succis; alij volunt fieri spiritum flatuosum à mediocri calore: vel (ut alij volunt) ex humoribus, vel cibis languida caliditate in vapores dissolutis, in ventriculo generatur, iuxta Paulum & Aëtium: nam refrigeratio, (inquit Paulus) hoc nomine quòd extenuare ac dissoluere non sit idonea, nullos flatus procreat. Vehemens caliditas cum nò tantum extenuet, sed etiam discutiat, flatus generationem impedit: minor verò caliditas, diffundit quidem & transmutat alimentum, verum minùs quàm opus sit; unde flatus excitantur. Verum si ex flatuosis cibis inflatio oriatur, ex exiguo, & breuis temporis spiritu flatuoso

tuoso orto, qui vno vel altero ructu vacuatur, comprehendi poterit. At si ex eisdem cibis natura si quidem non flatuosis, sed in vapores per mediocrem caliditatem resolutis inflatio fiat, ab assumptione eorundem, paulo post tempore, inflatio generabitur; & proinde ex laborantium, seu astantium sermone id promptè percipies. Verùm si neque assumptio ciborum præcesserit natura flatuorum; pituitosos humores in ventriculo contentos ac in halitum solutos, inflationis causam existimabis. Nam si ex atra bilis in eundem ventriculum effusione flatus quidam generetur, quam affectionem hypochondriacam, ac flatuosam nominant, præter reliqua peculiariter metus & mœstitia aderunt; quemadmodum de melancholia cap. proprio diximus. Sed exempla infra scripta hæc melius docebunt.

OBSERVATIO XL.

*De ventriculi inflatione, cum dolore,
ex succis pituitosis.*

VENTRICULI dolor (vt aliàs diximus) à flatibus in ipso generatis plerumque fit, aut ex pituitosis humoribus in eo contentis, aut ex cibis in vapores ab imbecillo calore resolutis. Atque hæc ipsa ventositas rarò sine ventriculi dolore est. Hoc malum in me ipso expertus sum anno 1556. mense Iunio, cùm imbecillo stomacho laborarem, tormina ventriculi vnà cum ventositate sentiens, ingentem stomachi dolorem passus sum. Cùm itaque cibos flatulentos non sumpsissem, ex pituitosis excrementis dolorem & flatum ortum coniiciebam. Ergo vt huic symptomati

ptomati occurrerem, omnium primò causam auferre decreui; nempe medicamentis pituitam deficientibus, leuiter laxantibus; intemperiemq. auferendo, vt & calor naturalis diminutus augeatur. Ideò optimum duxi pilulas sequentes sumere, quæ vtrumque faciunt, scilicet leuiter purgant & calorem ventriculo suppeditant: & pilul. communium, seu pestilentialium, aut Ruffi, \mathfrak{D} ij. pilul. de hiera, \mathfrak{D} j. cum aqua fœniculi; fiant pilulæ v. quas manè hora nona deuoravi: & cùm tardæ operationis essent, manè sequenti quatuor prius secessus habui, valde copiosos & pituitosos & corruptos, cum emissionē ventositatum: quibus tormina, dolor atque rugitus & flatus magna ex parte cessarunt. Sumsi quoque decoctum florum chamomill. seu cumini & anisi in ceruisia communi: quibus ventositates expulsæ sunt, & à dolore sui liberatus. alioqui si non cessasset, omnino post pilulas illas leues, ex hiera vel aromaticas (quæ idem præstant) pituitam coquendo accepissem; & vnà ventriculum roborassem cum syr. de mentha, de conseruatione ex corticibus citri, cum decocto menthæ, hyssopi, betonicæ, absinthij, florum anthos, & similibus. deinde rursus reiteratis pilulis, demū accepissem attenuantia calida, flatusque discutientia, vt decoctum cymini vel fœseli, cum mētha vel hyssopo in vino decoctis. quibus etiam in rusticis felicissimè vsus sum. Sic anno 1565. hortulanum curaui, cui ventriculus ex ventositate prominebat, ita vt ferè abscessum metuerem. cui cùm medicamenta flatus discutientia propinassem, adiectis quibusdam amaris

amaris & detergentibus præfidiis, idem per vomitum & secessum post multos ructus, vermes plurimos reiecit, ventriculo mox subsidente. His hortulanus iste, dū maximo ventriculi dolore & distensione torqueretur, egregiè conualuit.

S C H O L I A.

HIC affectus minimè contemnendus est: nam in- Signa prognostica.
 flatio ventriculi, vbi diu perseverauerit, metus
 erit ne in hydropem siccam præcipuè terminetur: & si
 multiplicetur ventriculi inflatio in conualescentibus,
 recidivam significabit. Namque qui à morbis immodi-
 cè se satiant, flatuosi, ac toto corporis habitu turgidi
 redduntur, vt 3. de caus. sympt. Gal. nos docuit. Quid
 verò qui morbo regio laborant non multum ventosi
 sunt, ab Hipp. 72. 5. lib. scriptum est. Indicatio verò
 curationis (vt & Altimarus ex 14. metho. medendi Curatio.
 annotavit) inflationum omnium cōmunis est, vt quod
 præter naturam est vacuetur, in quocumque id conti-
 neatur loco. propria verò indicatio post hanc commu-
 nem est, vt tenuissimis & calidis potestate medicamen-
 tis id perficiatur; vt aëre calido, somno longiore. qui ex
 toto affectus leuat, teste Paulo, & mirificè coctionem
 iuuat, vt habetur 12. meth. med. Et primò exercitatio
 levis, deinde maior adhibenda, maximeq; ea, qua supe-
 riores partes moueat, quod genus (vt Celsus refert
 cap. 5. lib. 4.) in omnibus stomachi vitiis aptissimum est.
 Frictiones item extremarum corporis partium si adhi-
 beantur, conferunt. Aluus omnino sit levis, & vbi ad-
 stricta, statim clyster infundendus, vt Aërius iubet. In-
 terponenda quoque abstinentia, iuxta Celsum: præci-
 puè verò, teste Aërio, vbi ex dissolutis in vaporem cibus
 orta

Medicamen-
torum ratio.

Curatio à
flatulentis
cibis.

orta fuerit inflatio. At si eam ferre non possint, cibi exhibendi sunt calidi, attenuantes, minimeq; inflantes; boni succi & coctu faciles, quantitate exigui. Diuidantur autem ex mente eiusdem Aëtij, ita vt in prandio tertiam, in cœna verò reliquas duas accipiant partes. Fructuum verò ac olerum humidorum esum semper habeant suspectum. Potus cibum non interpellet. Per omnem tamen cibum vinum meracius exhibeatur, aut non multum. Nam multum potum, tamquam infestissimum hostem, deuenient, vt Aëtius admonet: & si non ita diu ante cibum sumpserit, aut cibus fuerit natura flatuosus præassumptus, primum vomere præcipitur cum iis quæ iam sape commemorauimus. post verò vomitum, eos fouere oportet, ex oleo, quod tenuiam si partium, quodq; rutam habeat incoctam, aut aliquot calidorum seminum, vt cumini, apij, petros. ex Gal. 14. meth. Interea prosunt calida & sicca fomenta, ex milio & furfure, præsertim si dolor sit mediocris; vel ex sem. lini, ordeacea, & loliacea farina, cumino & sem. anethi, aut apij, aut fœniculi, oleo rutaceo, aut hydro-melite, cataplasma conficiatur, modo adiecto oleo laurino vel centaurij coma, aut eryngij semine, vel lauribaccis, & melanthio. Cucurbitula cum multa flamma admota, bona magnitudinis, umbilicum vndique comprehendentes, egregiè iuuant incantamenti instar, teste Paulo & Galeno, 14. meth. med. & 12. Glandes etiam supponenda, ex sem. rutæ cumino & melle confecta, sale addito. Et clysteres ex decoct. folior. rutæ, flor. chamameli, puleg. calamintha, furfure, adiectis seminibus fœniculi, dauci, & cumini, & caricis: & in lib. 1. adiciendo olei anethini, chamamel., rutacei añ ʒj. diaphœnici, diacatholici, benedict. laxat. añ ʒß. sale addito.

fian

fiat clyster. His addere poteris quæ apud Celsum, Aëtium, Paulum scripta sunt: ut est castorei quoq; 3j. cum aceto scillino, iuxta Aëtium sumpta. At si ex pituitosis humoribus in halitum solutis contigerit stomachi inflatio, succi prius digesti euacuentur. euacuabuntur autem vomitu, si agri in illū proni sunt; sin minus & per inferiorem ventrem, per clysteres paulo acriores, teste Galeno; vel per purgans aliquod. Galenus & hic, ubi dolor vrget, ex spiritu flatuoso genito ex prædictis humoribus ante purgationem cucurbitulam adhibet, cum multa flamma copiosa: deinde humorem euacuat, ut videre licet 12. meth. med. Humore iam repurgato, eadem topica quæ iam dicta sunt & ab aliis auctoribus descripta, conueniunt, ut emplastrum de baccis lauri, supra totum ventrem & supra stomachum, emplastr. stomachicum Galeni; & intus exhibenda potio absinthij, hyssopi aut ruta. Paulus dat ouillum talū vstum: confert & diacinamomum, diacyminum, dianisum, diaxyloaloes, diacalamentha aut diatrion pipereon, cum exiguo vino diluto. Nunc aliud exemplū addamus.

Curatio 2
pituitosis hu-
moribus in
halitum so-
lutis.

OBSERVATIO XLI.

De stomachi & hypochondriorum inflatione,
ex humore melancholico.

ANNO 1588. mense Februario Serenissimus Elector & Episcopus Colonienfis, qui hoc tempore in castello Honselredyckio dicto agebat, incidit in ventriculi inflationem ac hypochondriorum, non sine magno dolore; ita ut me accersiri iuberet. sentiebat etiam tensionem quandam in hypochondrio sinistro, ex lienis in-
flatione

flatione & obstructione, ob melancholiam; quam procul dubio ex variis suis aduersitatibus contraxerat. Hypochondria ac ventrem cum tangerem valde distenta erant: iniecto clystere carminante ventositatem, prima vice parum profecit: tandem cum & dolor vrgeret & totum ferè ventrem occuparet; & vrina aliquantulum tincta esset (credo ob dolorem) cumq. ructus subinde exeriretur, sed difficulter exeuntes; & nihil per ventrem neque flatum emitteret, clysterem partim emollientem (eo quòd alius durior esset) partim dolorem sedantem & partim ventositatem expellentem, in hunc modum præscripsi; cum & circa lumbos se dolere diceret, etiam calculo sæpius obnoxius; & rad. althææ mundatæ ℥ j. foliot. biancæ vrsinæ, parietariæ, maluæ, mercurialis, florum chamomill., meliloti, summitatum anethi añ m. j. seminis anisi, fœniculi, cari añ ℥ j. β. rutæ in. β. sem. lini ℥ ij. coquantur in aqua cōmuni pro lib. i. col*. adde cassiæ pro clysteribus ℥ j. diacatholici ℥ β. benedictæ laxat. ℥ ij. olei chamæmel., anethini añ ℥ j. olei rutacei, amygd. dulc. añ ℥ β. vitellum vnius oui, salis ℥ j. β. mis. fiat clyster: eoque diutius detento, ter aluum exereuit; flatibus quoque multis tam per superna quàm inferna emissis. Venter postea etiam repurgauimus, cum sequenti potione (prius etiam carminante potione ebibita) quæ ita habebat: & sy. ex infus. ros. pallid. cum foliis senæ ℥ j. β. diaphœnici ℥ ij. aquæ decoct. flor. chamomill. ℥ iij. misce, stomachū inunximus deinde cum oleo rutaceo, mastichino, & maceris. Postea & hoc vng. & olei masti-

mastichini, coton. maceris añ ʒ iij. cerati stomati-
 tici Gal. ʒ ij. olei garyophyll. gutt. iij. ceræ q. s. fiat
 vnguentum. Interea & hac cōfectione utebatur:
 & specier. aromatici ros. diacalaminthæ, diarod.
 abb., diacumini añ ʒ β. dissolut. in aqua absinth.,
 adiect. zach. albiss. ʒ iij. fiat confectio in rotulis;
 ponderantibus ʒ iij. vel ʒ β. Egregiè hæc iuua-
 bant. alioqui addidissem aliquot guttas olei ani-
 si, in dicta confectioe; quibus vri soleo: etiam
oleo ipso cum modico vino per os sumpto, com-
modè vtor ad ventositates expellendas, etiam in
 colico dolore. Hypochondrium sinistrum inun-
 gebam linimento sequenti; & olei de cappari-
 bus, olei rutacei añ ʒ β. olei amygd. amar. em-
 plastri de meliloto & (quia levis durities aderat)
 emplastri de muccil. añ ʒ ij. olei garyophyll. (ob
 meliorem odorem) guttas tres, ammoniaci dis-
 soluti in aceto ʒ ij. ceræ q. s. fiat vnguentum.
 Interea quoque imperavi vt Excellentia sua ab-
 stineret à multo potu, & à multis iusculis, legu-
 minibus, & oleribus, minusque dulcibus; quia
 talia flatus gignunt. His autem malum cessauit:
 alioqui diatrion pipereō dedissem aut theriacam.

*En fituluz
Batavicus*

S C H O L I A.

HÆC ventriculi inflatio, ob melancholicum hu-
 mor em in ventriculum infusum, pertinebat ad
 hypochondriacam affectionem, quam aliàs flatuosam
 appellauimus: quod etiam ex signis cognouimus, cum
 inæstitia adiuncta esset. Caterum cum de huius cura-
 tione prius dixerimus, hic nihil addendum; nisi quòd
 wateriam melancholicam flatulentam digerere debeat-
 mus

mus cum oxymelite & decoct. ceterach, scolopend. rai
capp. thamaris. & anisi, etiam mentha, melissophylla
chamapit. thymi & similibus. Quidam hic laudant pro
purgatione hieram Ruffi, cum exiguo mastichis. Deinceps
etiam in tumore melancholico fotum commendari
per spongas, ex aceto, cumino & ammi trito. potius
fomentis vtuntur quàm vnguentis, ne cera meatus ob
struat; idè irinum & rutaceum oleum quidam
nardium cum castoreo ventriculo admovent.

OBSERVATIO XLII.

De ructu ventriculi cum aliis symptomatis.

Cum inflatur aut distenditur stomachus, vari
pores malos & indigestos, Galeno ita tra
dente, per os eructat, & acidum interdum aut
grauolentem ructum emittit, quibus emissis alia
quando grauis dolor statim consopitur. quod
uxori cuiusdam calcearij Delphis euenit. Hæc
equidem non solum circa lumbos & renem
dextrum vehementer dolebat, grauida duorum
mensium, verum etiam dolor ille totum ventri
culum & os eius occupabat, & tanta vehementia
stomachum & diaphragma comprimebat, vt præ
angustia vix anhelitum trahere posset, & spiritum
è pectore educere. Existimabat autem se pleuriti
de laborare; cuius causa me vocabat, vt certe
sciret quo morbo laboraret, & simul à dolor
subleuari posset. Cum autem hæc me præsentem
plurimos ructus emitteret, quibus nonnihil vide
batur subleuari, mox tamè dolore redeunte; idè
cum potionem sequentem ebibisset, ac multo
ructu

ructus tum ventositates per superna, flatusque & ventris crepitus demississet, atque locum dolentem linimento infrascripto vnxissemus, panno calido deinde admoto, miraculi instar omnia symptomata dicta cessarunt; non obstante, quòd metus esset de abortu, ob nimium dolorem & angustiam: R. sem. anisi, fœniculi, anethi añ ʒ j. β. glycyrrh. raf. ʒ β. vuar. passul. enucleat. ʒ β. malua, ob dolorem renum, m. β. bulliant in aqua communi q. s. & huius express. accipe ʒ iij. addendo sy. ex infus. ros. commu. sy. de cichor. Nicoli añ ʒ β. misce: R. olei liliacei, anethini, ping. gallinæ añ ʒ β. misce, pannis calidis admotis, præter omnium opinionem absque purgatione aut aliis remediis, tantum ructibus & ventositatibus emissis, cum nocte sequenti sudasset, & deinde bene dormiisset, sanitati restituta fuit.

S C H O L I A.

SOLVS homo inter animantia, vt tradit Aristoteles, flatum ructumq; emittit: quod ex stomachi humiditate contingit: ventres enim aliorum animalium aridiores sunt. Verum, vt Plinius refert inter morum exempla, Pomponius consularis, poëta, nunquam ructauit. Id vitium ex crassioribus fumidisq; vaporibus vi quadam erumpit, ab imo (vt aiunt) stomacho: at enormiter quadam gloria potioribus per ora euoluitur. Censura igitur dignos quidam putarunt, qui ex crapula eructant. At ructus cum plurimum fiat ex indigestione stomachi, aut ex frigore, aut vento; mulieribus sapissimè vulua vitio, sæpe cum ventus includitur, nec efflari per se potest, quæ ructus comouent, damus: qua-

lia sunt anisum, origanum, cyminum & similia. Verùm si multa subest pituita, prius perpurganda esset; alioquin in continuatos verteretur ructus. Sed hinc non opus fuit purgatione, cum tantum ventositates hanc mulierem torquerent. Verùm, ut & antea dictum est, exiguo suo calore inflatur stomachus; copiosiore in ructus prorumpit, cibusque pariter inflantibus, ut de inflatione ventriculi diximus. Sunt & alia quæ effectiue excitant ructum; sicut raphanus, & sinapis: quadam materialiter in ventum & fumidum vaporem conuertuntur; ut ouorum lutea, si frigantur, ac ipsum lac: omniaque cruda magis quam cocta inflant; & stomachi caliditas lac acescere facit. At de ructu acido atque fumoso, & quibus signis si adsit materia frigida, pituitosa vel melancholica, distinguantur, iam antea dictum est. in materia melancholica adest gravitas, lienque subinde dolet & intumescit, & venter cum cibi indigestione, acidoque ructu. A bile ex oris amaritudine stringitur: graeolentesque ructus in pestilentia fiunt, ex corrupto quoque cibo, potu pestifero, ut ex lepore marino, aut interioribus ulceribus aut abscessibus, aut infantibus ex tineis. Aeruginis dirus sapor, compunctionibus, ardoribusque indicatur. Cœnosi ructus, qui cibum non mutatum referunt post horas septem, imbecillitatem concoctionis reddunt. Acidus sapor perdurans hydropem minatur. A vento nullum sapor indicium facit; vel si ex frigore aut frigidis natationibus. Omnium primò, quod ad curationem attinet, causis primitiuis & antecedentibus occurrendum est; deinde iis quæ inflationem stomachi discutiunt. Si ex crasso succo, ut antea dictum, exymelite leuatur; deinde hiera; postea & diatrion pipereo, ex aqua vel vino; in ructu quoque vaporoso & fumido ab-

Curatio.

do absinthium & hiera picra. Reliqua ad ructus dissol-
uendos vide apud Arculanum, & caput proprium Va-
lesci lib. 4. cap. 11. de eructatione; ubi ad longum cause,
signa, prognosis & curatio explicantur. Non tamen
semper acidus ructus ex causa frigida oritur: saepe etiam
ex calida, ut apud Trallianum videre licet. & vide
apud eundem quomodo tales curentur.

OBSERVATIO XLIII.

De muliere cholera morbo correpta.

CHOLERA morbus est acutissimus, sine
febre ferè, quæ vel vno die, vel altero, vel
certè paucis diebus hominem rapit; substantia
corporis effusa, partim assiduis vomitionibus,
partim iisdem deiectionibus; nisi medicum pe-
ritum ac sagacem inuenerit. Sic mulier quædam
Alcmariana, vxor cuiusdam fabri ferrarij, prope
Sancti Spiritus sacellum commorantis, mense
Iulio, ætate vigente anno 1548. cholera morbo
corripì cœpit: cumque & vomitionibus & deie-
ctionibus multa aquosa liquida corrupta & euo-
meret & simul deiiceret, cum tanto impetu, ut
humoribus multis spiritibusque vacuatis vires
conciderent: vnde suborto sudore frigido ac tre-
more cordis, in syncopè lapsa est; adeò ut astan-
tes illam pro deplorata habentes, curationem sa-
cerdotibus reliquissent; cumque munita esset ex-
trema inunctione, tandem de remediis cogita-
runt, atque me ad ægram deduxerunt: mox per
me odoriferis naribus adhibitis, atque digitorum
frictionibus factis, ad se paululù rediit. Sed quia

adhuc valdè nauseabunda apparebat, vomitum ilico nolimus constringere, ob materiæ venenositatem. quare adhibito cyatho vno decoctionis hordei communis, pauco zacharo adiecto, pro medicamento abstersorio & lotorio. à quo cum rursus semel vomuisset, & secessum habuisset, mox hunc syrupum propinauimus: R. sy. cotonei ℥ ij. sy. de ribes ℥ j. sy. de cichor. Nicoli cum rhab. sy. mēthacei añ ℥ β. misce. cepit autem citius cochlearia duo: Postea solum syr. de ribes, menthaceum & cotoneorum dedimus, & zacharum ros. perlatum. Postremo capiebat aliquando pro roboratione & maiori constrictione, diacotoneum sine speciebus. Ventre ac stomacho inuncto oleo mastichino, & cotoneorum, symptomata cessarunt: ita vt istis tantum remediis, pro mortua habita, sanitati fuerit restituta: cui & exiguum panis biscocti in vino rubro stiptico macerati, pauco cinamomo asperso dedimus, aliquando & succum granatorum expressum: & sana euasit.

S C H O L I A.

RHASES, & qui eum sequuntur, statim post syncopen, de cholera morbo agunt; eò quòd saepe syncope tales afficiantur, ob nimiam euacuationem, & ob ventriculi consensum: alij verò de hoc malo, cum plerumque ventris perturbationem, & simul fluxum habeat, scribunt, cum de affectibus intestinorum agunt: verum cum etiam ad ventriculum referatur, de eo quoque malo in hoc libro tractandum esse existimamus.

De nomine. Multi hic de nomine contendunt, & à causa nomen accepisse

accepisse putant, à Gnidiis medicis; quamvis non ex propria sententia, ut Gal. fatetur 2. meth. med. cum $\chi\omicron\lambda\eta\nu$, id est, bilem causam esse arbitrati sunt; vti & Corn. Celsus lib. 4. cap. 11. sentire videtur: cum tamen non solum à bile, sed cibi prauitate & corruptione humorum, fieri soleat. Trallianus potius à materia, quæ cum per ventrem adfertur, ex intestinis videtur excerni, fieri putat: Intestina verò choladas veteres appellabant, ut etiam Homerus testatur his verbis, $\kappa\acute{\epsilon}\chi\upsilon\tau\omicron\ \chi\epsilon\mu\acute{\alpha}\iota\ \chi\omicron\lambda\acute{\alpha}\delta\epsilon\varsigma$, quod est, Fusa erant humi intestina. Cum totus igitur ventriculus ab aliquo, quod morsu ponderève contristetur, vexatur, idq; statim eicere cupiat, superno infernoque ore ad excernendum utens, affectus quidam hic gignitur, qui à Græcis $\chi\omicron\lambda\acute{\epsilon}\rho\alpha$ 3. de caus. sympt., à Latinis similiter cholera dicitur; quamvis Barriari hunc affectum cholericam passionem vocant. Est hæc affectio nihil aliud, iuxta eundem Trallianum, quæ immoderata perturbatio, quæ per aluum & vomitum, propter stomachi subuersionem, ac eiusdem offensionem, provenit. Paulus describit quoque cap. 39. lib. 3. eam esse immodicam ventriculi perturbationem, supra infraq; erumpentem. Et quamquam Celsus hæset num intestina vel stomachus ladantur, cum utrisque commune vitium esse posse putat; iuxta tamen Gal. loco citato, secundum totum hic ventriculus afficitur, ut etiam docet Altimarus. Et ita quoq; symptoma est in genere noxa facultatum naturalium, & propriè expultricis deprauata; quæ propriè cholera dicitur. Nam quandoque citra eiusdem facultatis noxam fit, licet perpetuò aliquem præter naturam affectum consequatur, veluti supra de vomitu dictum est; quamquam eam non propriè choleram nominant, ut si

Quid sit
cholera.

Quæ pars
affecta.

Quis præter
naturam af-
fectus sit
cholera.

Differentia.

fiat propter ciborum qualitatem, Alex. Trall. auctores Hippocrates 4. de rat. vict. in morb. acutis & Gal. in commento, duplicis cholera meminerunt, & arida & humida. In vtraque perturbatio est ventriculi immo-
 dica infra supraque. Differant causa & symptomate: arida enim fit ex spiritu flatuoso acris, qui siue egeratur, siue retineatur, lancinat, & mordicat partes ventris nervosas, venter inflatur, strepitus fit, dolor in lateribus, & lumbis, alius nihil deiecit, sed adstringitur. eiusdem curationem vide loco citato apud Hippoc. Alia est humida, quae gignitur ab alimentis eorumque prauitate, vel à medicamentis, & plerumque à vitiosis humorum copia, vel à bile admodum corrupta, aut à pituita salsa corrupta; de qua nunc agimus. At Neoterici quidam distinguunt species secundum humores qui deiciuntur ac vomitu expelluntur: & sic quedam est aquosa, ex phlegmatis genere: altera biliosa, ut cholerae praesina, aruginosa & similia: vel melancholica corrupta, adustionem participans diuersarum naturarum & colorum. Alij aliter distinguunt; vel quod per se incipiat, aut alios morbos subsequatur, modò critica, vincente natura; modò symptomatice. alia rursus in corpore debilis ventriculi, vel alijs virtutibus debilibus: alia in corpore forti: quadam acuta, habens accidentia grauissima, medico metum incutientia. alia verò non ita acuta. Quae quidem differentiae petuntur ab ipsis symptomatibus; quemadmodum & alia à tempore, quod ea ipsa sit in principio, in augmento sui motus, vel in statu, aut declinatione. Penes materiam, vel quod sit in ventriculo, vel in partibus vicinis aggregata, vel transfluxa; modò nocens quantitate, aut multitudine aut indigestione, alteratione, putrefactione, mordicatione,

tione, cum presentia ciborum acrim, mordicantium
aut alterius humoris: vel ex defluxu à toto, vel à mem-
bro particulari ad ventriculum & intestina. Atque hæc
ipsa modò à causa primitiva sola, modò iuncta cum
materia circa stomachum. Sed hæc ipsæ causis tum
exemplis subsequenter manifestiora evadent.

OBSERVATIO XLIIII.

De cholera ex medicamento assumpto.

Cum excitetur cholera (teste Paulo & Tra-
liano) nō ex vna causa duntaxat, sed etiam
ex multis; ideò causæ illæ prius perscrutandæ;
antequam curationem instituamus. Et quamvis
fiat ex magna alimentorum prauitate, vt ab iis
præcipuè quæ succum crudum, flatuosum vel
acrem procreant, quæque ægrè concoquuntur ac
rardè permeant, vt intestina suilla, sanguine in-
farcta, capis, pipere, pinguedine, quibus nihil
difficilius coquitur; qualia etiam sunt suilla caro,
bubula, caprina, animalium ventres, & caseus, &
quæcunque faciliè putrescentem succum, vel hu-
miditatem acrimoniæ coniunctam habent. Ve-
rùm præter alimenta & vitiosos humores, vt la-
tiùs in scholio subsequente dicemus, etiam me-
dicamenta hunc affectum excitant, quæ sua na-
tura vomitum cient, & petturbationem tam per
superna quàm inferna concitant, vel excrementa
ad ventriculum trahunt, vt veratrum. Sic mu-
lierem noui, quæ cum diu circa præcordia malè
habuisset, empiricus eius cognatus ꝑ ij. rad. elle-
bori albi in taliolas incisi acceperat, & vino per
O 5 noctes

noctes infuderat tres. vinum expressum cum mulier bibisset, in vomitum enormem atq. choleram incidit, ac animi defectum, & anhelitus præfocationem. Ad quam accitus, poculo inspecto ex quo potionem sumpserat, inueni radices ellebori albi in vino infusas. Statim adhibeo decoctum hordei communis in aqua pura, adiecto pauco zaccharo, idque repidè, vt melius euomet: & pro veneni absterfione, mox propinabam ʒ ij. florum nenuph. albi puluerisatorum (hoc enim proprium eius est remedium, teste Guainerio) cum ceruisia, propter calorem; cum venenum, seu veratrum, cum vino sumpisset. quamquam Guainerius dat cum vino, vt & theriacam seu gentianam cum vino. Mox roborato ventriculo exterius cum stipticis emplastris, & rob de ribes per os, tum syr. cotoneorum exhibito, postquam satis euomisset & ventrem deiecisset, hæc tandem curata fuit.

S C H O L I A.

Medicamen-
ta quomodo
choleram
inducant.

MEDICAMENTA acia subinde choleram morbum procreant. Sic Galenus commento aph. i. lib. 5. dicit ex elleboro albo instar cholera perturbationem fieri, & vomitum, & tandem, propter ipsam euacuationem, supra modum ipsis purgatis conuulsio- nem aduenire: sicuti & choleram patientibus, contractiones frequenter adueniunt, & sæpius ac maximè eorum qui sunt in suris musculorum. & tunc conuulsio fit per compatiendi ad os ventriculi societatem. Sub veratro, nempe albo, reliqua pharmaca violenta subintelligenda sunt, quæ ex euphorbio, colocynthide, &

de, & scammonio, ex esula seu lathyride constant: ex quibus non tantum cholera seu perturbatio ventris, sed & convulsio tandem euenit, si huic malo non statim occurratur. Ideo recte dixit Rondeletius: Excitant hunc affectum medicamenta, quæ sua natura cient vomitum, aut ad ventriculum trahunt excrementa, ut veratrum, colocynthis, scamnoneum. *Causæ cholera.* Varia igitur causa ipsius cholera sunt, ut dicere coeperamus. ideo recte dicebat Alexander Trallianus lib. 7. cap. 16. de cholera. At non solum de vna fit causa, sed etiam multis; nempe ob cibum copiosiore assumptum, & quia concoqui non potuerit, corruptum: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, præsertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam sursum aut infra ad excernendum irritantis; nec non ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quadam, aut frigidarum aquarum vsum, si eas bibant, aut in eis diu natauerint. *Alimenta & cibi quomodo facile corrumpantur.* Corrumpuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: nam acrimonia sua fluxiones irritant, & orificia vasorum ventris mordicant, & vomitum atque deiectionem inferunt. Corrumpuntur etiam alimenta; vel quia ad id apta erant: vel quia in maiori quantitate assumpta fuerunt, & non potuerunt concoqui, sed corrupta sunt: vel quia eo ordine non sunt assumpta, quo debebant; ut cucurbita putrefacit facile, si aliis cibis misceatur, sic & pepones & melopepones. Alimenta præterea facillime corrumpuntur in corporibus intemperatis, quæ in temperatis coquantur facile, ut dulcia, aut quæ excitanda cholera apta sunt peculiariter, ut pepones, mala armeniaca, chrysomela (abricots Galli vocant, iuxta Rondeletium) nuces, amygdalæ;

Quomodo
humores
corrumpan-
tur.

Causæ ex-
ternæ.

Causæ in-
ternæ.

amygdalæ; acrida, ut cape, allium. Corrumperuntur etiam bona alimenta, quamuis ordine recto, & quantitate iusta fuerint assumpta, ob intemperiem ventriculi calidam, & ob prauos humores in eo contentos, & maximè bilem. Rursus frequenti crapula corrumperuntur humores, & ex intemperata qualitatis materia; etiam ex aqua, ut paulo antè ex Tralliano diximus, quod & Galenus docuit: ex qua pituita aut flaua bilis aut atra generatur continuato victu; qui etsi protinus morbos non adferunt, tamen coaceruatis intus ex longo usu humoribus, vitia contrahuntur inextricabilia; imò aliter quando tales morbos inferunt, qui in octauum quendamque protrahantur annum. Caterum alij omnes istas causas iam dictas referunt ad duas generales causas; aut materiam, quæ ledit suo acumine aut multitudine: aut teram ad laborem virtutis in expellendo. Interim & remotas causas diuidunt rursus in internas aut externas: externas eas vocant, quæ nauseatiuam satietatem (ut vocant) & ad corruptionem cibi quouis modo inueniunt, ut est aer extremè frigidus coctionem impediens vel debilitans; quantitas cibi nimia, motusque inordinatus post cibum, vigiliæ excedentes, animique affectus maximè tristes, resoluentes & coctionem debilitantes; coitus statim à cibo, cibi que omnes malæ qualitatis, acuti, pungentes, corruptibiles, & ad putredinem parati, ut carnes mortuorum, & quacumque faciliè in venenosam qualitatem vertuntur, ut persicæ iam dictæ indebita præparatio eorundem ciborum, vel eorundem præpostera assumptio, ut iam diximus. Internæ sunt, quæ per essentiam lidunt, aut per communitatem: per essentiam verò, qualibet intemperies simplex vel composita, sine materia, immediatè faciens ad indigestionem

nem & materia corruptionem . cum materia, vt humores in stomacho ladentes . ad quas causas etiam referri poterunt apostemata , abscessus , solutiones continui, etiam vulnera in stomacho existentia, quæ ad causam etiam per essentiam pertinent . Per communitatem verò à toto vel membris particularibus, vt hepate, splene, cerebro, aliisq³, materias malas ad ventriculum seu intestina transmittentibus.

OBSERVATIO XLV.

De cholera ex cibo diuerso & corrupto assumpto, orta.

IVVENIS quidam biliosus, vigente æstate, cum in vna mensa diuersis cibis vsus esset, cæpis atque peponibus, & raphanis, atque pinguibus dulcibusque eduliis, incidit in choleram. Ad quem accitus cum prius cibum corruptum euomeret, & simul per inferiora deiiceret, cum ventriculi maxima angustia & grauedine; atque intellexissem ex eius sermonibus, quæ in prandio sumpsisset, & quòd largiore satis potu vsus esset, atque iam malum adhuc in principio esset, nolimus statim vomitum & alui fluorem cohibere. Nam si quis in principio, aut coaceruatim ea quæ efferuntur cohibere aggreditur, is maioris mali facilè auctor est, teste Aëtio cap. 12. lib. 9. Inutilia enim cum sint (vt ipse inquit) euacuatione opus habent. idè auctores, si hoc malum ex corruptis in ventriculo cibis, siue propter copiam, siue prauam qualitatem, eueniat; aqua tepida exhibita ~~ægrum vomere~~ iubent. nos autem dedimus

dedimus aquam decoct. hordei non excorticati, pauco zacch. admixto. quo satis vomebat, & aluum deliciebat. Alexander Trallianus mulsa vitur, quæ aluum & vomitum sine noxa irritat, eodem auctore. Cùm autem euomisset, astantes plurimùm adhuc metuebant ægro. Attamen in hoc morbo prudentis medici est, terrentia statim non reformidare; quando nulli morbo minori momento succurritur: ac protinus æger, vbi ista cœperunt, aqua tepida vel mulsa vomere cogendus est. Nisi enim quid impedimenti fuerit, celerimè rursus ad naturalem statum reuertuntur: potissimùm si corruptio ob copiam ciborũ fuerit oborta: quamquam & huiusmodi affectum propriè cholera esse non velint. Hic tamen etiam postea per vomitum & aluum quædã muccosa, pituitosa, nidorosa, inter quæ inconcocta quædam & semicruda videbantur, euomuit; ita vt hic affectus ad cholera referri possit. Tunc enim mihi venit in mentem similis ferè casus apud Amatum cent. 2. curat. 31. de Caspare de Robertis, genere nobili, qui cùm vigente ætate in cena radiculis (quibus delectabatur) vesceretur, in cholera lapsus est: qui de ventriculi grauedine, ac in eo erosionibus perceptis quoque conquerabatur. cui & aquam tepidam bibendam dedit: qua etiam multa muccosa, pituitosa, nidorosa & semicruda euomuit. Repetita verò eadem tepida aqua, nihil præter aquam ipsam euomuit, aut deorsum egressit. Quare tunc ventriculum roboraus cerato quodam ventriculo admoto, & intus miuam cydoniorum cum speciebus sumens, & panem

panem biscoctum in vino generoso & astrictio-
nis particepce irroratum dabat: à iuribus abstinens
& rebus duris concoctuque difficilibus. Et ita
nostrum quoque ægrum curauimus. Vomitu &
secessu postea desinente, à somno paulatim cibo
refecimus; & vt cruditatem auerteret imperaui-
mus: tostumque panem cum vino mali punici
commodè dedimus; & ventriculum exterius ro-
borauimus, pullosque gallinaceos cum acore seu
omphacio, piscesque saxatiles cum exiguo & suau-
aromate præbuimus: & mox sanus factus est.

S C H O L I A.

Cum igitur ex variis causis cholera exoriat,ur,
diligenter signa perscrutari oportet, tam ea quæ
hunc affectum præsagiunt atque demonstrant, quàm
quæ causas ipsas distinguunt, & quæ mera prognostica
sunt. nam iis cognitis de curatione cogitandum, quæ
ad vnâquamque huiusmodi causam accommodetur.
Præscientia signa habentur ex vitæ instituto præce-
dente, tum victus ratione, quæ corruptionem ciborum,
Signa præsa-
gientia.
& humorum nimiam repletionem inferre solent, per
motum quoque inordinatum post cibum assumptum:
& ex assumptione corruptibilium rerum; de quibus in
causis abundè dictum est: potissimum si naturalis sto-
machi debilitas adiuncta fuerit, vel innata, vel acciden-
talis, ob causas dissoluentes diminuentesque virtutem.
Sic coitus superfluous ventriculum debilitat, quemad-
modum & febres morbiq; diuturni; quibus si accedat
nauseatiua satietas (vt vocant) cum accidentibus præ-
dictis, immediatè futuram choleram prædicere poteri-
mus, si adsuerit punctio doloris circa ventriculum &
intestina.

Signa demon-
strati-
ua.

intestina. Ita & æstate atque autumnò cum mali hu-
mores generantur, eò quòd fructus crudiores comedun-
tur, si supradicta adfuerint, choleram præfagiemus. At
signa demonstratiua & præsentis indicia, sunt (testis
Aëtio lib 9. cap. 12.) vomitus biliosus, & nidorosus, &
acidus, ad plures horas continuè perseuerans; & venter
infernè eadem excernit, sequiturq; sitis & exsudatio;
impeditur pulsus, musculorumq; manuum ac pedum;
maximè verò surarum, contractio & tensio; & (vt
refert Celsus) non solum bilis supra infrag; erumpit;
sed primum aqua similis, deinde vt in ea recens caro lo-
ta esse videatur, interdum alba, nonnumquam nigra
vel varia. Ex his quasi tempora eiusdem cognoscimus
ex Arculano. incipit enim primò cum lenitate, deinde
statim augetur, cum dolore, & punctione in ventricu-
lo & in intestinis: & quæ sunt minus maligna primò
expelluntur, vt cibi corrupti; deinde humores aquosi
& biliosi & citrini, subflauì, tandem & virides (vt in
nobilissima domicella Heutera, filia Domini Præsidis
Hollandia, conspeximus, quam etiam curauimus) po-
stremò nigri. & in processu perueniunt ad spasmum
seu conuulsionem & singultum; & postremò ad casum
pulsus, sudorem frigidum, syncopen & mortem; & hoc
vsque ad quartum vel septimum diem. Est enim agri-
tudo peracuta; cuius terminus ad salutem aut mortem
à 4. ad 7. At symptomata illa mala, vt est extremorum
frigus, & circa faciem frigidi sudores, & facies terribi-
lis, & pulsus ad prauitatem & inaequalitatem tenden-
tes; & quæ ad hæc succedit syncope, aliquando verò &
conuulsiones: illa quidem ob vacationem & oris ven-
tris laborem: hæc verò vel similiter ex ore ventris, cui
cerebrum & nervosa partes consentiunt (& erit
conuulsio

convulsio per consensum) vel ex siccitate, qua pessima esset & lethalis. Sed hic notandum (vt Iacchimus doctissimus quoque admonet) quod hic casus non fit nisi ex calido & bilioso sacco, cum corruptione aliqua, id est, mala qualitate acquisita. Vult tamen Rhases vt forti animo sumus, & remediis instemus, neque desperemus statim de salute. Attamen pradictione te à culpa seruabis immunem: vt exemplum sequens te docebit. Conuelluntur enim aut sui mordacitate, aut expulserice concitata, vel resoluta retentrice. Verum antequam ad signa prognostica veniamus, prius omnes causa distinguenda. at facile omnes interstingui poterunt: nempe ob alimentorum assumptorum copiam, aut eorundem (ac etiam potionum) prauam qualitatem; qua omnia ex laborantis, seu astantium loquela percipies; veluti etiam si processerit vsus frigidarum aquarum, aut frigidorum medicamentorum ab extra adhibitorum. Verum vbi ex copia bilis, seu aliorum prauorum succorum redundantia, cholera fuerit excitata, ex propriis eorundem humorum signis, ac saepius iam dictis, eos discernes. Sicuti igitur biliosam choleram significabunt initio, ea qua de siti, dolore, punctione, vigiliis & bilis vomitu diximus; ita pituita vitrea praesentiam, in ventre pondus, frigus, & sensuum grauitas, indicabunt: vti & phlegmatica salsa, ex salsedine, sicuti bilis ex amaritudine, vt iam frequenter dictum est, percipietur.

Signa causa-
rum seu spo-
cierum.

OBSERVATIO XLVI.

De cholera lethali ex bilis copia.

PVELLA iuuenicula, biliosa, sitibunda, quamuis certis interuallis natura sese vomitu ac

P

secessu

secessu bilioso exoneraret, tamen ob impetum humoris biliosi erumpentis, salubri humore simul cum bilioso foras expulso, malè subinde habebat. Huiusmodi homines à Græcis *χολεικοί* & *χολειῶντες* dicuntur, Plinio verò biliosi. Ceterum hæc puella, cum ætas esset, & victu calidioris vsa esset, & allii & cæpis, bilem adeò copiosè nunc infrà nunc suprà deiiciens, & rosionem & caliditatem circa ventriculum percipiens, cum præcordiorum dolore intensissimo, extrèmè decubuit. Ad quam priùs tertio die accitus, cum eam vidissem, quæ per aluum & vomitum efferebatur, omnia biliosa esse; agramque vehementer sentire, & linguam scabram habere, non sine febris ardente, choleram ex bile prauissimam esse intellexi, viribus iam omnino collapsis: cumque tribus istis præcedentibus diebus ac noctibus bilem porraceam euomisset, illam in periculo esse pronunciaui; & cum medicamenta parùm proficerent, atque nunc etiam crura manusque contraheret, sitis accendebatur magis, & anima deficiebat: adhibui ea quæ animam refocillarent. sed omnibus illis signis malis concurrentibus, mortem prædixi; nec mirum, cum tales subito moriantur, verùm non priùs quàm nares acuantur & tempora extenuentur, & oculi caui fiant, faciesque decorem amittat, & extrema frigore & sudore corripiantur. Quæ cum animaduertirem & simul ex toto corpore subito ad stomachum & intestina humores confluere, leues quidem superna petentes, & graues ac corruptos ad intestina, cum cōtinuo impetu defluentes, viresque prostermentes.

sternentes; cumque iam sine somno esset, & anima frequenter deficeret, & facies quadam formidine perculsa cerneretur, & nares acutæ essent, & extrema sudore & frigore corriperebantur, & singultus inquietaret, pulsu modò ablato, modò redeunte, mortem de proximo futuram prædiximus, materia virulenta ad intima præcordia confugiente: ita ut in quarto die hæc obierit.

S C H O L I A.

RECTE dixit Alexander Trallianus lib. 7. cap. 16. *Signa pro-*
cholera acutissimum affectum esse; syncopen gnostica.
 insignem, immodicamque virium resolutionem inducentem; atque id omnibus in confesso esse. Idcirco accurate internosci, & celerrimè curari, merito postulat. Etenim dilatio in omnibus acutis morbis nociva est: in hoc autem affectu etiam exigua, ac levis curandi mora, haud simplicem offensam, sed etiam absolutam subinde tabem, quæ phthisis dicitur, conciliat. Hæc Trallianus. Non mirum igitur, quòd in hac puella, cum ad tertium usque diem ne de remediis quidem cogitasset, subitò ita vires conciderint, ut talem faciem incurreret, ab Hippocrate descriptam, qualis tabidis contingit, ac paucis diebus, ut quarto die, viribus exhaustis interiret. Idque Celsus confirmavit: quippe cum hic affectus toto genere periculosus sit: Vbi enim signa prædicta adsunt, ut subita extenuatio, præsertim faciei, & frigus & pulsus mutatio, & syncope ac convulsiones in debili corpore; magis lethalia habentur; si etiam in fine dolor perseueret, & punctio, cum virtutis debilitate, arguunt corporis consumptionem. Attamen non semper desperandum est, iuxta eundem Celsum, cum idem dicat, Neque ta-

men vlli morbo minori momento succurritur; modò (v
 nos quoq; addamus) tempore medicamenta apta adhi-
 beantur. Cholericæ verò istæ affectiones magis in ætate
 fiunt; & febres intermittentes, & quibus errores acci-
 dunt, & quandoque malignæ fiunt, & ad morbos acu-
 tos perueniunt, vt 7. de morb. vulg. Hippoc. scriptum
 reliquit. Autumno etiam frequenter contingit, ob esum
 fructuum, vt diximus; rarò verò in hieme. At si ex pro-
 catarctica causa, id est, quæ recenter impressit, vt cibo-
 rum ratione eueniat; quomodocunque erratum sit, fa-
 ciliior affectus videtur, quàm si ex totius malo. Qua
 verò magnitudinem affectus monstrant, & morem,
 hæc magis aperient, præsertim ad vires comparando.
 Cùm enim affectus toto genere periculosus sit; grauius
 periculum euadit, vbi ea comparuerint. Sunt autē quæ
 superueniunt, & morem significant, ex superflua mo-
 tione symptomata; vt extenuatio subita, tum alia su-
 præ dicta. Vrinæ quãdoque copia. Pueros & adoleſcen-
 tes voraces, plurimum infestat: ~~viris cùm euenit peri-
 culosior est, si lacertosi præsertim fuerint.~~ Assuetis id
 malum minus periculosum est, ex quo aqua euomunt.
 Qui eam frequenter incurrunt, facilius eam tolerant,
 materia non existente tam copiosa aut maligna: qui
 verò rarò, difficulter sanantur, ex causis contrariis; &
 idèd infantes citius curantur. Et quamquam hæc
 puella aliàs hoc malo bis aut ter affecta, facilius cura-
 batur; attamen nunc existente materia maligna, cum
 febre satis ardente, antea stomacho imbecilli existente,
 & nunc viribus deiectis, quarto obiit. Quæ verò origi-
 nem habuerit ex cibi corruptela, aut alia causa primi-
 tiua, modò non sit causa venenosa, & quæ ex materia
 pituitosa & aquosa sit (cùm hæc facilius corrigantur)
 etiam si

etiam si accidentia in principio terrorem incutiant, minus periculosa habetur. Ex opposito, mala est, quae in corpore forti, non consueto aut hieme fiat, & ex multiplici corruptione, non tantum in ventriculo, sed in venis totius & membris in processu virtute deficiente cum ceteris malis symptomatis iam dictis. At ubi restringitur cholera, saepe declinat materia subito ad vias vrinae, & accidit vrinae ardor; & malum (vti diximus) subito leuatur. Est haec passio cholericæ dicta vt plurimum salubris, si debite tractetur, sed non apud tardos, & negligentes (vt Arculanus recte dicebat) neque apud imperitos; celeritate enim indiget. nam mora, vti in hac puella se ipsam negligente, mortem intulit. Quod facile in principio curetur, infra scripta exempla docebunt.

OBSERVATIO XLVII.

*De cholera cum saeuissimis symptomatis
& recte curata.*

MARIA Gerardi, vxor illius magistri Remi Astrij, mathematici insignis ac philosophi Alcmariani, mihi admodum familiaris, mense Septembri, anno 1551. in acutissimam choleram lapsa est, vnà cum syncope vehemientiore: pituitam prius multam & aquosam; deinde & bilem prassinam æruginosamq. simul euomebat & per inferna deiiciebat. Statim accitus & ad eam ingressus, frictiones adhibui, & ligaturas brachiorum; mox à syncope releuata, hoc sequens medicamentum propinaui: & decocti hordei non excorticati ℥ iij. sy. ex infus. ros. rub. magis apertarum ℥ j. mis. quo facile vomuit, & cessum

cessum habuit: noluimus enim in principio ea
 quæ efferebantur cohibere. Quin imò cum ad-
 huc nauseabunda esset, hæc tepidè propinaui-
 mus: & euomit. nam sola aqua tepida cum syr.
 acetos. simplicis, satis officium suum in tali casu
 præstitit. Interea dedi etiã hunc syrupum: & aquæ
 decoct. hordei mundati ℥ iij. sy. de ribes, syr. cy-
 doniorum añ ℥ β. sy. ex infus. ros. ℥ β. mis. syr. iste
 ultimus non erat paratus ex ros. pallidis seu pro-
 uincialibus dictis, qui magis laxat, sed ex ros. ru-
 beis parùm apertis per infusionem, cum & ali-
 quo modo detergat & lauet ventriculum & inte-
 stina. Materia itaque maiori ex parte vacuata
 (quod in horis 24. plerumque fit) leuiter huius-
 cemodi cohibitionem incipere licebit. Idè im-
 peraui huic nostræ agrotanti, ut tempore sitis
 ebiberet aquam coctam cum syr. de acetos. citri,
 ex cotoneis & syr. ex ros. siccis, a quibus inter se por-
 tionibus cum aqua cocta mistis. & ut frequenter
 vteretur ad maiorem roborationem ventriculi &
 constrictionem, iubebam ex condito sequenti,
 vel eius æmulo: & conseruæ ros. antiq. conseruæ
 acetosæ, rob. de ribes añ ℥ β. diacydonij sine
 speciebus 3 vi. se. acetosæ, se. citri pulverifatorum
 añ 3 j. manus Christi cum perlis 3 ij. specier.
 rionfant. 3 ij. cum syr. cons. myrobal. empeliti-
 carum & syr. menthaceo, fiat conditum medio-
 criter molle; de quo sumebat instar dimidiæ ca-
 stanæ, per horam ante pastum, manè & vesperi;
 etiam extrinsecus hoc vnguento ventriculo ro-
 borato, ac temperatè calidè inuncto, manè &
 vesperi ante pastum: & olei myrtei, cotoneorum
 añ ℥ β.

añ ʒ β. olei mastichini ʒ ij. corall. rub. ros. rub. hypocystid., acaciæ añ ʒ j. santali citrini ʒ β. ceræ exiguum, fiat vnguentum. Et quia prius facile in syncopen incidebat, frustum manus Christi subinde dedimus, superforbendo cochlear vnum succi granatorum acidorum. Sed cum leui frictione, vt dictum est, cessaret syncope, reliquam curationem cum supradictis perfecimus: alioqui si accidentia terrentia non cessassent, dedissem vinum tenue, odoratum, cum aqua frigida fractum. Sic anno 1588. Iuuenis quidam in febre continua biliosa cum supra modum bilem euomeret, & infra deiiceret, & in syncopen incidisset, cum sudore frigido, parum vini Rhenani dedimus cum aqua fractum; quibus syncope cessauit, & ad se rediit, cum astantes illum morituum existimarent, cum nocte subito ad iuuenem vocatus essem. Cum itaque in muliere hac humorum excretio quieuisset, cibis probi succi utebamur, parum restringentibus; adiiciendo ad ventriculi roborationem, columbaceum pullum perdicesque, & gallinaceos, cum acore, vt omphacio: vel pisces saxatiles cum aromate suaui. & ita probe restituta fuit sanitati, cum vera cholera laborasset, sine febre.

S C H O L I A.

PRO morbi diuersis temperibus, proq; casuum & causarum diuersitate, hic varia curatione opus est. Cur. Et licet in communi, ager collocandus sit conclau obscuro & temperato, variisq; odoribus grato, citro, malis cydonis, aliisq; similibus pomis: tamen in iis agri ob-

lectamenta quarenda sunt; quandoquidem aliis panis odor fastidio est: ita & aliquos noui qui odorem pomorum cydoniorum respuebant. In primis animi securitas, ac somnus omnino magnam curationis partem possident: quæ cantu sonoq; queritur, secundum aliquos. attamen agri ita male habentes, strepitum illam sæpe ferre non possunt. Et non solum hic leuiter adstringentia, etiam in cibis ipsis permisceri debent, aut parum antè assumi; sed etiam post eos, cum simul ingruat vomitus, & alui fluor; quamquam & ea moderata esse debent, nec à principio. Nam in principio (ut iam diximus ex Aëtio) quæ efferuntur, cohibenda non sunt: nam inutilia (ut idem refert) euacuationem opus habent. Sic quidam huius mali tres status faciunt. Primus est, cum corrupti in ventre cibi molestiam inferant, & nota corruptionis adsunt, sed adhuc natura ad excernendum non impellitur: tunc enim leuiter irritare vim ventris oportet, priusquam per se irritata vehemens spontè eueniat: hinc enim nullo modo incommodum eueniet. Signa erunt huius status, cum nauseam patitur, sentit morsus & rugitus, & angorem circa ventrem. Sic si cibos venenosa qualitatis sumpsit, vel purgantes cibos. vomitus tunc à mulsa fiet, vel aqua hordei tepidis, idq; donec venter cibis vacuetur: à quibus fouendus est venter absinthino oleo vel mastichino calido, ut vomitu relaxatus roboretur. Si vomitum recuset, vnguentum conficiemus, addita cera, corallis, mastiche, aloë, & similibus. Quod si æstuat & æstas sit, oleo cotoneorum (melinū appellatur) utemur. Mox ubi quieuerit, cibum dabimus, assum magis; sed mollem, ex his quibus assuevit, eligendo. Sæpe verò & ventrem proritare isdem expediet. Hinc etiam alia commoda,

Primus status.

commoda, quòd causa ipsa, hoc est humores mitigantur. Quòd si corruptio flatus excitauerit, quod sepe fieri solet, aliquid quod discutiat flatus propinabimus; & extrinsecus pulueres aromaticos vnguentis admiscebimus. Holerius huius causa exhibet cochleare mediū seminis cumini, aqua incoctum. Caterum si spontè natura cœpit excernere vtrumque, (& est secundus status) considerabimus num talis corruptio totum inuasit, an ventrem solum, & primas venas, quæ inter ventrem & iecur sunt. Nam si ad has partes solas attinet, sufficient ea, quæ diximus; vno excepto, quòd calida aqua potabimus. Hic enim intentio non est vomitum proritandi, sed abluendi excrementa, iis quæ infixæ & inherencia proritant, & temperare ea faciunt, ne mordeant. Ita nos in iuvene priore dedimus, vti etiam in muliere quæ medicamentum ex veratro sumpsisset, aquam decoctionis hordei communis cum zacharo.

Secundus
status.

Tertius status est, cum in toto corruptela viget; itaque quamuis à ventre incipiat, prosequetur expultricis impetus. Hic verò considerare oportet, quòd motus hic symptomaticus est, non prorsus naturalis, vt sunt excretionēs quæ per naturam fiunt. Vt igitur illas semper sinere oportet, quia modum non excedunt (est enim leuis proritatio) ita hic distinguere oportet. Quatenus enim praua sunt, & à natura excreta, sinenda sunt: quatenus modum excedunt, sistenda. Initio igitur eadem calida portione vtetur, in easdem intentiones vt proritatio sedetur; ita enim moderatior vacuatio. Sed si malum ingrauescat, cogitandum de remedio est, priusquam symptomata adorianantur. Intentio igitur erit fluxionem sedare, quod duos scopos habet, vt & omnes affectus, qui è fluxione fit: Primus aliò humores

Tertius sta-
tus.

Frictiones &
vincula.

auertere: secundus roborare partes, quæ recipiunt. Primum ab auersione incipiemus, quam modis supra expositis iam sæpe faciemus, vinciendi scilicet extremos artus: nam & frictiones per manus adhibita quæta, & mites. Præterea extremorum deligaturæ eisdem conducunt: & si quidem alius vrget, plures brachii & iunctoris, quibus illa cum manibus committuntur, cum frictiones, tum vincula iniicienda sunt. Sin autem vomitus magis vrgeat, tum femora tum talos constringere, & paululū ipsa dissoluendo, rursus deligare oportet, (vt patet quoque ex Tralliano;) quo materiam semper in contrarium reuellamus. Nam & eo dolore natura ab opere expellendi auertitur, & ad eam partem humorū copia attrahitur; etiam cucurbitulas ad-mouendo. Mox & roborantibus vtendum extrinsecus. Hic tamen naturam causarum animaduertere oportet: Nam si æstuat venter, & sitit multum, & biliosæ sunt, quæ euomit ager, applicare oportet & actu & potestate frigida; cauendo tamen excessum frigoris. Exempli gratia, succum intybi, vel oxalidis, vel portulacæ, vel semperuiui, vel cotyledonis, ex hordei farina sic ex granatis totis expressum succum. Vel panis huius succis immersus, vel & linteus sæpe renouatus cum incaluerit, vel cotonea mala, aut pyra, vino austero, vel aceto incocta, & tusa in linteo extenso apposita. Verubi & rosarum & vitis germina & rosa ipsa con-tusa & emplastri forma applicantur. Quod si non adeo magnus calor appareat, cum hac materia aliquod aromaticum admiscebimus, vt inter herbas mentham siccam, sisymbrium, mastichem, cyperi radicē tusam, rosas siccas. sic & panis assus aceto infusus, & mentha rosas & ænanthe conspersus. Vbi verò signa caloris & æstus

æstus non adsint, vt quoddam materia frigidior corrupta
 sit, calidiora in eandem intentionem asferre oportebit;
 quale est Gal. emplastrum, i. ad Glauc. ex cotoneis pal-
 mulis vino coctis, aloë, mastiche, croco, & farina hordei.
 Possumus & superiorum aliquo vtentes, vt cotoneis
 ex vino aromatici ros. puluerem inspergere: hæc extrin-
 secus: quorū copiam inuenies apud Alexandrū Trallia-
 num & Rondeletium & alios. Intrò verò sumantur in
 eandem vsum ea, quæ à ratione cibi aliena non sunt, sed
 grata; vt scilicet quantum fieri potest retineantur. Si
 igitur æstuat, lactucam & intybam, cum aceto man-
 denda dabimus, aut limones, aut citri carnes, aut coto-
 nea. Sic & Trallianus ob copiam bilis, causam efficien-
 tem obseruans, per contraria semper curandum esse
 dicit, per ea quæ refrigerant & humectant, tum cibos,
 potus & epithemata, quæ eiusdem sint facultatis. Pro-
 inde prisana cremor refrigeratus his est idoneus: item
 lactuca eodem modo refrigerata, paulo aceti adiecto.
 nos quoque thyrsis lactucæ conditis commodè vtimur.
 similiter & is commendat intybum; & panem ex aqua
 sumptum. Inter testacea conferunt pectines & bucci-
 na lota sæpius; astacum bis coctum, & pisces duriores.
 ex fructibus qui non admodum maturi sunt, & adstri-
 ctionem mediocrem habent, præsertim mala, pyra, mala
 punica, & vua pensilis. ex bellariis huc conducunt vua
 passa, & castanea. Poterimus & panem ex acerba vua
 succo, vel punicorum dare, & aquam frigidam; sed id
 parum; quæ non vniuersa, iuxta Trallianum, sed paula-
 tim & in cibi sumendi medio tempore bibatur. Sic &
 corna, mespila gustent, & ex cerasis austera, quæ ma-
 rina dicuntur: conferunt & grati odores astringentes
 naribus obiecti. In censu verò medicamentorum astringen-
 gentium,

Cucurbitu-
la.

gentium, erit acacia, hypocistis, in vino dissolutus; & terra Lemnia, & bolus armenus: miua quoque simplex dicta, & syr. è myrto. Quod si affectus his non sedatur, & timor est syncopes, somnum inducere expedit: eo enim sedantur prorsus fluxiones hæc, idq; potius exterius oleis frontem & tempora inungendo. Vel dandum diacodion. hinc duplex commodum: nam sedatur pro-
ritatio expultricis vis, & humorum motus sistitur. At si nihil horum continere queat, cucurbitulam magnam ventri admovent, & est maximum presidium ad vomitum sistendum. nam validè retrahendo eiusmodi cucurbitula vomitum prohibent. præterea si diutius adherent etiam concoctionem iuvant, & ventrem, ne amplius profluat, cohibent, eodem Alex. teste. Interea alio adhuc egerente (ut inquit Aëtius) amyllum cum decoctione capitum papaverum, per clysterem infundatur; simul etenim cohibet & refrigerat, somnumq; inducit, ut ipse refert. Nihil enim his præstantius est quam somnus & quies. Si verò iam symptomata eueniant, illis succurrere oportet quamprimum; ut antequam ager in syncopem incidat, vinum exhibere, vel aquam carnis, in hunc usum paratam; quod etiam ubi syncope accesserit, faciundum, præter alia remedia, quæ vniuersim ad syncopas fieri diximus, excitantia. Si conuellitur ex inanitione, morandum non est, sed prædicto periculo extrema partes aqua & oleo dulci tepido fouendo; similiter maxillarum muscoli, per spongas. Post hæc si malo profligato vigilia vexant, moderatus somnus conciliandus: si inappetentia, ventrem roborantibus, & cibis gratis excitabimus. Ex his iam dictis constat quomodo curatio in genere, ratione causarum & symptomatum & temporum, sit varian-
da.

*da. quæ particularibus exemplis supradictis, & iam
adhuc dicendis multo clariora euadent.*

OBSERVATIO XLVIII.

*De duabus mulieribus cholera feuissima
laborantibus, & curatis.*

CATHARINA Iohannis Harpardi consu-
lis Delphensis filia, nuper nupta, & circa
tertium mensem prægnans anno 1558. 23. Iunij
incidit in choleram grauissimam, ita vt abortus
metueretur. Ad quam nocte accitus, ilicò dedi
decoctum hordei cõmunis, cum paucis zaccha-
ro: à quo rursus cùm satis vomuisset ac aluū red-
didisset, cumque extremè debilis esset; vt sæpius
deinde ex condito sequenti vteretur, præcepimus:
℞ corticum citri conditi ℥β. medullæ citri condi-
tæ ℥ij. conseruæ summitatum absinthij Romani,
conser. ros. añ ℥iiij. specier. diatod. abb., & arom.
ros. sine musco añ ℥j. cum syr. menthaceo & co-
toneorum, fiat conditum. Ventriculum inunxi-
mus oleis sequentibus; & cum lana stomachum
fouebamus cum iisdem oleis: ℞ olei cotoneor.
℥ij. olei nardini, absinthij añ ℥β. mis. Prætereà
~~ne abortus fieret, totum ventrem inferiorē innungi~~
~~iussimus enim vnguento comitisæ & ne vapores~~
maligni sursum reperent cùm paulo melius ha-
bere visa est, capiebat à cibo grana septē vel plu-
ra seminis coriandri præparati, simplici tunica
zaccharo incrustati. Altero die cùm redire, cho-
lera cùm sedata esset, conquerebatur de calore
circa renes: quibus inunctis cum vng. infrigi-
dantis

dantis Galeni, cumque astantes illam pro deplorata haberent, non solum à cholera curata fuit, verum & ab abortu præservata. Vti etiam Petronella, vxor Salsboti Bokelli, ceruicisarij Dellaphensis, quæ tamen non erat grauida. Hæc enim anno 1560, 19. Martij die cum in choleram notum etu vehementiorem incidisset, cum torminibus ventris, doloreque intolerabili, & maximo cruciatu & angustia, ita vt suræ ac crurum musculi valdè conuellerentur, frigidumque exsudaret, ita vt me ex lecto tunc vocauerit; cum animaduertenterem simul flatus adesse, statim exhibui cimini parum puluerisati eû-ceruicia, dū in officina decoctum hordei cōmunis parabatur; cuius decoctionis dedi ℥ iij. addendo pro maiori deterfione sy ex infus. ros. ℥ j. mellis ros. colati ℥ ss. mis. & deinde totum ventrem inunximus cum oleo anethi no & chamæmelino simul mixtis, ob dolorem quibus præfidiis statim miraculi instar fuit curata; vt aliis remediis vti opus non fuerit.

S C H O L I A.

H V I C morbo medemur, vt paulo antè diximus. si syncope aut aliud symptoma tale non impediat, ablata causa. quoniam primū vnāquamque causam abscindere oportet, postea ad intemperiem venire. Sed quomodo sit auferenda causa, & per quam regionem, docet Hippocrates: Quò natura repit & c. In hoc affectu cum fiat excretio per vomitum & secesum, ante omnia erit prospiciendum an eger vomat facile vel difficile; num sine conuulsione & syncope; nam ipsis primū esset occurrendum, vt grauioribus

& magis urgentibus. Et quamuis prima mulier facile vomebat, nolimus vomitum nec secessum irritare; sed contenti fuimus ablutione cum decocto hordei & zaccaro. & ideo materia illa absterfa, ventriculum roborauimus, & ad constrictionem leuem deuenimus, ne fieret abortus. In altera vero muliere, quamuis erant statim in principio accidentia mala, nempe conuulsio, nolimus statim constringere; & ideo abstergentibus vsi sumus, cum facile vomeret & secessus satis haberet, syr. ex infus. ros. dedimus cum melle ros. in hordei decocto: & quia aderat flatus, dedimus etiam cuminum. & cessante fluxu ac vomitu etiam cessauit conuulsio; alioqui etiam ad conuulsionem praesidia adhibuissimus. Quod si vomitus fuisset in his difficilis, parum adiuuissimus, cum leuioribus tamen, vt malsa. Sed si bilis in ventriculo fuisset, vel alimenta adfuissent in bilis naturam corrupta (quod per nidorosos ructus intellexissimus) abstinuissimus a melle rosato, vel calidioribus, & ab iis quae bilem augent, & intemperiem. Aqua tepida contenti fuissimus, non tamen in parua quantitate (sic enim vertitur in bilem) sed copiosa; tum ne bile scat (vt ait Hippoc.) tum vt ventriculi partes omnes abluat, & citius reiciatur. Ager autem sinendus est vomere, donec vitiosus humor totus, aut maiori ex parte reiectus fuerit: nec antea medicamentis adstringentibus est vtendum; quoniam materia quae agitata est & quasi sursum elata, retineri non potest, nec etiam debet, ne humoris corrupti vacuatio impediatur. Siue igitur corruptio ob copiam ciborum fuerit oborta, siue alimenta fuerint corrupta, siue humores corrupti, conuenit aliquando in principio iuuare excretionem, tam per vomitum, quam aliquando per sedem; lenioribus tamen purgan-

purgantibus medicamentis, prout diuersus humor requirat. ita viribus integris rectè faciunt, qui modicè detergentia exhibent, vt quicquid reliquum est humoris, euacuetur: vt in materia calida dant aquam hordei cum pauco Zacharo; in frigida, cum pauco cinamomo. si adhuc humor supersit, in calido capiunt myrob. citr. ʒ ij. fiat decoctio in aqua hordei; & in ʒ ij. colaturæ sacchari parum dissoluunt: in frigida, pilul. de hiera vel arom. sed ab iis abstinere: ad vomitū magis conferunt, quàm ad cholera morbum, qui ferè totum humorem, & plusquam sat est, euacuat: nam hæc excretio, quamuis utilis sit; si modum excesserit, periculo non vacat, cū prostratis viribus mortem afferre possit. Vbi igitur vitiosus humor, in principio adiutus leuiter, totus vel ex parte sit reiectus; tunc ventriculus est corroborandus, ne attractis à partibus vicinis excrementis, vt à liene, iecore, ac intestinis, ea quæ præter naturam est vacuatio, continuetur. idè ventriculus potius admotis, quàm sumptis est roborandus: quoniam admota melius corroborant & sistunt, citra ventriculi nauseam, vel subuersionem. Quæ verò sumuntur, siue medicamēta, siue alimenta fuerint, reiciuntur, propter agitationem. propterea ager quiescat; & interim, quod admotum est, non erit otiosum. Somnus, si fieri potest, conciliandus, vt qui & concoctionē maximè iuuat, & excretionem retineat. Admota perpetuò debent esse adstringentia: sed calida in frigida, & frigida in causa calida. Quæ verò admouentur, vel sunt emplastra, vel sacculi, vel fofus oleorum, vel decocta herbarum, vel succi earundem, & fruct. & pulv. Formulas vide apud auctores & præcipuè apud Rondelietum, tam in causa calida, quàm frigida; & apud Holerium.

OBSERVATIO XLIX.

De cholera cum syncope & conuulsione.

CHOLERAM cum syncope & conuulsione, omnium sæuissimā esse diximus: quæ cum Iohannem Boëthum, cereuisiarium, in foro frumentario Delphis habitantē inuasisset, adedò grauis fuit, vt ex continuo vomitu ac secessu in syncope incidere, deinde in conuulsionē manuum, pedum & præcipuè surarum, & propemodum in omnium musculorum contractionem: & non solum musculi pectoris (vt vidimus) motu cōpulsuo afficiebantur, sed & gutturis, dorsi, tum ventris contrahebantur, vt simile in praxi nunquam viderim, cum tanto dolore & animi defectione, vt hominem ilico moriturum dixisset. Ad hunc 23. Martij die, anno 1563. in nocte vocatus, ilico hoc medicamentum deterforium dedi, vino prius naribus obiecto & factis frictionibus extremorum, vt à syncope releuaretur nonnihil: & decoct. hordei communis ℥ iij. syr. ex infus. ros. rub. commun. ℥ j. mis. eoque assumpto euomuit plurima biliosa; & secessus plurimos habuit. Cum autem lipothymia non cessaret, imò syncope oreretur, ad vinum confugiebam, tenue, odoratum, cum aqua frigida fractum; quod paulatim sorbendum dedimus, nempe cum molli panis sumptum. Modò dedimus panem feruentem, vino punico infusum; quod cum vomitu reiiceret, rursum dedimus. Interea ob deliquia animi refecimus eum tostæ carnis succo expresso, cum vino punici, malique cydonij. Præterea ad impe-

Q tum

tum ipsius cholerae, ac vomitum inhibendum, tum pro siti enormi ac syncope, ut continuo ex hac mixtura sumeret, mandauimus: & rob de ribes ʒj. rob cerasorum, syr. cotoneorū añ ʒβ. manus Christi cum perlis ʒvi. misce. Ad contractiones verò continuas in omnibus ferè locis linimento infrascripto iussi inungi: & olei irini, vermium terrest. añ ʒj. castorei puluerisati ʒij. misce. & per totam noctem loca conuulsione affecta continuo eo linimento parum calfacto inungebantur; ita ut maximo quasi miraculo mox hæc omnia mala symptomata cessarint. Postquam autem malum nonnihil inclinasset, nutriuimus illum lacte amygdalato, cum aqua furfuris confectio modico zaccharo perlato, ad mediocrem dulcedinem, adiecto. Deinde & cibis optimi succum quoque restaurauimus; nempe pullis gallinaceis, columbis, perdice, cum acore: pira tum mala cydonia, modò cocta, modò assata præbui-
mus. Postea, cum ex toto quasi omnia accidentia prædicta cessassent, post duos trèsvē dies adeo venter restrictus est, ut nihil excrementorum deiceret: qua de causa ut omni manè cochlear vnum syr. ex infus. ros. sumeret, præcepimus; ita ut postea semel in die naturaliter excreuerit, calore & siti post morbum relictis etiam cessantibus. Doluit tamen subinde in ventre inferiore versus pubem, ut ægrè lotium redderet: at pubes sapius inuncta cum oleo chamæmelino, idque calidè, copiosè deinde lotium reddidit, & sanus factus est.

SCHOLIA.

CURATIONEM pleriq; ut dictum est antea, duobus ferè modis absoluunt; vel causam remouendo, vel symptomatibus occurrendo. In remouendo causam, rationem habent materia fluentis, nam ea digna sit euacuatione; eamq; diuertunt, in contrariam partem trahendo: hinc & quidam balneo vtuntur, vt materia ad partes externas trahatur; sed melius ligaturis tum vinculis, vt iam dictum est, tum frictionibus. Habent etiam rationem materia fluxa, vt moderatè quò natura vergat eam vacuent per vomitum aut secessum: alioqui si superfluat, & vires deiciat, restringunt; & roborant ventriculum, & vita institutum præscribunt. Sic alij causam remouent, diuertunt, humores incrassant, viasq; & ductus constringunt: de quibus satis iam dictum est. De quibus videas Gradam, Gatenariam, Arculanum, & alios, qui Rhasem aut Auicennam sequuntur. Symptomatibus occurrunt, qualia hæc ferè sunt: sitis, syncope, singultus, conuulsio, vigilia. Sitim restringimus aqua hordei, cum succo granatorum, vel iulebo rosæ, succo granat. & syr. eiusdem, tum illis quæ ad sitim valere scripsimus in lib. nostris de febribus. Syncopen curamus eo modo quo antea de syncope diximus, lib. 17. & quorum exempla etiam posuimus lib. 7. de feb. sympt. & ita syncopi intendimus, aspersioni aquæ frigida in faciem, vino subtili odorifero, non tamen multum vinoso, aqua permixto, paulatim absorpto; iure carnis, & similibus: interea si extrema frigescant, pannis calidis fouemus. Et viribus deiectis consulimus vino austero prius naribus admoto, vel assumpto succo carniū, vino granatorū admixto.

Sitim restringentia.

Ad syncopē.

Ad singul- & prelo expresso, buccella panis vino imbuta, naribus
tum. admota, vel deglutita, modò possit. Singultui propriè
ex inanitione, subuenitur frigidis, stomachū roboran-
tibus, vacuationem inhibentibus, vino & miua coto-
neorum; exterius, emplastris ex cotoneo, vel fotu ex
aqua chalybeata, in qua rosa & santali & similia in-
cocta fuerint; cibusq; facilè digestiuis, frigidis & robo-
rantibus. Reliqua de singultu cap. proprio petenda.

Contractio- Contractioni manuum, pedum & sura, iuxta Paulum,
ni resistētia. oleum calefactū musculis panno imponendū, vel cerota
liquida addito castoreo. Si ex inanitione, oleo tepido
dulci & aqua, partes fouenda extrema, & musculi
maxillarum, per spongiar, si contrahantur; alij hieme
inungunt oleo nardino, liliaceo; æstate violaceo & ros.
Quidam ex inanitione partes fouent lacte tepido cum
pannis admoto: at nos commodè in muliere vsi sumus.

Ad vigilias. oleo irino, & vermium terrestrium. Vigiliis occur-
runt soporiferis, vt diacodio, & aliis: de quibus vide
auctores.

OBSERVATIO L.

*De cholera mutata in cæliacum morbum
seu cæliacam affectionem.*

PRÆTOR Rheniburchius, Delphis decubue-
rat in foro, in Mechliniæ hospitio, ex cholera
sæuissima, ad desperationem ferè: à qua licet no-
strâ industriâ euaserit, postea tamen, hieme exi-
stente, cum intemperiem frigidam ventriculi ha-
beret; vnde pituita multa congesta, præcedente
cruditate, & in ventriculi cauitate coaceruata,
quæ indies intemperiem magis fouebat, in cælia-
cam

cam tandem affectionem incidit. Ad quem accedens anno 1559. die 2. Ianuarij huic optimam victus rationem proposui obseruandam, qualem nobis describit Trallianus, ex Philumeni medici antiquissimi decreto; cū & cœliaci ita curentur, nempe cibis non nimium aluum reprimentibus, sed qui adstringentes faciliè cōcoqui & in totum corpus distribui possunt; qualis est panis benè elaboratus, probè coctus, vinoque adstringenti intinctus; nec non lenticulæ & oryzæ sorbitiones: pisces verò dura carne præditi: & ex auibus quæ non sunt pingues, præter palustres. Ita & panis cū malis cotoneis & myrtis coctus, exhibitus. Vitella quoque ouorum assa & aceto intincta, & lac scissile propinatum, carnes leporinæ, aut ferinæ, ac alia quæ in fluidis affectibus profunt. Quod ad medicamenta attinet, cū liquida incocta excerneret, modò pituitosa, modò biliosa, & quasi fluida & cruenta, sine acrimonia tamen; licet huic ventriculus frigidus esset, hepar tamen illi calidum erat; quod & venæ apparentes indicabant, & constitutio ipsa parū macilentia. Prima vice vt ventriculus ab eiusmodi humoribus liquidis lauaretur, hanc potionem sumpsit: & decoct. hordei non excorticati ℥ iij. sy. ex ros. siccis & cotoneorum (ad maiorem repressionem & roborationem) añ ℥ β. mis. detur vnica vice. Deinde sumebat ad placitum ex hoc condito: & conse. ros. antiquæ ℥ j. miuæ cotoneorū ℥ β. corticum citri conditi & medullæ citri conditæ (ob sitim, quam experiebatur) añ ℥ ij. myrobal. empelit. conditor. & citrinor. añ ℥ j. β. specier. diarod.

diarod.abb. ʒβ. specier.arom. ros.sine musco ʒβ.
 cum syr.cotoneorum; fiat conditum. Interea sem-
 per ante cibum sumebat ʒβ. diacydonij sine spe-
 ciebus; & sub noctem amygdal. cum aqua oryzae
 confectum, vt melius dormiret & minus liquidas
 excerneret. Interea & ad maiorem restrictionem
 & stomachi roborationem, utebatur etiam se-
 quenti mixtura: & conser.ros. antiquæ ʒj. trochis-
 de spodio, cum sem.acetof. ʒij. trochil. de carabe
 ʒj. rob de ribes, sy. de agresta, syr. menthacei
 añ ʒβ. mis. Verum antequam hæc sumeret, cum
 circa ventrem nonnihil doleret & tormina expe-
 riretur, hoc enema iniectum est: & decoct. hordei
 communis torrefacti lib.j. olei ros.omphacini,
 sacch. rub. añ ʒj. vitellum vnius oui; fiat clyster.
 vix tepidè iniiciebatur, à clysteri iniecto materia
 in melius commutata est. tunc utebamur mixtu-
 ra supradicta; & linimento sequenti ventriculum
 inungi curauimus: & olei mastichini, cydonior.
 myrtini añ ʒβ. pul.ros.rub. menthæ siccæ, mace-
 ris añ ʒβ. ceræ modicum; fiat linimentum. Atque
 hæc valdè profuere. Nam hic morbus, curatione
 statim adhibita, teste Alexandro Tralliano, facile
 tollitur, postea difficilius; vbi enim inueteraue-
 rit, tardè remouetur. Similem ferè casum ha-
 bes apud Amatum Lusitanum de cœliaco mor-
 bo & *καχεξία* & atrophia, cent. 3. curat. 87. in quo
 loco plurima remedia reperies: quamquam ager
 ille longiore tempore hoc malo laborauerit; At
 noster ager statim adhibitis remediis citius con-
 ualuit, spacio vndecim dierum. Verum curato
 utcumque cœliaco morbo ac fluxu, dolorem &
 caliditatem

caliditatem circa renes passus est. sed facile hoc symptoma repressum cerato infrigidante Galeni lumbis imposito. Verum non diu post pustulæ quoq. obortæ illi sunt circa palatum & linguam; quæ breui tamen hoc collutorio cessarunt: & decoct. hordei communis; aquæ plantag. añ lib. j. sem. cydon. ʒ j. ebulliant leuiter, & colentur; colaturæ addendo diamori ʒ j. β. mellis ros. colati ʒ β. misce. Sed cum tempus hibernum esset, cum frequenter cogeretur aluum deponere, ex frigore & ventositate dolorē cum torminibus circa hypochondrium sinistrum expertus est; qui tamen mox ablatus, inunctione olei de cappar., anethini, chamæmel. simul commixtis. Sed à cœliaco morbo breui curatus, post aliquot dies idem tussim incurrebat: syr. pectoral. tum eligmata, ne incideret rursus in morbum cœliacum, præscribere non fuimus ausi: sed lacte amygdal. vtentes, cum aqua farfaræ & zacch. parato, vt continuò masticaret glycyrrhizā viridē recentem, à cortice exteriori repurgatam, iussimus. Quibus remediis etiam à tussi liberatus est: & quamquam is diceret se habere contra tussim infallibile remedium, nempe pomum excauatum, melle rosaceo repletum, & parte superiori prius abscissa, & eadem cooperta, supra prunas assum, & sub noctem deuoratum, quo se ipsum frequenter à tussi curauerat; nunc tamen eo non vtendum suauimus, ne rursus affectionem cœliacam incurreret: & satis amygdalatum sub nocte sumptum ad rem fecit, tam tussi quàm cœliaco malo conueniens.

*Rem. repet. 1. 2. 3.
ob. 3.
Vide Italia
q. asthma
in exp. m. h.
Belgicus.
f. 265.*

SCHOLIA.

Cœliaca affectio unde dicta.

Causæ.

COELIACA affectio licet vnà cum lienteria, diarrhœa, dysenteria, ad immoderatas alui fluxiones pertineat; tamen cum etiam ad ventriculi affectiones, secundum quosdam, referatur; de ea hic dicendum esse putauimus. Quamuis hæc ipsa à lienteria differat, tamen cum eadem sæpe confunditur; & quidam sub vno capite de iisdem tractant, cum iisdem ferè remediis curentur. Græcis verò κοιλιακή, à Latinis Cœliaca seu ventralis affectio dicitur, ab ea quæ afficitur parte nominem assumens, ex Aëtij mente cap. 37. lib. 9. Velox quidem est exitus eorum, quæ per os assumuntur; verum non omnino crudorum, & incoctorum. Nam in ea affectione solum leuia, & humecta excrementa egeruntur, ventre pro imbecillitate ea digerere nequeunte, vt ipse inquit: quapropter nec concoquuntur omnino, nec digeruntur alimenta, sed humentia, imperfecteq; cocta redduntur; neque ita celeriter ea quæ assumpta sunt, in cœliaci, egeruntur; quemadmodum in lientericis. Dicitur itaque morbus hic cœliacus, ὁ τοῦ τῆς κοιλίας nomine, ventrem siue stomachū significante, in quo potissimum fit: non tamen me latet, τὴν κοιλίαν apud Hippocratem quandoq; ventriculum, quandoq; verò aluum significare; vnde etiam Amatus testatur, non tam ventriculi passionem quàm gracilium intestinorum esse; & Fernelius doctissimus inter symptomata intestinorum non autem ventriculi solum enumerat; cum dicat Ex imperfecta chyli malaq; distributione fieri, quam mesenterij, lienis aut iecoris obstructio, vel trahentis facultatis imbecillitas, vel alimentorum maximeq; fructuum fugacium, & potus, immoderata copia peperit. hac

hac enim distribui tota nequit, sed maxima ex parte in abdomine subsistit. Ab his causis multa congeritur illuvies, quæ sensim in tenuioribus intestinis aucta, vel in ventriculo, vel in mesenterio, vel circum viscera, tempore corrumpitur. Quumq³ sua copia gravis esse coeperit, vel spontè infra interdumq³ supra prorumpit, vel à natura lacescit propellitur; nonnunquam leuissimo clysteris medicamentive irritamento exit. Et quamquam hic, uti & in lienteria, amborum, nempe ventriculi tum intestinorum, sit affectus, ut etiam docuit Donatus, ex Gal. 6. de loc. aff. & aph. 12. 4. lib. & ambo sint symptomata in genere noxæ functionum naturalium, retentricis videlicet; in cæliaca tamen diminuta, (in qua cibos non complectitur vsque ad consummatam concoctionem;) in lienteria verò abolita est. quæ ratione etiam differunt & inter se cōmunicant. Iam etiam, ut 6. de loc. affect. patet, lienteria seu leuitas intestinorum subito euenire non potest: propterea cæliaca præcedere eam solet; ubi ventriculus frigidior fuerit, leuia autem & humecta excrementa egeruntur, ventre præ imbecillitate ea digerere nequeunte: & non cibi crudi, & incocti infernè prodeunt in cæliaca affectione, ut Aërio visum est. Sequitur autem cæliacos assidua egestio, aliquando foetida, cū animi deliquij sensu; cibumq³ auersantur, ac decolores & vehementer graciles fiunt, ut etiam Paulus testatur. Languida cū sit, & imbecilla ventriculi facultas in cæliacis, nec concoquuntur, nec digeruntur alimenta, sed cruda, humentia imperfectaq³ redduntur; aluo continenter fluida: quamquam quæ assumpta sunt (ut paulo antea diximus) non ita celeriter, veluti in intestinorum leuitate, egerantur. Fernelius hæc addit: Pulsus frequens & celer existit,

Pars affecta.

Affectus.

Cæliacæ signa.

Lib. 8. cap. 8.
de coeliacis
ex Philome-
no causa &
signa.

Qualis coe-
liacus mor-
bus apud
Cornelium
Celsum.

tamquam febris affligeret, & deiectionis leuiuscula ani-
mi defectiones obrepunt. Ante eruptionem abdomen
distenditur, venterq; prominet; hisq; succedens sponta-
nea perturbatio, qua coeliaca affectio est. ita & Alexan-
der Trallianus. Coeliacus affectus ex ventris ipsius cru-
ditate generatur, dñ ipse præ imbecillitate cibum con-
coquere, & corpori suppeditare nequit. Quare liquida
& non bene concocta, varij coloris, nec non cruenta fe-
ces, veluti ex vase distillante per aluum, excernuntur.
Nihil igitur mirum est, quod sanguis non probè con-
coctus in ventrem recidat, retentrice facultate amissa,
ut vitiatæ: vnde longo tempore frequens ventris reso-
nutio, cum assidua deiectione, perdurat: corpus extenua-
tur, vigiliis consumptum: cruditas rosioq; & tormina
ventrem affligunt, & cibi fastidium comitatur. hæte-
nus Alexander. Sed hic sciendum, Cornelium Celsum
longè aliter hunc morbum descripsisse, quàm nos hæ-
tenus fecerimus; cuius & meminit Alexander Benedi-
ctus Veronensis, lib. 20. cap. 7. de coeliaco morbo, inquit:
Celsus lib. 4. cap. 12. morbum hunc pylori, id est, por-
tionarij proprium esse ait, in quo venter induratur, &
torminibus premitur, aluiusq; adeò nihil reddit, ut ne
spiritus quidem infra, sed nec supra erumpere possit.
cuius etià meminit Beniuenius cap. 106. in libello suo
de abditis morborum causis, cum Paulū patrem suum
clystere ex solo lacte in ventrem iniecto, ac multis sub-
inde strigmentis depositis, ab hoc malo curauerit. Sed hic
lector admonendus est, locum illum apud Amatum sub
finem scholij, curat. 87. cent. 3. mendosum esse; cum di-
cat patrem Beniuenij obiisse, quum tamen idem Beni-
uenius patrem suum ab illo morbo referat à se curatum
esse. Caterum non loquimur de illo coeliaco morbo,

sed

sed de eo qui ad ventriculum pertinet, & subinde ad
 utrumq³, nempe ventriculum & intestina, in quo hu-
 mida & inconcocta egeruntur. Quae affectio aliquando Prognostica.
 citò curatur, & non diu durat: nam, ut scribit Ferne-
 lius, aliquando vacuato humore superfluo, profluvium
 hoc spontè conquiescit; interdū postero aut tercio die.
 Attamen, secundum alios, non statim per se desinit, imò
 diutius durat, & vix remediis cedit: & propterea, si
 diutius duret ac protrahatur malum, ad magnam om-
 nino desperationem progreditur, agris ad convenientem
 diatam pigrescentibus. Et si affectus autumnò incipiens
 ad hiemem vsq³ se extendat, difficilior omnino curatur,
 ex Aëtij sententia, præcitato loco. Cùm verò insepara-
 bilia symptomata sunt celeris exitus ciborum (qui ad
 diminutam concoctionem consequetur, propter iniu-
 stum complectendi tempus) deiectionis humiditas, &
 digestio in corpus diminuta, ut constat ex Galeno, lib.
 de diff. symptomatum; si eadem coeliaca prorogabitur,
 necessario atrophia consequetur, propter diminutam in
 corpus alimenterum digestionē: quod exemplo sequenti
 ostendemus. Idèd, ut ex Tralliano prius diximus, mor-
 bus hic, curatione initio adhibita, facile tollitur; postea
 difficilior. ubi autem inueterauerit, tardè remouetur.

OBSERVATIO LI.

De coeliaca affectione cum Atrophia.

VIR sexagenarius cùm in hieme paulo diu-
 tius coeliaca affectione detineretur, maci-
 lentior factus, in cōsiliū cùm me vocasset, qui-
 bus modis curari posset, animaduerti eundem
 etiam atrophia affectum, ob diminutam in cor-
 pus

pus alimentorum digestionem. Hic autem liquida subalbida, malè cocta, humentia, sed non feruida, longo tempore deiecerat; vnde & cœliacam affectionem esse cognouimus, ex intemperie frigida ventriculi. Totum corpus album erat, quasi cachexia affectum, cum atrophia, ita vt non nutriretur. Huic autem, cum etiam pituitam in stomacho coaceruasset, consului vt priùs cochlearia duo oxymelitis acciperet, ad deterfionem: cumque nauseabundus esset, eo assumpto leuiter euomit; alioqui dedissem decoctum raphani, cum oxymelite. Mox ad pituitam magis digerendam & preparandam imperaui vt decoctum absinthij & menthæ sumeret, cum syr. ex absinthio, mētha, melle ros. Postea ad leuem purgationem dedi potionem sequentem: & myrobal. chebul. ʒ iij. flor. ros. rub. p. j. absinthij Rom. m. j. bulliant in aqua communi, & facta express. in ʒ iij. dissolve sy. ex infus. ros. pallid. ʒ j. agarici trochis. ʒ β. fiat potio. Interea dum hæc operabantur, exterius iussimus ventriculum oleis refocillari, nardino videlicet, mastichino, absynthino, & menthæ, succida lana exceptis. Mox & scutum apponi iussimus, ex sola mastiche, aliquot guttis olei absynthini adiectis, pistillo calido supra alutam ad scuti formam redacta. Post diem vnum aut alterum similiter imperaui vt ʒ j. theriacæ optimæ acciperet manè, cum paucò vino astringente. Iussi quoque vt subinde acciperet diacydon. cum speciebus, præcipuè ante cibum; & vesceretur cibus boni succi, pullis columbinis domesticis, ficedulis, phasianis, turture & cuniculis paruis, &

uis, & contusum acciperet & succū ex carnibus prædictis; adiecto aliquo puluisculo ex cinamomo, caryophyllis, & exiguo croco: & ut etiam in fine Martio pane & pino zaccharato vteretur. & vinum concessimus rubrum. etiam cynaram cum suo iure, & in fine ut vteretur iis quæ leuiter vrinam cierent. Quibus remediis & hic tandem bene se habuit.

S C H O L I A.

COELIACA affectio, & lienteria, ferè iisdem remediis curantur; quamuis seorsim Trallianus de celiacorum curatione, ex Philumeno scripserit. Is in potu dat radicis quinquesolij decoctum, & rubi radicis similiter, nec non salicis arboris; hæc in calida intemperie magis conferunt, uti & syr. myrt. de ribes, ex succo cichorij, cotoneorum, oxyzach., cum decocto acetosa. sed & levis purgatio ex myrob. citrinis, thamarindis, vel syr. ex infus. ros. pallidar., cum rhabar. idq; in principio, quando vires non sunt deiectæ. deinde astringentia adhibenda, ut semen plantag. Valet egregiè, iuxta Aëtium, & Paulum, gallinarum ventriculus desiccatus ac tritus, & potui inspersus, nec non apij, feniculi, anisi decoctum, & eodem tempore quæ vrinam ciunt: sed eorum quantitas minor esse debet, nec eorum vsus largus commendatur; sed & vomitus, si in ventriculo humores collecti, modò ad vomitum proni sint; alioqui minùs proritandus. Deinde topica adstringentia adhibenda, & cerata, & saccelli, ut de vomitu bilioso diximus. Si simplex sit intemperies sine humore, prædicta conueniunt, excepta purgatione. si ex frigida intemperie, curationem præcedente obseruatione

tione iam diximus. Cum autem eodem medicationi
 ductu vtendum sit in leuitate intestinorum ac in lien-
 teria, quo ad cœliacos & dysentericos (vt Aëtius re-
 fert ;) propterea qua auctores scribunt de vnius cura-
 tione, etiam alterius subintelligenda erant. Quamob-
 rem complura remedia ponemus de curatione liente-
 ria, cum de Alui profluvii quoque agemus. Hac de
 cœliaco affectu, qui etiam ad stomachum pertinebat
 dicta satis esse puto. Si plura & veterum remedia
 desideres, illa ipsa tum reliqua videas apud Trallia-
 num, lib. 8. cap. 8. De cœliacis, quæ ex Philumeno
 excerpfit. Et ita stomachi ac ventriculi malis abso-
 lutis, huic libro finem imponentes, ad iecoris mala
 transeamus.

ANIMADVERSI O

IN OBSERVATIONEM XXIIII.

& Scholium eiusdem.

IN Scholio Obseruat. 24. huius libri, Lector benigne, diximus Cardamomum à vulgaribus quondam granum paradisi vocatum fuisse. Sciendum tamen, quòd granum paradisi sit semen diuersum à cardamomo vero, quamuis pro cardamomo maiori quis accipere posset, cum videantur eiusdem ferè esse virtutis. Cæterum granum paradisi, vulgari nostra lingua Greyn appellatū, ab Arabibus verò Mellegetta, aut Millegitta dictum, à semine crebro, pharmacopœis tum medicis satis notum, & in officinis etiam nunc ab Aromatariis frequenter venditur, & nostri quoque hoc semine in puluerem redactò aliquando cibos suos condiunt: ita ut non opus sit eius loco cardamomum sumere, cum & frequentissimum sit, & hodie magna copia ad nos aduehatur. Verum quod ad cardamomum attinet, quatuor eius species nunc in officina habentur, maius (inquam) minus, medium, ac minimum. At minus pro vero habetur ac sumitur. Quamobrem cum mentis sit in aliquibus confectionibus aromaticis de cardamomo, intelligunt cardamomum minus. Et idèd cum simpliciter cardamomum scribunt auctores, cardamomum minus, ut vsuale, accipiunt. Plura de his si desideres, vide Matthiam Lobel, in aduersariis fruticum, subfruticum, cremiorum & arborum pag. 445. & in observationibus stirpium pag. 616. & comment. Andrea Matthioli in lib. I. Diosc. cap. 5. de cardamomo eiusq; consideratione.

FINIS LIBRI DECIMIOCTAVI.

Hæc quoque vide Lector; & quæ errata à me
siue ab operis, humaniter condona, &
ad hæc exempla emenda.

Pagina 3. linea. 17. *sumtim* leg. *summatim* 19. In
obs. 4. quod leg. *cui* 26. 9. *porrus* *porrum* 27. vltima,
cortalem. alias *cohortalem*. 41. 23. *mali citrini*. dele.
leg. *malorum granatorum* 46. 15. *succi malor. punic.*
3 vi. leg. 3 vi. 52. 19. *coriand. præp.* 3 j. ß. leg. 3 j. ß.
118. 17. *flatui. flatus* 119. 20. *aliq. alteri* 137. 11.
grauatum leg. *granatum* 149. 8. *infus. ros.* leg. *infus.*
rosarum rubrarum 167. 14. *apostemata. apostema*
198. 8. obs. 34. leg. 35. 235. lin. 30. *marina.* leg. *mo-*
rella. sic enim *cerasa* illa vulgo vocantur.

OBSER-

OBSERVATIONES MEDICINALES

secundum ordinem,

quæ in hoc libro DECIMO OCTAVO
continentur:

Primus numerus notat observationem:

secundus paginam.

- | | | |
|-------|---|--------|
| I. | O BSERVATIO, De oris ventriculi inflammatione. | Pag. I |
| II. | De ventriculi imbecillitate, ex intemperie frigida & humida; cui postea etiam materia pituitosa accessit. | 4 |
| III. | De imbecillitate ventriculi ex laxitate & mollietate; in quo pituita postea coacervata fuit. | |
| IIII. | De cardialgia, seu oris ventriculi dolore, cum quodam morfu; quam bilis vomitus subsequēbatur. | 19 |
| V. | De appetentia canina. | 22 |
| VI. | De grandi fame, quæ Bulimos Græcè dicitur. | 28 |
| VII. | De citra siue pica & malacia. | 32 |
| VIII. | De Anorexia seu inappetentia, vel cibi fastidio. | 38 |
| IX. | De Anorexia ex humore bilioso, cū ventriculi intemperie calida. | 44 |
| X. | De inappetentia ex pituitoso humore, cum intemperie frigida ventriculi. | 49 |
| XI. | De siti immensa. | 56 |
| XII. | De singultu. | 63 |
| XIII. | De nausea ex lacte cōcreto in stomacho, | |
| | R | cum |

	cum pessimis accidentibus.	71
xiiii.	De vomitu, & nausea præcedente vomitu.	77
xv.	De vomitu ob ventriculū non potenter cibum continere.	84
xvi.	De vomitu bilioso.	93
xvii.	De vomitu melancholico.	96
xviii.	De sanguinis vomitu.	101
xix.	De vomitu atræ bilis, cum vermibus & scarabeis.	105
xx.	De stomachi dolore.	109
xxi.	De ingenti stomachi dolore, in potatione.	111
xxii.	De dolore ventriculi intolerabili, cū hypochondriorum suspensione.	115
xxiii.	De dolore stomachi ex pituitoso humore ac tensione.	120
xxiiii.	De dolore stomachi, à rebus calidis assumptis.	125
xxv.	De dolore ventriculi & pylori; per modum consultationis.	130
xxvi.	De dolore stomachi, ex casu abortu.	133
xxvii.	De stomachi dolore, à parte dorsi posteriore, ad anteriorem transeunte.	138
xxviii.	De ventriculi dolore, ab assumpto veneno.	140
xxix.	De ventriculi dolore, ex obstructione hepatis & vteri inflatione.	143
xxx.	De ventriculi phlegmone, seu inflammatione.	147
xxxi.	De ventriculi phlegmone, seu inflammatione lethali.	158
	xxxii. De	

- xxxii. De apostemate frigido ventriculi ac diu-
turno in abscessum & pus mutato. 162
- xxxiii. De ventriculi vlcere. 170
- xxxiiii. De stomacho naturâ angustiore. 175
- xxxv. De ventriculi cruditate. 177
- xxxvi. De duobus ægris, ægrè cibum conco-
quentibus. 183
- xxxvii. De quodam ex cibo corrupto in stoma-
cho existente, laborante digestionis
corruptione. 192
- xxxviii. De stomachi resolutione. 194
- xxxix. De ventriculi inflatione, cum ingenti
dolore. 199
- xl. De ventriculi inflatione, cum dolore ex
succis pituitosis. 203
- xli. De stomachi & hypochondriorû infla-
tione, ex humore melancholico. 207
- xlii. De ructu ventriculi, cum aliis sympto-
matis. 210
- xliii. De muliere cholera morbo correpta. 213
- xliiii. De cholera ex medicamêto assumpto. 217
- xliv. De cholera ex cibo diuerso & corrup-
pente assumpto orta. 221
- xlvi. De cholera lethali ex bilis copia. 225
- xlvii. De cholera cum sæuissimis symptomatis,
& rectè curata. 229
- xlviii. De duabus mulieribus cholera sæuissima
laborantibus, & curatis. 237
- xliv. De cholera cū syncope & cōuulsione. 241
- l. De cholera mutata in cœliacū morbum,
seu cœliacam affectionem. 244
- li. De cœliaca affectione cū Atrophia. 251

ELENCHVS AVCTORVM,

qui in isto

DECIMO OCTAVO LIBRO,

De stomachi & ventriculi affectibus,

citantur.

A ETIVS.	Gordonius.
Alexander Trallia-	Gatenaria.
nus.	Guainerius.
Alexander Benedictus Vero-	Hispanus medicus Bononia.
nensis.	Holerius.
Altimarus.	Holerij interpres.
Amatus	Hippocrates.
Andromachus	Homerus.
Aristoteles.	Iacchinus.
Aristophanes.	Iohannes Montanus.
Asclepiades.	Iohannes Langius.
Auerrhoes.	Iohannes Tiengius.
Auicenna.	Matthaeus Curtius.
Beniuenius.	Matthaeus de Gradi.
Cornelius Celsus.	Paulus Aegineta.
Dioscorides.	Philumenus.
Dodonaus.	Plinius.
Erasistratus.	Rabbi Moyses
Erysimachus.	Rhases.
Elideus.	Rondeletius.
Fernelius.	Valescus.
Galenus.	Zoar.
Gilbertus Anglicus.	

I N
PETRI FORESTI MEDICI
DOCTISSIMI LIBRVM
DE MORBIS STOMACHI.

POST parte ex omni mala profligata, Foreste,
Dum stomachum cunctis à vitiis;
Exciuit stomachum Stygiæ tua cura cohorti,
Quæ fieri mortis iura minora dolet:
Sed nihil offensæ nocuit tot gentibus ira,
Quas tuus illæfas præstitit antè labor.

I. DOVSA F.

R 3 Ad

Ad Clariss. doctissimumq; virum
D. D. PETRUM FORESTUM
Delphensium Archiatrum, editionem
Observationum de stomachi
malis meditantem.

PROGENIES Phœbi, nymphâq; Coronide nate,
Et Bataui Sol ô magne Foreste soli;
Tinxit Apollinea Phœbus quem largius vnda
Quàm Stygio Eaciden merfit in amne Thetis;
Sic ergo prodesse orbi scriptisq; manûque
Pergis inextincto nobilis ingenio?
Effœtôque licet senio, (mirabile dictu)
Ista tuus fundit dona beatus ager?
Sic certè; assiduum testantur scripta laborem,
Scripta vel à Clario numine digna legi,
Qua (vir magne) iterum totum diffundis in orbem,
Ingenij certè germina rara tui,
Matte nouis opibus, viuent tua scripta Foreste,
Inuidia aut aui hæc nulla ruina premet.

Gualterus Verdoesius Med.

R E R V M

RERVM AC LOCORVM

MEMORABILIVM ET IN-

SIGNIVM QVÆ IN HOC XVIII.

libro de stomachi & ventriculi affe-

ctibus continentur,

INDEX COPIOSISSIMVS.

Numerus paginam notat.

A.

ABBAS à grauiſſimo ventriculi
dolore curatus. 139
Absceſſus ventriculi. 162. 164. 165.
fig. 166. 167. prog. 167. curatio
168. 169. 170
Abriens. 219
Abſtinentia quibus vtilis. 205
Acidi ruſtus propriè ad frigidũ ſto-
machum pertinent. 4
Acus ænea terebrato ventriculo re-
iecta 136
Acus quinq. perveſicam reiectæ 137
Ad atram bilem in ſtomacho quæ
valent 16
Aegritudo peracuta 224
Affectus infiniti in ventriculo cur-
periculoſi 3
Albertus Chirurgus ex vario potu
incidens in acutum ſtomachi do-
lorem 111
ἀντρον 74
Andromachus ſine discrimine ſcri-
pſit de ſtomachicis cõfectionibus 4
Anorexia 38. ex humore bilioſo 44
ἀνροξία ἀντρία ἀποπρία 39.
quæ pars affecta, quis affectus 39.
Cauſæ 40. fig. ex cauſa calida 47.
prog. curatio 48. ex pituita 49.
curatio 54
ἀνπρία 182. cauſæ 188
Apoſtemata & Abſceſſus ventriculi
quomodo fiant 165. fig. 166. prog.
167. curatio 168. 169. 170.
Apoſtematis calidi curatio 168
Apoſtematis frigidi curatio 169
& melancholici curatio 169
Appetentia canina curata 22
Appetentia canina & quæ eius pars
affecta & quis affectus 23. fig. 24.

cauſæ & cauſarum cognitio 24.
prog. curatio 25
Appetentia canina quomodo à Ga-
leno curabatur 26
Aqua vitæ egregiè ad ventofitatem
ventriculi facit 14
Arſenici ſumpti ſymptomata 141
Aſperitas ſtomachi vel nimia leui-
tas 177
Auicennæ præceptum quòd ad ci-
bum fames expectanda ſit nõ ſem-
per obſeruandum 17
Auicena deiis quibus vomitus con-
fert 83
Auicenna de vrina viridi 140
Auctor ex inflatione ventriculi cum
dolore ex ſuccis pituitoiſis cura-
tus 203

B.

BATAVIS frequenter pituita in
ventriculum labitur 18
Bilis in iocinore creatur vel in veſi-
ca fellis 93
Bilis atra non reſtringenda 96
Blafius apud Benuenium frigidam
non ferens curatus 56
Bradypepfia 181
Βραδυπείψια 182 cauſæ 188
Bruchus in aliqua carnea reclusus
vomitu reiectus 108
Boulimos 24
Βούλιμος 30. quibus differt ab appe-
tentia canina. 31. à frigore & ſic-
cis ſuccis curatio 32. quæ com-
petant in Bulimo 27
Bulimos in iuvene curatus 28. &
quomodo curetur 28. 29. 30. quæ
pars affecta, quis affectus, cura-
tio. 30

- C**APITI frigido & humido quomodo providendum 18
 Cardamomum 127
 Cardamomi quatuor species 255
 Cardiacus morbus ex vermicibus 21
 Cardiacus morbus 20. 21. & quibus differat à cardialgia eiusque curatio 20. 21
 Cardialgia ex bile 19
 Cardialgia syncopem inferens 19. 20
 Cardialgia eiusq. curatio 19. 20. 21
 Καρδιαγία 20
 Cathartica per os sumpta cur minus conueniant & quando conueniant in oris ventriculi inflammatione 2
 Catharina Iohannis Harperi consulis filia Delphensis prægnans à sœuissima cholera curata 237
 Causa morbi quomodo primum auferenda 238
 Cautio in sanguinis detractione in oris ventriculi inflammatione 1
 Cautio de stomatico laxatiuo exhibendo 116
 Cautio in abscessu stomachi aut ventriculi frigido adhibenda quæ sint 169
 Cautio quæ adhibenda in cruditate ventriculi 178
 Cautio diligens adhibenda in curatione cholerae 238. 239
 Cereuisia 58
 Cholera morbus 213
 Cholera cur sic dicta 214. quid sit cholera, quæ pars affecta, quis affectus 215. diff. 216
 Χολέρα 215
 Cholera ex medicamento assumpto. causæ diuersæ 217
 Cholera quomodo inducatur à medicamentis 218
 Cholerae causæ 219. quomodo alimenta & cibi facile corrumpantur, & choleram inducant 219. quomodo humores corrumpantur. Cholerae causæ internæ externæ 220
 Cholera ex cibo diuerso & corrupte assumpto, orta 221. fig. præfagientia cholera futurâ 223. fig. demonstr. 224. fig. causarum seu specierum 225
 Cholera lethalis ex bilis copia 225
 Χολερική καὶ χολερεώδης 226. fig. prog. 226. 227
 Cholera cum sœuissimis symptomatibus & rectè curata 229
 Cholerae morbi curatio 231. Tres status huius morbi, primus 232. Secundus, Tertius 233
 Cholera sœuissima curata in duabus mulieribus 237
 Cholerae curatio 238. 239. 240
 Cholera cum syncope & conuulsione sœuissima egregiè curata 241
 Cholera quomodo curata 243
 Cholerae symptomatibus quomodo succurrendum 243
 Cholera mutata in coeliacum morbum seu coeliacâ affectionem 244
 Cholera illa est sœuissima quæ cum syncope & conuulsione inuadit 241
 Cibi fastidium 38
 Cibi qui acidam qualitatem vel fumosam inducunt 193
 Cibi mora in ventre diuersa 197
 Cibus quibus citius quàm oporteat à stomacho labitur eiusque curatio 199
 Cibi & alimenta quomodo facile in stomacho corrumpantur 219
 Κίττα 32. 33
 Citta in puella curata 32. vnde dicta 33. pars affecta 34. affectus 35. fig. caus. prog. 36. curatio 37
 Clau, panni, capilli, ferraamenta per os reiecta 135
 Coeliacus affectus & qui facile in eum incidant 25
 Coeliacus morbus seu coeliaca affectio curata 242
 Coeliacus morbus cum cachexia & atrophia 246
 Coeliaca affectio sæpe cum lienteria confunditur quamuis ab ea differat 248
 Coeliaca affectio vnde dicta. Causæ 248. pars affecta, affectus, fig. 249
 Κοιλιακή 248
 Coeliacæ affectionis & lienteria differentia 249
 Coeliacus morbus alius apud Celsum quàm Trallianum aut Aetium 250
 Coeliaci morbi prog. 251
 Coeliaca affectio cum atrophia 251
 Coeliacæ affectionis curatio 253
 Concoctio quid 181
 Conuulsio vehementissima in cholera curata 242
 Conuulsio mala in cholera 224. 227
 Conuulsioni conferentia 236
 Conuul-

Conuulsio per consensum 225
 Conuulsio sanguinis effusione cura-
 ta 66
 Crusta panis cōferens stomacho 135
 Cucurbitula magna quid præstat
 stomacho apposita 236

D.

DELPHICA vrbs Batauorum
 ob cernisiam clara 58
 Differentia cardiaci morbi & car-
 dialgiæ 20. 21
 Differentia inter nauseam & vom-
 itum 75
 Differentia inter coeliacum mor-
 bum & lienteriam 249
 Digestionis corruptio quomodo fiat
 in stomacho 193
 Dilatio curandi in omnibus morbis
 acutis nociua 227
 Dipsas 56
 Dipsas serpens 59
 Dyspepsia 181. causæ 188
 Δυσπεψία 181. 190

E.

EBRII quærentes sitis irritamen-
 ta 58
 Elector & Episcopus Coloniensis à
 stomachi & hypochondriorum in-
 flatione ex humore melancholico
 curatus 207
 Eleuatio stomachi 153
 Elisabetha Guilhelmi à dolore ven-
 triculi & obstructione hepatis &
 vteri, curata 143
 Ἐμπειρία 75
 Empirici malè tractant stomachi-
 cos 4
 Empiricus in omnibus morbis malè
 vtens stomachico laxatiuo 116
 Ἐμφραξις 130
 Ἐμφύσημα 201
 Ἐμφυσος 130
 Error cuiusdam medici notatur 159
 Error muliercularum & imperito-
 rum medicorum 162
 Exercitium supernarum partiū sto-
 machi vitis utile, iuxta Celsum
 205
 Experimenta vulgaria contra sin-
 gultum 68

F.

FLATVVM materia quæ 118
 Flatus dolores grauissimos pro-
 ducunt 118
 Flatus quomodo fiat 118. 119
 Flatuosi spiritus vel flatus genera-
 tio 202

Filia D. Præsidis curata à difficili
 cholera 224

Florentiæ facilè tentantur fluxione
 à capite in stomachum 18

Frictiones & vincula quomodo di-
 uertant 234

Frustrum carnis vomitu reiectum,
 aliud à pectore reiectum 108

G.

GALENVS quomodo sanabat
 appetentiam caninam 26

Galenus acidum ructum ad frigi-
 dum ventriculum refert 4

Gherardus Backerus sacerdos sto-
 machi dolore affectus ex casu 133

Gheertrudis Bartholdi ab intole-
 rabili ventriculi dolore cum hy-
 pochondriorum suspensione cura-
 ta 115

Gnidij medici 215

Granum paradisi 125. 255

Græci potores 57

Græcorum matronas vinum bibisse
 iniuria erat 58

Græcia potores maximè effert,
 ebrios verò damnat 57

Grein 255

Guilhelmus Cripus ventriculi in-
 becillitate laborans, cui tandem
 pituita accessit 4

H.

HARCKO Alcmarianus ex in-
 flammatione ventriculi mor-
 tuus 158

Historia studiosi male vtentis aqua
 vitæ ad stomachū imbecillem 14

Historia Iacchini de curatione ven-
 triculi scioris 10

Historia mulieris vermem proicien-
 tis 32

Historia de milite ex sonitu bombar-
 dæ in maniam incidente 44

Historia mulieris religiosæ per sex
 septimanas nihil nisi grana grana-
 torum sugendo eaque parcissima
 sumentis 41

Historia mirabilis de puella per vn-
 decim annos nihil nisi exiguū ca-
 sei Stolckij dicti capiente 41. 42

Historia Langij de puella trienna-
 lem inædiam sustinente 43

Historia Benedicti Veronensis de
 quodā Veneto 46. continuis die-
 bus ieiunium sustinente 44

Historia eiusdem de virgine sacerdo-
 tali pluribus mensibus nihil com-
 edente 44

Historia Benedicti Veronensis de acu-
 crinali per os reiecta 235

I N D E X.	
Historia diuersa de pręgnantibus & aliis pica laborantibus	33.34
Historia Amati de puella citra labo- rante	35
Historia Galeni de siti	56
Historia Gradi de quadam Moniali quemuis cibum reiciente & epi- leptica	98
Historia Beniuenij de quodam mor- tuo ex vnico pugno stomacho in- flecto	134
Historia Benedicti Veronensis de di- uersis rebus per vomitum reiectis	135
Historia Beniuenij de acu deuorata & terebrato ventriculo exeunte	136
Historia mulieris Delphensis, mor- tue ex stilo incaute a chirurgo in gulam immisso & in stomachum prolapso	136
Historia iuuenis ex squillis viuis de- uoratis, mortui	136
Historia Beniuenij de pituita & ver- me mirabili per vomitum reiectis	197
Historia Amati de mercatore ex in- flammatione oris ventriculi labo- rante	149
Historia Beniuenij de eleuatione ventriculi	153
Historia Beniuenij de Cauda equina reiecta	135
Historia mirabilis de veneno assum- pto	141
Historia Galeni de Theagene cynico philosopho	161
Historia Benedicti Veronensis de quodam ex pilulis de euphorbio incidente in dysenteriam	172
Historia Dodonęi de matrona vlcus in stomacho habente	173
Historia Galeni de paruo ventricu- lo	175
Historia Beniuenij de quodam mo- riente ex frigidissimo emplastro stomacho appposito	194
Historia Beniuenij de stomachi reso- lutione	195
Historia Amati de Caspare a Rober- tis a cholera curato	212
Historia Beniuenij de coeliaco mor- bo nempe pylori curato	250
Homo solus ructum seu flatum inter animantia per os eructat	211
Hortulanus a ventriculi ventositate curatus	204
Humores in stomacho quibus modis cognoscantur	16
Hypochondriaca ac flatuosa affe- ctio	203.209.207
I.	
ICHTHYOPOLA a stomachi do- lore curatus	109
Inappetentia	38.389
Inappetentia ex verme ex pituitoso humore cum intemperie frigida ventriculi 49. ob satietatem, ob exercitium derelictum, aut vene- num, quomodo curatur	53
Inappetentia ex frigida intemperie, & materia pituitosa & ex imbe- cillitate curatio	53
Inappetentia si suctio non fiat quo- modo curatur, si a corpore pleno, si ex cutis densitate, & visceris in- flammatione vel ab vlcere stoma- chi, quomodo curatur	54
Intemperies ventriculi diu existere non potest	8
Intemperies sine materia raro fit	8
Iohannes Vanderanus iuuenis a stomachi dolore curatus	138
Iohannes Theodorus Harperus ab inappetentia curatus	38
Iohannes nobilis Neopolitanus a resolutione stomachi a Beniuenio curatus	195
Iohannes Boethus cereuissarius Del- phensis cholera sauiissima cum syncope & conuulsione laborans & curatus	241
Iuuenis licentiatu ex ventriculo la- borans	5
Iuuenis a canina appetentia cura- tus	23
Iuuenis ex Bulimo laborans	28
Iuuenis anorexia laborans ex bile	45
Iuuenis cibum enomens curatus	85
Iuuenis ex bilioso vomitu curatus	93
Iuuenis ex pharmaco assumpto inci- dens in vomitum sanguinis	101
Iuuenis inflammatione ventriculi laborans	147
Iuuenis agrid cibum concoquens	183
Iuuenis biliosus cholera laborans a cibo assumpto & corrupte, & curatus	221
Iuuenis in febre biliosa infra supra- que bilem euomens, curatus	231
L.	
Lac concretum in stomacho	72.
eiusque signa	73
Lac quibus non conuenit	201
Linimentum pro contractione	242
Lienteria	171
Lienteria	

- L**ienteria confunditur c^m coeliaco morbo 248
Locus Amati mendosus 250
Lucius Piso Bibulus apud Romanos 58
Λύκος, λύξ. 63
- M.**
MAHOMETES vinū interdixit suis 58
Μαλακία 32.33
 Margareta Nannia ex Baiorum familia mater auctoris pragnans sæpe in deliquium animi ex dolore stomachi incidens 124
 Margareta Cornelij ab ingenti dolore stomachi curata 117
 Maria Petri Sasboti filia pragnans à pica curata 33
 Maria filia D. Principis Auratci dolore stomachi affecta 139
 Maria Gherardi vxor M. Remi Astrij à cholera sæuissima curata 229
 Mellegetta & Millegitta 255
 Mercator sumptis granis paradisi in insignem dolorem stomachi incidens & curatus 125
 Monacha ab inappetentia canina curata 22
 Monacha singulis mensibus menstrua per os reiciens 98
 Morbi ventriculi varij & varia eiusdem symptomata 7
 Mulier grauida tuberculum durum apud Fernelium in ore ventriculi habens 3
 Mulier ex vomitu pituitoso curata 80
 Mulier ab Hippocrate curata cui os ventriculi dolebat 19
 Mulier porraceam bilem euomens apud Alexandrum Trallianum & curata 82
 Mulier scirrhum tumorem in ventriculo habens 153
 Mulier Alcmariana à cholera morbo acutissimo curata 213
 Mulier ex medicamento assumpto per Empiricum in cholera morbum incidens 217
 Mulieres binæ sæuissima cholera laborantes curatæ 237
- N.**
NANNIVS Forestus à cardialgia curatus 19
 Nausea ex lacte concreto in stomachum cū pessimis accidētibus 72
- N**ausea. causæ. curatio 73
Ναυτία ναυτίας 75 74
 Nausea cum vomitu diff. & connentia. Nausea quid 75. pars affecta, affectus, sig. causæ 76. curatio 77. sig. causarum vomitus tum nauseæ diligēter distinguenda 80.81. sig. prog. 82
 Nicolaus Paruns dictus à singultu curatus
 Nobilis Neapolitanus à dolore stomachi curatus 134
 Nodi tres caudæ caninæ per os reiecti. 135
- O.**
ODORATA corroborant stomachum 85
 Odoramenta ad syncopem 20
 Odoramenta appetitum reuocantia 25
 OEconomus à singultu curatus 66
 Oleum anisi 14
 Oris ventriculi inflammatio 1
 Os ventriculi quibus affectibus infestatur 3
 Oris ventriculi inflammatio curata 19
 Os stomachi quibus partibus consentiat. 187
- P.**
PA S T O R à singultu difficili curatus 64
Pastēs en pot 85
 Pater Iohannis Mathei de Graci ex stomacho laborans 111
 Petronella vxor Sasboti Bokelli à sæuissima cholera curata 238
 Pica 33. Pica vnde dicta 33
 Pica quibus frequens est 34
 Pica laborantes varia appetunt 34
 pars affecta 34. Affectus sig. causæ 35. prog. 36. curatio 37.38
 Pistor à ventriculi inflatione cum dolore curatus 200
Πυδύματωνος γαστρίς 201
 Pomponius consularis poeta nunquam ructauit 241
 Potores apud Græcos 57
 Pragnantes facile ex stomachi dolore afficiuntur 124
 Prator Reniburchius à coeliaco morbo curatus 244
 Proulimatesis 177
 Puella laxitate ventriculi laborans & curata 12
 Puella à pica seu citta curata 35
 Puella

Puella lecto decumbens per vnde-
cim annos 41
Puella citra laborans 35
Puella Spirensis triennalē inediam
sustinens 44
Puella singultiens mirabiliter cu-
rata 71
Puella nausea, quæ vomitum præce-
debat, deinde vomitu laborans &
curata 77
Puella epileptica euomens humo-
rem flori æris similem & sanata
82. 83
Puella stomachi dolore ex pituitoso
humore & tensione laborans 120
Puella euomens atram bilem, ver-
mes & scarabeos 105. 107
Puella reiiciens ossium frusta 136
Puella monialis frustum carneum
per vomitum reiiciens 108
Puella pauperula ab apostemate &
abscessu ventriculi curata 162
Puella ab ulcere ventriculi curata
170
Puella ulcere ventriculi laborans
& curata 170. 171
Puella angustum & paruum ventri-
culum habens 175
Puella ventriculi cruditate labo-
rans 177. 181
Puella cholera lethali laborans 225
Puer stomachi dolore epilepsia cor-
reptus 124
Puer arsenicum sumens & curatus
142. 143
Puer arsenicum sumens & post an-
num moriens 143
Pulvis pro inappetentia 52
Pulvis ad malè coloratos 181

Q.

QVARE in oris ventriculi in-
flammatione nō multum san-
guinis sit demendum 1
Quare syncope sæpe subsequatur
oris ventriculi inflammationem 1
Quæ valent ad sitim in febr. & in in-
flammatione oris ventriculi 2
Qui facile recidivam patiuntur 6
Qui cibum frequenter euomant &
quomodo curentur 96
Quidam inflammatione oris ventri-
culi laborans 1
Quidam post famem se replentes su-
bito suffocati 7
Quidam vino Hippocratico dicto à
singultu curatus 68
Quidam sola siti perierunt 57

Quidam aquæ frigidæ potu inter-
rempti 577
Quidam ex cibo corrupto laborans
digestionis seu concoctionis cor-
ruptione 192
Quidam ex imbecillitate stomachi in
resolutionem stomachi incidens
195
Quidam cholera morbum distin-
guunt in tres status 232

R.

RADIX ellebori albi in vino In-
fuso malè ab empirico exhibi-
ta 217
Radix gentianæ sylvestris à puerorū
sumpta intulit stomachi dolorem
deinde & epilepsiam 124
Regnerus Advocatus in Hagha co-
mitis dolore ventriculi ac pylori
vexatus 129
Religiosi & pars maxima togatorum
ferè sunt stomacho infirmiori 196
Ructus acidus stomachum frigidio-
rem notat 4
Ructus nidorosos calidiorem ven-
triculum indicat 8
Ructus vnde 210. 211. curatio
212
Rusticus fastidii cibi laborans post
alios morbos 544

S.

SCABIOSA herba ad quid utilis
163
Scarabeos in corpore generari posse,
vi vermes scribit Gordonius 107
Scarabei vomitu reiecti 107
Scythæ potiores & Græci 58
Scytharum dictū, quanto plus bibe-
rint, tanto magis sitire Parthos 58
Seruus ex vino mortuus apud Gale-
num 59
Singultus quid 63. pars affecta 63
affectus & vnde generetur 64
Singultu difficili laborans pastor &
curatus 64
Singultus quoque curatus 64
Singultus ex vèrositate curatus 65.
& in aliis 65. 66. causæ singul-
tus, prog. curatio 67
Singultus curatio ex frigidi humo-
ris copia 67. ex caliditate & hu-
moribus biliosis 69. à serositate
humorum, ab alimentis, vel me-
dicamentis acris, vel inflamma-
tionis ventriculi vel alterius visceris cu-
ratio 51. ob feb. 70. ex inaniti-
one curatio 71
Singultuosæ febres 71

Singultus

- Singultus ex inflammatione hepatis curatus 70
 Singultus & in Ileo malus & in syncope & animi deliquio 71
 Sitis in febribus quomodo extinguitur & in inflammatione oris ventriculi 2
 Sitis immensa, & quidam à siti curati 56
 Siti quidam perierunt 57. quæ pars affecta, quis affectus 57. causæ, signa causarum 59. sig. prog. curatio 60
 Sitis os ventriculi afficit, modo primario affectu modo per consensum aliarum partium 57
 Stomachi dolor ingens in potatore III
 Stomachicæ confectiones 4
 Stomachi imbecillitas unde fiat & quibus fiat 6
 Stomachici 4. & qui ita appellantur 196
 Stomachi subuersio 74
 Stomachi supinitas 74
 Stomachi doloris causæ infinitæ 113
 Stomachi dolor cum epilepsia 124
 Stomachi dolor 109. 111. 120
 Stomachi dolor omnium aliorum symptomatum sæuissimus 109
 Stomachi doloris differentie, quis sit affectus, quæ pars affecta & varij stomachi dolores 110
 Stomachi tormenta quæ dicantur 110
 Stomachi acutum dolorē quæ consequantur 110
 Stomachi dolor ex pituitoso humore, ac tensione 120
 Stomachi doloris sig. 122. 123. prog. 123. 124
 Stomachi dolor à rebus calidis assumptis 125
 Stomachi doloris curatio ex variis causis 126. 127. 128. 129. ex vento frigido aut aqua gelida epota 126. ex cathartico remedio & curatio à materia frigida 127. à bile 128. ex atra bile 129
 Stomachi dolor ex oppilatione 132
 Stomachi dolor ex duritie 133
 Stomachi dolor ex casu abortu 133. 134
 Stomachi dolor ex lapidis vel alterius situ 134
 Stomachus quibus casibus intrus vulneretur 135. prog. sig. partis læsæ curatio 136
 Stomachi dolor à parte posteriori 138. 139
 Stomachi dolor non semper à parte anteriori hæret 139
 Stomachi vulnera 135. 136. 137
 Stomachi erysipelas 154
 Stomachus quomodo ut aliæ partes inflammatione tentetur 147
 Stomachi eleuatio 153
 Stomachus cur requirat semper astringentia 161
 Stomachus cur in medio animali à Deo positus est 161
 Stomachi ulcerationis differentie 171
 Stomachi vitia quæ incorrigibilia 176
 Stomachus quibus morbis instrumentalibus afficiatur 176
 Stomachi asperitas vel nimia leuitas 177
 Stomachus non fert frigidissima exterius apposita 194
 Stomachi resolutio pessimum vitium 194
 Stomachi vis retentrix læsa 198
 Stomachi vis expultrix læsa 197
 Stomachi vim expultricem corroborantia 198
 Stomachi & hypochondriorum inflatio ex humore melancholico. vide inferius de Ventriculo.
 Stomaticum laxatiuum 115
 Studiosi cur in imbecillitatem ventriculi facile incidant 5
 Syncope 19. 20. 28. 113. 214. 224. 227. 229. 231
 Syrupi ex infus. rosar. compositio duplex 230
- T.
- T**HEOBORVS Forestus ex imbecillitate ventriculi laborans & curatus 6. 14
 Theagenes philosophus cynicus 161
 Theriaca comune remedium ad venenum 140
 Tumores scirrhi post dissectionem in stomacho inuenti 153
 Tumores duri in parte externa stomachi aliquando consistere 153
 Tumores duri in stomacho quomodo curentur 153
- V.
- V**ENÆ sectio moderanda in oris ventriculi inflammatione 1
 Venæ sectio quando in vomitu conuenit 98
 Venæ sectio statim ab initio in ventriculo

triculū phlegmone adhiēnda 159
 Venenum assumptum 140. 141
 Ventrem mouentia 198
 Ventriculi imbecillitas 4
 causæ 6. 7. 8. 9. 10. fig. 10. 11.
 curatio 14. 15. 16. 17. 18
 Ventriculi imbecillitas ex laxitate,
 mollitie, pituita accedente 12
 Ventriculi laxitas curata 12
 Ventriculi imbecillitas ex intempe-
 rie frigida & humida cui postea
 accessit materia pituitosa 4
 Ventriculi ac stomachi imbecillitas
 quibus potissimum euenit 6. 7
 Ventriculi ac stomachi morbi varij.
 intemperies cal. frid. humida, sic-
 ca. cum materia pituitosa, biliosa,
 melancholica 7. fig. intemperiei
 nudæ & curatio 8. 9. fig. ex co-
 pia humorum 10. 11
 Ventriculi imbecillitas ex intempe-
 ricum materia ex pituita eiusq.
 curatio 14. ex bile eiusque cu-
 ratio 15. ex atra bile 16. Si
 materia aliunde influat in stoma-
 chum, vel ventriculum, quid agen-
 dum 17
 Ventriculus aliunde affectus à ca-
 pite descendens 18. ex bile vel
 atra bile 17
 Ventriculi appetentiā quatuor præ-
 cedunt 23
 Ventriculus non potens cibum con-
 tinere, eiusque causæ 84. 85
 Ventriculi dolor intolerabilis cum
 hypochondriorū suspensione 115
 Ventriculi dolor ac pylori 129
 Ventriculi partis læsæ fig. prog.
 curatio 137
 Ventriculi vulnera 136. 137
 Ventriculi dolor ab assumpto vene-
 no 140
 Ventriculi dolor ex obstructione
 hepatis & vteri inflatione 143
 Ventriculi dolor ex vitio aliorum
 membrorum quomodo curatur 146
 Ventriculi dolor à nimio sensu quo-
 modo curetur 147
 Ventriculus quomodo patiatum tu-
 morem præter naturam & phle-
 gmone 151. partis affectus di-
 gnotio. affectus fig. inflammatio-
 nis 151. Vnde tumor, tensio, do-
 lor ac calor & vnde febris 152
 Ventriculi inflammatio quomodo ex
 aliis humoribus & ex sanguine
 fieri posset 153
 Ventriculi seu stomachi erysipelas
 154

Ventriculi inflammatio quomodo
 curatur & quomodo in ea purga-
 tio non conueniat in principia
 159. & quo tempore conueniat
 161
 Ventriculi phlegmone ex sanguine
 mediocri & vtili 154
 Ventriculi inflammatio lethalis 158
 Ventriculi inflammationis fig. prog.
 curatio 159
 Ventriculi abscessus calidus, sangui-
 neus, melancholicus 165. fig. oris
 ventriculi læsi in abscessu in fun-
 do stomachi, in parte anteriore
 posteriore, in tunica interna 166
 in tunica externa prog. 167. cu-
 ratio abscessus calidi 168. frigidi
 melancholici 169
 Ventriculi cruditas 177. trifariam
 accidit 181. pars affecta 182
 affectus 183. causæ, causæ in
 ternæ 185. fig. causarum & ab
 errore commissio ex corruptela al-
 sumptorum ex frig. intempe. 186
 ex sicce. & humid. fig. morborum
 instrumentalium 188. prog. 189
 curatio 190
 Ventriculi durities quomodo curatur
 161
 Ventriculi erysipelas 161
 Ventriculi apostema frigidum ac
 diuturnum in abscessum & pus-
 tranmutatum & tandem curatur
 162
 Ventriculi intemperiei frigida fig.
 gnum 4. 192
 Ventriculi inflatio cum ingenti do-
 lore 199. à quibus fit 199. pars
 affecta, affectus, fig. 201. causæ
 & causarum diuersarum noticiæ
 202
 Ventriculi inflatio cum dolore &
 succis pituitosis 203. fig. prog.
 curatio 205. curatio à flatulen-
 tiis cibis 206. à pituitosis humo-
 ribus in halitum solutis 207
 Ventriculi ructus cum aliis sym-
 ptomatibus 210
 Ventriculi vomica 164
 Ventralis affectio quæ 248
 Veratrum album vino infusum ma-
 le propinatum 218
 Vermis bulimum inferens 31
 Vermes reiecti in feb. pestilentiali
 bus malum 83
 Vermes vomitu reiecti 105. 106
 Vermes dolorem stomachi inferen-
 tes quomodo expellendi 109
 Vermis cum pituita expulsus 109
 Vermes

Vermes vomitione sepe reiciuntur	107	Vomitibus cibalis	91
Veteres sua gloria non fraudandi	170	Vomitibus humoralis	91
Vinum Mahometes gentibus lege	58	Vomitibus cibalis qui curatur	92
sustulit	58	Vomitibus à per. sione aut vulnere	92
Vinum Cretense moronaticum di-	58	& quomodo curatur	92
ctum	58	Vomitibus à veneno & quomodo cu-	92.
Vir ab inappetentia curatus	51	retur & à toto vel alia parte	92.
Vir sexagenarius coeliaca affectione	251	per essentiam	93
cum atrophía laborans	101	Vomitibus biliosus 93. & quomo-	94
Vir sanguinem euomens	101	do curatur	94
Virgo Veneta acus per vrinam red-	136	Vomitibus cibalis & qui frequenter	96
didit	136	cibū euomat quomodo curatur	96
Ulcus ventriculi 164. 170. diff. vl-	171. fig. 172.	Vomitibus melancholicus 96. & quo-	97
ceris stomachi 171. fig. 172.	173. prog. 173. curat.	modo curatur	97
Ulcum intestinorum gracilium &	173	Vomitibus cibi perpetuus & curatus	98. 99
stomachi diff.	173	venæ sectione	98. 99
Ulcibus vetulis quæ conueniunt	175	Vomitibus atræ bilis periculosus 96.	97
Unguenta & linimenta ad stoma-		& quomodo contingat	97
chum debilem citius operantur		Vomitibus si periodicè moueatur quo-	100
empiastris	86	modo curandus	100
Vomitibus	15	Vomitibus pituitosus quomodo cu-	95. 80
Vomitio	74	ratus	95. 80
Vomitibus quid	75	Vomitibus ob flatum stomachi suspen-	96
Vomitibus caus. fig. cur.	76	dentes quomodo curatur	96
Vomitibus & quomodo curatur	77	Vomitibus quem pharmacum excita-	100
Vomitibus pituitosus in muliere cura-	80	uit quomodo curatur	100
tus	80	Vomitibus à vulnere ab apostemate	101
Vomitibus causæ diligenter distinguen-		quomodo curatur	101
de ante curationem, fig. causa-	80. 81. fig. prog. 82	Vomitibus ex oppilatione pylori quo-	101
rum	83. 84	modo curatur	101
Vomitibus qui vtilis 82. & quibus	83. 84	Vomitibus sanguinis	101
confert	83. 84	Vomitibus sanguinis in iuvene ex	101
Vomitibus malus	83. 84	pharmaco assumpto	101
Vomitibus niger licet malus, aliquan-	83	Vomitibus sang. causæ, fig.	102
do prodest.	84	Vomitibus sanguinis periculosus eius-	103
Vomitibus ob ventriculum nō poten-	84	que curatio	103
tem cibum continere	87	Vomitibus atræ bilis vna cum vermi-	105
Vomitibus non vno modo sed diuersis	87	tus & scarabeis	105
curatur	87	Vomitibus bruchus reiectus & lapis	108
Vomitibus differentie	87	Vomitibus non conuenit in inflamma-	160
Vomitibus spontaneus, criticus, sym-	87	tione stomachi	160
ptomaticus, naturalis, quietus,	87	Vomitibus & cathartica in vlceri-	174
violentus	87	bus stomachi vitanda	174
Vomitibus artificialis, qui facile vo-	88	Vomitibus in principio cholera non	221
mant, quæ ante vomitum obser-	88	cohibendus	221
uanda	88	Vrina viridis quid significat	140
Vomitibus tempore quæ obseruanda,	89	Vrui in hyeme famem sustinent	28
& quæ post vomitum obseruanda,	89	Vulnera ventriculi	136. 137
& quibus vtilis est vomitus	90	Vxor cuiusdā calcearij à ructu ven-	210
Vomitibus inmodicus quid præstet	90	triculi cum aliis symptomatis cu-	210
Vomitibus quibus non est inhibendus	91	rata	210
90. quibus compescendus	91	Vxor Sasboti Bokelli à cholera gra-	238
		uissima curata	238
		ὑπὸ τῆς ἀφροδισιατικῆς.	74



